



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.09.2025
Αριθ. πρωτ.: 264030

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ISK Biosciences Europe N.V., Βελγίου
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14767 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFINTO (flonicamid 50 % β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 13633/349069π.ε./04.02.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14511 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFINTO (flonicamid 50 % β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 5078/59875/29.05.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14767 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς ΤΕΡΡΕΚΙ (flonicamid 50 % β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 222403/19.08.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14767 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFINTO (flonicamid 50 % β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 13633/349069π.ε./04.02.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u> Πορτοκαλιές CIDSΙ Μανταρινιές CIDRE Λεμονιές CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA Κιτριά CIDME Φράπες CIDGR Νεραντζιές CIDAU Περγαμόντο CIDAB	Αφίδες Εσπεριδοειδών <i>Aphis citricola</i> APHISI <i>Toxoptera auranti</i> TOXOAU <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	10	3,5-10	100-300	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Ροδακινιές PRNPS	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE <i>Brachycaudus schwartzi</i> APPESW	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Κερασιές PRNAV	Αφίδες <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται

	<i>Brachycaudus schwartzi</i> APPESW <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR					
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Δαμασκηνιές PRNDO	Αφίδες <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE <i>Brachycaudus schwartzi</i> APPESW	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Μηλιές MABSD	Γκρίζα αφίδα <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL <i>Dysaphis pyri</i> DYSAPY <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA Πράσινη αφίδα <i>Aphis pomi</i> APHIPO	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Αχλαδιές PYUCO Αχλαδιές NASHI PYUPC Κυδωνιές CYDOB	Αφίδες Γκρίζα αφίδα της αχλαδιάς <i>Dysaphis pyri</i> DYSAPY <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες LYPES Μελιτζάνες SOLME υπαίθρου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis fabae</i> APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες LYPES Μελιτζάνες SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum</i>	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο	3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά

θερμοκηπίου	<i>euphorbiae</i> MACSEU <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis fabae</i> APHIFA				θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες LYPES Μελιτζάνες SOLME Θερμοκηπίου (εφαρμογές με στάγδην άρδευση)	Άλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	16	--	200-500	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος	
<u>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</u> Αγγούρια CUMSA Αγγουράκια CUMSA Κολοκυθάκια CUUPG Θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis fabae</i> APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σιτάρι TRZSS	Αφίδες <i>Aphis nasturtii</i> APHINA <i>Macrosiphum avenae</i> MACSAV <i>Macrosiphum dirhodum</i> MACSSP <i>Metopolophium dirhodum</i> METODR <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA	14	--	20-50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καπνός NIOTA	Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> *	14	--	40-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται

	THRITB					
Καπνός** ΝΙΟΤΑ (εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης) <i>Χρήση ήσσονος σημασίας</i>	Αφίδες <i>Myzus nicotianae</i> MYZUNI <i>Myzus sp.</i> MYZUSP <i>Aphis sp.</i> APHISP Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB	14	--	40-60	Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές max (1 εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος μετά από 14 ημέρες) εφόσον απαιτείται
Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Λύγκος * <i>Lygus sp.</i> LYGUSP	7,5	--	50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αρακάς (με λοβό)** PIBSX Υπαίθρου <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis fabae</i> APHIFA	14	35-70	20-40	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6 ^{ου} ξεδιπλωμένου φύλλου (BBCH 16) χωρίς την παρουσία μελισσών	1 εφαρμογή
<u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> ΖΟΡΝΗ Τριανταφυλλιές ROSSS υπαίθρου και θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum sp.</i> MACSSP <i>Aphis fabae</i> APHIFA	14	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών - εντόμων. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ</u> ΖΟΡΝW					Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	
Μαρούλι LACSA Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια CICEN	Αφίδες <i>Nasonovia</i> <i>ribisnigri</i> NASORN <i>Myzus sp.</i>	2 mg σκ./φυτό (αντιστοιχεί σε 14 γρ. σκ./ στρ.)	--	--	Εμβάπτιση/ διαβροχή του δίσκου σποράς πριν την μεταφύτευση των νεαρών	1 εφαρμογή

Ρόκα ERUVE Λυκοτρίβολο VLLLO Γαιοκάρδαμο BARVE Κόκκινο σινάπι BRSJU	MYZUSP <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis gossypii</i> APHIGO				φυταρίων, από την ανάπτυξη του 1 ^{ου} φύλλου έως 6 ^{ου} φύλλου νωρίς την άνοιξη μέχρι το τέλος του φθινοπώρου BBCH 11-16	
Μπιζέλι με λοβό PIBSX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON	14	--	20-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Απρίλιο έως Οκτώβριο BBCH 11-71	1 εφαρμογή
Φασόλι με λοβό PHSVX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Aphis fabae</i> * APHIFA	14	--	20-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Απρίλιο έως Οκτώβριο BBCH 11-71	1 εφαρμογή
Όσπρια: Μπιζέλι PISBX Φασόλι PHSVX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Aphis fabae</i> * APHIFA	14	--	20-60	Με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο BBCH 11-71	1 εφαρμογή

Φακή (όσπριο)** LENCU Χρήση ήσσονος σημασίας	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Myzus</i> sp. MYZUSP	14	--	20-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη άνθηση (έχει ανοίξει το 50% των ανθέων) (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο BBCH 11-65	1 εφαρμογή
Λούπινο (όσπριο)** LUPAL Χρήση ήσσονος σημασίας	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Macrosiphum albifrons</i> MACSAL	14	--	10-30	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη άνθηση (έχει ανοίξει το 50% των ανθέων) (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο BBCH 11-65	1 εφαρμογή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
4. Η εφαρμογή με εμβάπτιση/διαβροχή των δίσκων μηχανικά, με στάγδην άρδευση, πριν την μεταφύτευση να γίνεται 1 μέρα (μέγιστο) πριν την καθορισμένη ημερομηνία μεταφύτευσης. Η δόση η οποία θα εφαρμοστεί να μην ξεπερνά τα 2 mg σκευάσματος/φυτό.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του θρίπα στον καπνό (εφαρμογή με ψεκασμό), κατά του λύγκου στο βαμβάκι και κατά της αφίδας *Aphis fabae* στα φασόλι με λοβό και στα όσπρια φασόλι και μπιζέλι. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καπνού (εφαρμογή με ριζοπότισμα), αρακά με λοβό, φακής και λούπινου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Βαμβάκι	75
Εσπεριδοειδή	60
Μαρούλι (0251020), Σκαρόλες (πικρίδα)/	49

Πλατύφυλλα Αντίδια (0251030), Ρόκα (0251060), Λυκοτρίβολο (0251010), Γαιοκάρδαμο (0251050), Κόκκινο σινάπι (0251070)	
Σιτάρι (0500090)	28
Μηλιές, Αχλαδιές, Κυδωνιές, Nashi	21
Ροδακινιές, Δαμασκηνιές, Κερασιές, Αρακάς (με λοβό), Μπιζέλια με λοβό (0260030), Φασόλια με λοβό (0260010)	14
Καπνός	7
Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια θερμοκηπίου, Τομάτες, Μελιτζάνες (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	1
Μπιζέλια (όσπρια) (0300030), Φασόλια (όσπρια) (0300010), Φακή (όσπριο) (0300020), Λούπινο (όσπριο) (0300040)	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13633/349069π.ε./04.02.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ