



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθ. πρωτ:

09.06.2026
147939

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: PYRAGRO S.R.L, Ιταλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
της εταιρείας,
MEDPEST I.K.E.
Κος Κώστας Μαρκάκης
25ης Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763 19009
Ντράφι-Πικέρμι
E-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14737 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ASSET FIVE (δ.ο. pyrethrins 4,65% β/ο), ως προς τον κάτοχο της άδειας, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών, τις συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40&45 αυτού.
 - β) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
4. Την αριθμ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
5. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»

7. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
8. Τις από τον Οκτώβριο του 2021 & 2022 αξιολογήσεις των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ιταλίας του σκευάσματος ASSET FIVE (αριθμ. έγκρισης κυκλοφορίας: 16776).
9. Την αριθμ. 406437/24.12.2024 αίτηση και τα αριθμ. 341966/08.12.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 14737 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ASSET FIVE (δ.ο. pyrethrins 4,65% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 1240/32644/06.02.2020 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τον κάτοχο της άδειας, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών, τις συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.4α, 3, 5, 6, 11, 13, 14** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

PYRAGRO S.R.L
Via G. Stephenson 73, 20157 Milano, Ιταλία
regulatory@pyragro.it

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

MEDPEST I.K.E.
 Κος Κώστας Μαρκάκης
 25ης Μαρτίου 29, Τ.Κ. 19009 Τ.Θ. 763, Ντράφι-Πικέρμι
 Τηλ.: 2106044534, 6947693457
 E-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος **με μηχανοκίνητα ή χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα.**

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό δοχείο με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα για πάνω από 24 ώρες. Το pH του νερού δεν πρέπει να είναι αλκαλικό.

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το pH του νερού και, αν ξεπεράσει το 7, θα πρέπει να το οξύνετε. Το έτοιμο προς χρήση διάλυμα πρέπει να έχει pH περίπου 5-6. Μέχρι αυτό το επίπεδο οξύτητας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και αυξάνει την ανθεκτικότητα της δράσης του. Επομένως, συνιστάται να οξύνετε το διάλυμα, εάν είναι απαραίτητο, έως ότου επιτυγχάνεται πάνω από την τιμή, φροντίζοντας να μην πέσει κάτω από μια τιμή pH 5.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

1. Αδειάστε εντελώς το δοχείο και ξεπλύνετε το δοχείο και τις σωληνώσεις με καθαρό νερό. Αδειάστε εντελώς.

2. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό σε ποσότητα τουλάχιστον 10% του συνολικού όγκου της δεξαμενής και προσθέστε ένα απορρυπαντικό ή ένα διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Ξεπλύνετε το ψεκαστικό δοχείο και τους σωλήνες και στη συνέχεια αφήστε για 10 λεπτά με ανάδευση.

Αποστραγγίστε εντελώς (Επαναλάβετε δύο φορές).

3. Προκειμένου να αφαιρεθούν υπολείμματα απορρυπαντικού ξεπλύνετε με καθαρό νερό τον περιέκτη μαζί με το ψεκαστικό δοχείο και τους σωλήνες.

4. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά με το διάλυμα απορρυπαντικού στην ίδια συγκέντρωση όπως παραπάνω.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)
		κ.εκ./ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
<u>Εσπεριδοειδή:</u> Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI), Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus floccosus</i> (ALTHFL)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
<u>Μηλοειδή:</u> Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO)	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO), Βρωμούσα <i>Halyomorpha halys</i> (HALYHA), Ψύλλα <i>Cacopsylla pyri</i> (PSYLPY)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
<u>Πυρηνόκαρπα:</u> Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR) Δαμασκηνιά (PRNDO) Κερασιά (PRNAV)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU), Βρωμούσα <i>Halyomorpha halys</i> (HALYHA)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) (VITVI)	Κοχυλίδα <i>Clysia ambiguella</i> (CLYSAM), Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> (POLYBO), Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> (EMPOFL), <i>Scaphoideus titanus</i> (SCAPLI)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7

Φράουλα (Υ) (FRAAN)	Θρίπες (1THRIF), Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)	64	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	64	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
<u>Μικροί καρποί:</u> Σμέουρο (RUBID) Μύρτιλλο (VACMY) Μούρο (RUBFR)	Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)	51	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Μαρούλι (Υ) (LACSA) <u>Βότανα και βρώσιμα άνθη:</u> Φραγκομαϊντανός (ANRCE) Σχοινόπρασο (ALLSC) Φύλλα σέλινου (APUGS) Μαϊντανός (PARCR) Φασκόμηλο (SALOF) Δενδρολίβανο (RMSOF) Θυμάρι (THYVU) Βασιλικός (OCIBA) Δάφνη/δαφνόφυλλα (LURNO) Δρακόντιο/Εστραγκόν (ARTDR)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN) <i>Hyperomyzus lactucae</i> (HYPELA)	51	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Μαρούλι (Θ) (LACSA) <u>Βότανα και βρώσιμα άνθη:</u> Φραγκομαϊντανός (ANRCE) Σχοινόπρασο (ALLSC) Φύλλα σέλινου (APUGS) Μαϊντανός (PARCR) Φασκόμηλο (SALOF) Δενδρολίβανο (RMSOF) Θυμάρι (THYVU)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN)	51	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7

Βασιλικός (OCIBA) Δάφνη/δαφνόφυλλα (LURNO) Δρακόντιο/Εστραγκόν (ARTDR)					
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος της πατάτας <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	38	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Τομάτα (Υ) (LYPES) Πιπεριά (Υ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Υ) (SOLME)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA), Θρίπες (1THRIF)	77	120	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Τομάτα (Θ) (LYPES) Πιπεριά (Θ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	77	120	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Ανθοκομικά (Υ) & Καλλωπιστικά (Υ) φυτά	Αφίδες <i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO), Θρίπες (1THRIF)	64	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	2/7
Ανθοκομικά (Θ) & Καλλωπιστικά (Θ) φυτά	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), Θρίπες (1THRIF)	64	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	2/7
Μηδική (MEDSA)	Αφίδες <i>Aphis craccivora</i> (APHICR)	38	60	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Δασικά φυτά	Δαντέλα του πλατάνου <i>Corythucha</i> sp. (CRTHSP)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Κολοκυνθοειδή (Υ) Πεπόνι (CUMME) Κολοκύθι (CUUPG) Αγγούρι/Αγγουράκι (CUMSA)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	51	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) (OLVEU)	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> (<i>Dacus oleae</i>) (DACUOL)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7

Παρατηρήσεις:

- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
- Επαναληπτική εφαρμογή στο αμπέλι για τον εχθρό *Scaphoideus titanus* στην περίπτωση που παρατηρηθεί η ασθένεια του κίτρινου μωσαϊκού.
- **Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στις ποικιλίες ελιάς Καλαμών και Κορωνέικη. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αυτές από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σε αυτές τις καλλιέργειες.**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει Pyrethrins και ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC.
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνεται εναλλαγή με εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή»

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας»

«Σε περίπτωση επανεισόδου στο θερμοκήπιο να έχει προηγηθεί καλός αερισμός»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPE 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στα μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, δασικά φυτά (εφαρμογές σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης):

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στα μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, δασικά φυτά (εφαρμογές σε όψιμα στάδια ανάπτυξης) :

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **25 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στο αμπέλι (εφαρμογές σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης):

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στο αμπέλι (εφαρμογές σε όψιμα στάδια ανάπτυξης):

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στα εσπεριδοειδή και την ελιά:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στα **καλλωπιστικά** και στα **ανθοκομικά**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στη **φράουλα**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στους **μικρούς καρπούς (εφαρμογές σε όψιμα στάδια ανάπτυξης)**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στην **τομάτα**, στην **πιπεριά** και στη **μελιτζάνα**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων**.

SPe 3: Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη στα **πυρηνόκαρπα**, στα **μηλοειδή**, **δασικά φυτά** και **ελιά**.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ζιζάνια.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά (0110050), Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020), Αμπέλι οινοποιήσιμο (0151020), Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010), Μαρούλι (Υ+Θ) (0251020), Βότανα και βρώσιμα άνθη (Υ+Θ): Φραγκομαϊντανός (0256010), Σχοινόπρασο (0256020), Φύλλα σέλινου (0256030), Μαϊντανός (0256040), Φασκόμηλο (0256050), Δενδρολίβανο (0256060), Θυμάρι (0256070), Βασιλικός (0256080), Δάφνη/δαφνόφυλλα (0256090), Δρακόντιο/Εστραγκόν (0256100), Πατάτα (0211000), Ντομάτα (Υ+Θ) (0231010), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030), Μηδική (0632010-003), Δασικά είδη, Αγγούρι (Υ) (0232030), Αγγουράκι (Υ) (0232020), Ελιά [επιτραπέζιες (0161030) & ελαιοποιήσιμες (0402010) ποικιλίες]	1

Φράουλα (Υ+Θ) (0152000), Μικροί καρποί: Σμέουρο (0153030), Μύρτιλλο (0154010), Μούρο (0153020-001),	
Ανθοκομικά (Υ) & Καλλωπιστικά (Υ) φυτά	-

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, σε θερμοκρασίες 4-35°C, και καλά αεριζόμενο, μακριά από την έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών:

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

- The submission of 2 additional trials on stone fruits demonstrating that residues of pyrethrins are below the LOQ at 7 days after the last treatment.
- Applicant to provide ILV study for the method described in KIIIA 5.3.1/01 (Hamberger R., 2010), in order to be accepted for monitoring/enforcement.
- **Chronic study on adult and honeybee larvae.**
- **Δύο πειράματα αγρού σε μία τουλάχιστον ποικιλία ελιάς Καλαμών ή Κορωνέικη, προκειμένου να αξιολογηθεί η φυτοτοξικότητα και οι επιπτώσεις στις οργανοληπτικές ιδιότητες.**

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1240/32644/06.02.2020 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

Χρ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ