



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.01.2025  
Αριθ. πρωτ: 21202

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη  
Τηλέφωνο: 210 928 7164  
e-mail: [gtsolomyti@minagric.gr](mailto:gtsolomyti@minagric.gr)

Προς: Sharda Cropchem España S.L.  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη  
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια, Αττική  
e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com) )

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70290 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (δ.ο. bentazone 48% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη συγκομιδή».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 37§4 και 45 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - γ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
7. Την αριθμ. 4914/123891/29.04.2024 απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε η αριθμ. 70290 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (δ.ο. bentazone 48% β/ο).

8. Την από το Μάρτιο του 2024 αξιολόγηση των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους -εισηγητή Πορτογαλίας.
9. Την αριθμ. 9396/270075/01.09.2023 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 4880/122766/26.04.2024, 5920/152122/29.05.2024 και 6821/175606/18.06.2024 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την με αριθμό 70290 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (δ.ο. bentazone 48% β/ο), που ανανεώθηκε με την με αριθ. πρωτ. 4914/123891/29.04.2024 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη συγκομιδή:

Συγκεκριμένα τα σημεία **5**, **6** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                  |                                                                                                                                                 |                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Πεδίο Εφαρμογής    | Στόχος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Δόσεις σκευάσματος |                                  | Χρόνος εφαρμογής                                                                                                                                | Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιεργητική περίοδο |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Κ.εκ./στρέμμα      | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |                                                                                                                                                 |                                               |
| Αραβόσιτος (ZEAMX) | <b>Ευαίσθητα ζιζάνια:</b><br>Αγριοπιπεριά ( <i>Polygonum persicaria</i> - POLPE)<br><b>Άγρια ρόκα (<i>Diplotaxis erucoides</i> -DIPER)</b><br><b>Μολόχα (<i>Malva neglecta</i> – MALNE)</b><br><br><b>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:</b><br>Τραχύ βλήτο ( <i>Amaranthus retroflexus</i> - AMARE)<br><b>Περιπλοκάδα (<i>Convolvulus arvensis</i> -CONAR)</b><br><b>Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i> -CHEAL)</b><br><b>Αγριομπαμπακιά (<i>Abutilon theophrasti</i> – ABUTH)</b><br><b>Στίφνος (<i>Solanum nigrum</i> – SOLNI)</b> | 200                | 15-40                            | Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο από το 1 <sup>ο</sup> έως το 5 <sup>ο</sup> πραγματικό φύλλο. (BBCH 10-15) | <b>1</b>                                      |
| Ρύζι (ORYSA)       | <b>Ευαίσθητα ζιζάνια:</b><br><b>Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium strumarium</i> - XANST)</b><br><b>Άγριο σινάπι (<i>Sinapis arvensis</i> - SINAR)</b><br><b>Αναγαλλίς (<i>Anagallis arvensis</i> – ANGAR)</b><br><b>Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> - POROL)</b><br><b>Βούτομο (<i>Butomus umbellatus</i> – BUTUM)</b>                                                                                                                                                                                                          | 200                | 30 – 50                          | Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το 3 <sup>ο</sup> φύλλο της καλλιέργειάς έως το τέλος του αδελφώματος. (BBCH 13-29)                               | <b>1</b>                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Τραχύς Ζωχός (<i>Sonchus asper</i> - SONAS)<br/> Κίτρινη Κύπερη (<i>Cyperus esculentus</i>- CYPES)<br/> Λινδέρνια (<i>Lindernia sp</i> - LIDSS )<br/> Μοσχοκύπερη (<i>Cyperus difformis</i>- CYPDI)<br/> Ρανούνκουλος (<i>Ranunculus sardous</i> - RANSA)<br/> Ραπανίδα (<i>Raphanus raphanistrum</i> - RAPRA)<br/> Ραγάζι (<i>Scirpus maritimus</i> – SCPMA,<br/> Σκίρπος (<i>Scirpus mucronatus</i> – SCPMU)<br/> Σπέργουλα (<i>Spergula arvensis</i> - SPRAR)<br/> Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i> - DATST)</p> <p><u>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:</u><br/> Τραχύ βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i> - AMARE)<br/> <i>Bidens sp.</i> – BIDSS<br/> Δωδεκάνθι (<i>Lamium amplexicaule</i> - LAMAM)<br/> Ιπόμεια (<i>Ipomoea sp</i> - IPOSS),<br/> Παπαρούνα (<i>Papaver rhoeas</i> – PAPRH)<br/> Πεντάνευρο (<i>Alisma plantago-aquatica</i> - ALSPA)<br/> Πολυκόμπι (<i>Polygonum convolvulus</i> - POLCO)<br/> Στύφνος (<i>Solanum nigrum</i> - SOLNI)</p> |  |  |  |  |
| <p><b>Παρατηρήσεις:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα τηγάνια ως 2-3 εκ. και να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που κατά το χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό.</li> <li>2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.</li> <li>3. Να μην υπερβαίνεται η δόση των 200 κ.εκ./στρ/έτος ή των 96 γραμ. δ.ο./στρ. έτος .</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να αποφεύγεται ο ψεκασμός με ψυχρό καιρό ή ξηρασία ή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό συνθήκες στρες.

Μην εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή και για διάστημα 6 ωρών μετά από βροχή.

**Μην εφαρμόζετε όταν φυσάει.**

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει bentazone, που ανήκει στην ομάδα 6 κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα, που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες                                  | Ημέρες                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Αραβόσιτος (0500030)<br><b>Ρύζι (0500060)</b> | Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος |

**II.** Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4914/123891/29.04.2024 απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε η αριθμ. 70290 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (δ.ο. bentazone 48% β/ο).

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**