



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.04.2026
Αριθ. πρωτ.: 92096

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη)
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 70290 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (bentazone 48% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 8104/107079/31.07.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70290 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (bentazone 48% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 344137/09.12.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 70290 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (bentazone 48% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8104/107079/31.07.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρ	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Αραβόσιτος ZEAMX	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Αγριοπιπεριά <i>Polygonum persicaria</i> POLPE Άγρια ρόκα <i>Diploaxis erucoides</i> DIPER Μολόχα <i>Malva neglecta</i> MALNE <u>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Τραχύ βλήτο <i>Amaranthus retroflexus</i> AMARE Περιπλοκάδα <i>Convolvulus arvensis</i> CONAR Λουβουδιά <i>Chenopodium album</i> CHEAL Αγριοπαμπακιά <i>Abutilon theophrasti</i> ABUTH Στίφνος <i>Solanum nigrum</i> SOLNI	200	15-40	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο από το 1 ^ο έως το 5 ^ο πραγματικό φύλλο. BBCH 10-15	1
Ρύζι ORYSA	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> Αγριομελιτζάνα <i>Xanthium strumarium</i> XANST Άγριο σινάπι <i>Sinapis arvensis</i> SINAR Αναγαλλίς <i>Anagallis arvensis</i> ANGAR Αντράκλα <i>Portulaca oleracea</i> POROL Βούτομο <i>Butomus umbellatus</i> BUTUM Τραχύς Ζωχός <i>Sonchus asper</i> SONAS	200	30-50	Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το 3 ^ο φύλλο της καλλιέργειάς έως το τέλος του αδελφώματος. BBCH 13-29	1

Κίτρινη Κύπερη <i>Cyperus esculentus</i> CYPES Λινδέρνια <i>Lindernia</i> sp. LIDSS Μοσχοκύπερη <i>Cyperus difformis</i> CYPDI Ρανούνκουλος <i>Ranunculus sardous</i> RANSA Ραπανίδα <i>Raphanus raphanistrum</i> RAPRA Ραγάζι <i>Scirpus maritimus</i> SCPMA Σκίρπος <i>Scirpus mucronatus</i> SCPMU Σπέργουλα <i>Spergula arvensis</i> SPRAR Τάτουλας <i>Datura stramonium</i> DATST <u>Μετρίως ευαίσθητα</u> <u>ζιζάνια:</u> Τραχύ βλήτο <i>Amaranthus retroflexus</i> AMARE <i>Bidens</i> sp. BIDSS Δωδεκάνθι <i>Lamium amplexicaule</i> LAMAM Ιπόμεια <i>Ipomoea</i> sp. IPOSS Παπαρούνα <i>Paraver rhoeas</i> PAPRH Πεντάνευρο <i>Alisma plantago-</i> <i>aquatica</i> ALSPA Πολυκόμπι <i>Polygonum convolvulus</i> POLCO Στύφνος <i>Solanum nigrum</i> SOLNI				
--	--	--	--	--

Σόργο* SORVU Κεχρί* PANMI Κεχροσετάρια* SETIT Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Πλατύφυλλα ζιζάνια	200	15-40	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, από το 1° έως το 5° πραγματικό φύλλο. BBCH 10-15	1
Γλυκό καλαμπόκι* ZEAMX Χρήση ήσσονος σημασίας	Πλατύφυλλα ζιζάνια	200	20-40	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, από το 2° έως το 9° πραγματικό φύλλο. BBCH 12-19	1
Μπιζέλι φρέσκο με λοβό και χωρίς λοβό PIBSX Χρήση ήσσονος σημασίας	Πλατύφυλλα ζιζάνια	200	22-45	Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά, πριν την εμφάνιση των ανθέων. BBCH <51	1
Κουκί φρέσκο με λοβό και χωρίς λοβό* VICFX Χρήση ήσσονος σημασίας	Πλατύφυλλα ζιζάνια	200	22-45	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, έως το στάδιο των 7 φύλλων (BBCH <17) και ύψος φυτών μικρότερο από 15 εκ.	1
Σόγια* GLXMA Χρήση ήσσονος σημασίας	Πλατύφυλλα ζιζάνια	200	20-30	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, από το 1° έως το 3° πραγματικό φύλλο και ύψος φυτών 8-12 εκ. BBCH 11-13	1
Λινάρι* LIUUT Χρήση ήσσονος σημασίας	Πλατύφυλλα ζιζάνια	200	22-45	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο 3° πραγματικό φύλλο. BBCH 13	1

Παρατηρήσεις:

1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα τηγάνια ως 2-3 εκ. και να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που κατά το χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.
3. Να μην υπερβαίνεται η δόση των 200 κ.εκ./στρ/έτος ή των 96 γραμ. δ.ο./στρ. έτος.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του σόργου, του γλυκού καλαμποκιού, του κεχριού, της κεχροσετάριας, του μπιζελιού, του κουκιού, της σόγιας και του λιναριού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.»

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αραβόσιτος (0500030), Ρύζι (0500060) Σόργο (0500080), Γλυκό καλαμπόκι (0234000), Κεχρί-Κεχροσετάρια (0500040), Σόγια (0401070), Λινάρι (0401010)	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Μπιζέλι με λοβό (0260030) Κουκί με λοβό (0260010)	35
Μπιζέλι χωρίς λοβό (0260040) Κουκί χωρίς λοβό (0260020)	43

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8104/107079/31.07.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ