



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.10.2025
Αριθ. πρωτ.: 285335

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: NUFARM GmbH & Co KG, Αυστρίας
(Δια της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ)
e-mail: info@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14661 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CARNADINE (acetamiprid 20% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3504/49178/31.05.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14661 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CARNADINE (acetamiprid 20% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 276327/10.10.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 14661 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CARNADINE (acetamiprid 20% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 3504/49178/31.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ	Φυλλοκνίστης <i>Phyllocnistis citrella</i> PHYNCI	50-70	35-50	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/30
Λεμονιά CIDLI	Πράσινη αφίδα <i>Aphis spiraecola</i> APHISI	35	25	60-140		
Μανταρινιά CIDNO	Αφίδα βαμβακιού <i>Aphis gossypii</i> APHIGO					
Γκρέιπφρουτ CIDPA	Μαύρη αφίδα <i>Toxoptera aurantia</i> TOXOAU					
Φράπα CIDGR	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO					
Λάιμ CIDAF	Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU	150	50-70	100-200		
	Παρλατόρια <i>Parlatoria pergandii</i> PARLPE					
	Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i> PSECCI					

Μηλοειδή Μηλιά ΜΑΒSD Αχλαδιά ΡΥUCO	Φυλλορύκτες <i>Phyllonorycter blancardella</i> LITHBL <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> PRYCCO <i>Leucoptera malifoliella</i> LEUCSC	25	25-35*	70-100*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/60
	Πράσινη αφίδα <i>Aphis pomi</i> APHIPO	25	15-25	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
	Ρόδινη αφίδα <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL Αφίδα αχλαδιού <i>Dysaphis pyri</i> DYSAPY	25	25	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
	Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO	25	35-50*	50-70*	Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	
	Οπλοκάμπη <i>Hoplocampa</i> sp. HOPLSP	25	35-50*	50-70*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
Ροδακινιά Νεκταρινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Πράσινη αφίδα <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Φυλλορύκτες <i>Leucoptera malifoliella</i> LEUCSC <i>Phyllonorycter blancardella</i> LITHBL Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	20	25-35*	55-80*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Αφίδες <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR <i>Brachycaudus</i> sp. ANURSI	20	25	80	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
	Θρίπες <i>Thrips meridionalis</i> THRIME	20	35-50*	40-55*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	

	Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> LASPMO Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	20	35-50*	40-55*	Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	
Δαμασκηλιά PRNDO	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Φυλλορύκτες <i>Leucoptera malifoliella</i> LEUCSC <i>Phyllonorycter</i> <i>blancardella</i> LITHBL	25	25	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/20
	Καρπόκαψα <i>Cydia funebrana</i> LASPFU	25	25	100	Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	
Κερασιά PRNAV	Ραγολέτις <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	35	25-35	100-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/14
	Μαύρη αφίδα <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE	25	15-25	100-150		
Ελιά Ελαιοποιήσιμη OLVEU	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL	50	50	50-100	Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών	2/14

	Δάκος της ελιάς <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50	25-50	50-100	προειδοποιήσεων Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.	
Ελιά επιτραπέζια OLVEU	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL	45	45	50-100	Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων	1
	Δάκος της ελιάς <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	45	45	50-100	Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.	
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	Τζιτζικάρια <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL	25	25-35*	70-100*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	25	35-45*	55-70*	Ψεκασμός κάλυψης σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις.	

Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ Βρωμούσα** <i>Halyomorpha halys</i> HALYHA	20		50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/20
Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf) Κάρδαμο LEPSA Γαιοκάρδαμο BARVE Ρόκα ERUVE Κόκκινο σινάπι BRSJU	Αφίδες <i>Nasonovia ribis-nigri</i> NASORN	25-35		50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Αφίδες <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	20-25		50-100		
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	10-15		40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/7
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU	20		30-60		
Τομάτα (Υ) LYPES	Πράσινη αφίδα <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU	20-25	20-25*	50-100*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	30	35-50*	60-85*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
Τομάτα (Θ) LYPES	Πράσινη αφίδα <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU	20-25	20-25*	50-100*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	25	35-50*	50-70*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	

	<i>Bemisia tabaci</i> BEMITA					
Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Πράσινη αφίδα <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU	20-25	20-25	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/20
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	35-50	35-50	100-170	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
Κουνουπίδι (Υ) BRSOB Μπρόκολο (Υ) BRSOK Λάχανο (Υ) BRSOL	Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA	25-35		50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Ελαιοκράμβη BRSNN	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR	25		10-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/7
	Σκαθάρι της γύρης <i>Meligethes aeneus</i> MELIAE <i>Phyllotreta atra</i> PHYEAT	30		10-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.
- Μην ψεκάσετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικοινωνία.
- Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ/100 λιτ.ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

*Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο στρέμμα.

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού και κατά της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, κερασιάς, ελιάς, μελιτζάνας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3504/49178/31.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ