



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23/3/2022

Αριθ. Πρωτ.: 12784/356582π.ε.

Ταχ. Δ/νση :Λεωφ. Α. Συγγρού 150
Πληροφορίες 176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο :Μ.Γάσπαρη
E-mail :210 – 928 7250
:mgaspari@minagric.gr

ΠΡΟΣ: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
Τ.Κ. 15125 , Μαρούσι
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60789 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CENTURY SL (δ.ο. potassium phosphonate 755g/L) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1807 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acibenzolar-S-methyl, το υδατικό εκχύλισμα από βλαστημένους σπόρους του γλυκού *Lupinus albus* και τις ουσίες azoxystrobin, clorpyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, **fosetyl**, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozide και thiabendazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
4. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8206/108570/21-12-2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60789 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CENTURY SL (δ.ο. potassium phosphonate 755g/L), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 12784/356582/9-12-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 31/1/2022 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60789** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CENTURY SL (δ.ο. potassium phosphonate 755g/L), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 8206/108570/21-12-2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **4, 5, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Μυκητοκτόνο. Περιέχει τη δραστική ουσία potassium phosphonates η οποία περιορίζει την ανάπτυξη του μύκητα και ενεργοποιεί τους φυσιολογικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών παρεμποδίζοντας έτσι την εξάπλωση της προσβολής.
----------	------------------------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα εφαρμογών
		Κ.εκ./ στρέμμα (max)	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλοειδή Μηλιά (ΜΑΒΡΜ) Αχλαδιά (ΡΥΥΟΟ) Κυδωνιά (ΟΥΔΟΒ)	<u>Φουζικλάδιο</u> <i>Venturia inaequalis</i> , (ΟΕΝΤΙΝ), <i>Venturia pyrina</i> (ΟΕΝΤΠΙ)	186	155-930	20-120	Προληπτικές εφαρμογές, στο διάστημα από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (ΒΒΟΗ: 53-81)	6/5-10 ημέρες.
Λωτός (ΔΟΟΚΑ) (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ΑΛΤΕΟΠ)	400	266.6-2000	20-150	Προληπτικές εφαρμογές, από την αρχή της άνθισης έως και την πλήρη ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (ΒΒΟΗ: 53-87)	4/5 ημέρες.
Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι (ΝΝΝΖΖ) (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)	Φυτόφθορα <i>Phytophthora sp.</i> (ΡΗΥΤΟΠ)	186 <i>Έγχυση 4 κ.εκ./ δέντρο</i>	155-930	20-120	Ψεκασμοί/ έγχυση (στα δέντρα) την άνοιξη έως το φθινόπωρο	6/ 5-10 ημέρες Εγχύσεις: 1

<p>Καστανιά (CSNSA) Φουντουκιά (CYLAV) Καρυδιά (IUGRE)</p> <p>(Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)</p>	<p>Φυτόφθορα <i>Phytophthora spp</i> (PHYTSP) Βακτηρίωση <i>Xanthomonas arboricola pv juglandis</i> (XANTJU) Ανθράκνωση <i>Gnomonia leptostyla</i> (GNOMLE) και <i>Colletotrichum sp.</i> (COLLSP) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP)</p>	400	200-2000	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές, από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 09-85)</p>	<p>6/5</p> <p>Ειδικά για Φυτόφθορα κάνετε συνολικά 4 εφαρμογές ανά 5 ημέρες . 2 εφαρμογές από το τέλος της άνθισης έως και την έναρξη του σχηματισμού των καρπών (BBCH: 68-71) και 2 εφαρμογές κατά την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 83-85).</p> <p>Για Βακτηρίωση και Ανθράκνωση κάνετε 4 εφαρμογές ανά 5 ημέρες από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι και το τέλος της άνθισης (BBCH: 09-69).</p>
<p>Αμυγδαλιά (PRNDU) Φιστικιά (PIAVE)</p> <p>(Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)</p>	<p>Βοτρύτης <i>Botryosphaeria dothidea</i> (BOTSDO) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP) Φυτόφθορα <i>Phytophthora spp</i> (PHYTSP)</p>	400	200-2000	20-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές, από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 09-85)</p>	6/5 ημέρες.
<p>Ροδιά (PUNGR)</p> <p>(Χρήση Ήσσονος Σημασίας)</p>	<p>Βοτρύτης <i>Botrytis spp.</i> (BOTRSP) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP) Φυτόφθορα <i>Phytophthora spp.</i> (PHYTSP)</p>	240	120-342,8	70-200	<p>Προληπτικές εφαρμογές, από την αρχή της άνθισης έως ότου οι καρποί φτάσουν στο 50% του τελικού τους μεγέθους, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την</p>	3/14 ημέρες.

					ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 61-75)	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

Παρατηρήσεις:

1. Συνδυάζεται πάντα σε μείγματα βυτίου με μυκητοκτόνο επαφής όπως τα DELAN 70 WG (dithianon 70% β/β), POLYRAM WG (metiram 80% β/β), MERPAN 80 WG (captan 80% β/β), για να επιτυγχάνεται η καλύτερη προστασία των φυτών.
2. Σε περίπτωση ανάμιξης να ακολουθείται ο μεγαλύτερος χρόνος επέμβασης πριν τη συγκομιδή και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.
3. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
4. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
«Φοράτε προστατευτική ενδυμασία σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό στο πεδίο εφαρμογής.»

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τις καλλιέργειες των ακρόδρυων (καστανιάς, φουντουκιάς, καρυδιάς, αμυγδαλιάς, και φιστικιάς) μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	35
Λωτός	7
Καστανιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά	21
Ροδιά	70

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8206/108570/21-12-2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ