



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.06.2026
Αριθ. πρωτ: 169033

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)
CONAXIS L (δ.ο. dimethenamid -P 40 % β/ο, clomazone 5 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 2026/1123 της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.
 - δ) (ΕΕ) αριθ. 2019/1137 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2019 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **dimethenamid-P**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
 - ε) (ΕΕ) 2025/787 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ... **clomazone**...
 - στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και

τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ)».
4. Την από 04/2026 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 106/27.4.2026).
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339/14.05.25).
6. Τις αρ. πρωτ. 10763/299111/03.10.2021, 113778/315861/16.10.2024, 178573/03.07.2025, 161633/22.06.2026 και αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **CONAXIS L (δ.ο. dimethenamid -P 40 % β/ο, clomazone 5 % β/ο)**, της εταιρείας **BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

70636

29.06.2026

30.09.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

CONAXIS L

Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

dimethenamid-P

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

93 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Χλωροακεταμίδια

Παρασκευαστής της δ.ο. :

BASF Agricultural Solutions US LLC
2 TW Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27713
Η.Π.Α.

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

BASF Agricultural Solutions US LLC
14385 West Port Arthur Road
77705 Beaumont
Η.Π.Α.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 10763/299111/03.10.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

clomazone

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96,5 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Ισοξαζολιδινόνες

Παρασκευαστής της δ.ο. :

SIPCAM OXON S.P.A.
Via Sempione 195
20016 Pero (Milan),
Ιταλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

SIPCAM OXON S.P.A.
Strada provincial Km 2.6,
27030 Mezzana Bigli (PV), Ιταλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 10763/299111/03.10.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6860100
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6860100
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6860100
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH

Speyerer Strasse 2
67117 Limburgerhof
Γερμανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. BASF Agri-Production S.A.S.

Site Industriel Leurette, Route du Vieux Chemin de Loon, 59820
Gravelines, Γαλλία

2. BASF Agricultural Solutions US LLC

3150 Highway JJ277
63461 Palmyra (MO), Η.Π.Α.

3. Schirm GmbH

Halchtersche Str. 33
38304 Wolfenbuettel, Γερμανία

4. Schirm GmbH Standort Lübeck

Mecklenburger Straße 229
23568 Luebeck, Γερμανία

5. Schirm GmbH Standort Schönebeck

Geschwister Scholl Strasse 127
39218 Schoenebeck (Elbe), Γερμανία

6. IPT Pergande GmbH

Wilfried Pergande Platz 1
06369 Weißandt Goelzau
Γερμανία

7. SIPCAM OXON S.P.A.

Via Sempione, 195
20016, Pero (MI), Ιταλία

8. BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH

Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

9. Torre srl unipersonale

v Pian d'Asso
53024, Torrenieri (Si), Ιταλία

10. BASF Agricultural Solutions Western Canada Inc.
295 Henderson Drive
Saskatchewan
S4N 6C2, Regina, Καναδάς

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. BASF Agri-Production S.A.S.
Site Industriel Leurette, Route du Vieux Chemin de Loon, 59820
Gravelines, Γαλλία

2. BASF Agricultural Solutions US LLC
3150 Highway JJ277
63461 Palmyra (MO), Η.Π.Α.

3. Schirm GmbH
Halchtersche Str. 33
38304 Wolfenbuettel, Γερμανία

4. Schirm GmbH Standort Lübeck
Mecklenburger Straße 229
23568 Luebeck, Γερμανία

5. Schirm GmbH Standort Schönebeck
Geschwister Scholl Strasse 127
39218 Schoenebeck (Elbe), Γερμανία

6. IPT Pergande GmbH
Wilfried Pergande Platz 1
06369 Weißandt Goetzau, Γερμανία

7. SIPCAM OXON S.P.A.
Via Sempione, 195
20016, Pero (MI), Ιταλία

8. BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH
Carl Bosch Strasse 38
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

9. Torre srl unipersonale
v Pian d'Asso
53024, Torrenieri (Si), Ιταλία

10. BASF Agricultural Solutions Western Canada Inc.
295 Henderson Drive
Saskatchewan
S4N 6C2, Regina, Καναδάς

11. K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.,
570 22 ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: dimethenamid -P 40 % β/ο
clomazone 5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 56,74 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 10763/299111/03.10.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	150 κ.εκ. έως 1 λίτρο	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - HDPE
2.	Δοχείο	2 έως 20 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείτε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά στους 1100°C για 2 δευτερόλεπτα.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο με δράση προφυτρωτική ή νωρίς μεταφυτρωτική της καλλιέργειας για τον έλεγχο αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Περιέχει τα δραστικά συστατικά dimethenamid-p και clomazone. Το dimethenamid-p ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και, σε κυτταρικό επίπεδο, παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση λιπιδίων και κατά συνέπεια τη βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων. Το clomazone ανήκει στην ομάδα των ισοξαζολιδινονών και παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και

καροτενοϊδών προκαλώντας χαρακτηριστική χλώρωση και λεύκανση των ευαίσθητων ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Σόγια GLXMA	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽¹⁾	100-125	-	10-40	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιεργείας, μέχρι το στάδιο εμφάνισης των κοτυληδόνων (BBCH 00-09)	1 εφαρμογή <u>ανά 2 χρόνια</u>
Κουκιά ανοιξιάτικα (όσπρια) VICFM, VICFX	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽¹⁾	100-125	-	10-40	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιεργείας, μέχρι το στάδιο εμφάνισης των κοτυληδόνων (BBCH 00-09)	1 εφαρμογή <u>ανά 3 χρόνια</u>
Κουκιά χειμερινά (όσπρια) VICFM, VICFX	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽¹⁾	100		10-40	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιεργείας, μέχρι το στάδιο εμφάνισης των κοτυληδόνων (BBCH 00-09)	1 εφαρμογή <u>ανά 2 χρόνια</u>
Ηλιάνθος HELAN	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽²⁾	100-125	-	10-40	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιεργείας, μέχρι το στάδιο εμφάνισης των κοτυληδόνων (BBCH 00-09)	1 εφαρμογή <u>ανά 3 χρόνια</u>
Βαμβάκι (GOSHI)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽²⁾	100-150	-	10-40	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιεργείας, μέχρι το στάδιο εμφάνισης των κοτυληδόνων (BBCH 00-09)	1 ανά έτος
Πατάτα (SOLTU)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ⁽³⁾	100-150	-	10-40	Προφυτρωτική εφαρμογή πριν την εμφάνιση των βλαστών στην επιφάνεια μετά το αυλάκωμα/ παράχωμα (BBCH 00-08)	1 εφαρμογή <u>ανά 3 χρόνια</u>
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:						

(1) Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

-Στη δόση των 100 κ.εκ./στρ. στις καλλιέργειες Σόγια, Ανοιξιότικα και Χειμερινά Κουκιά

α) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU),
Βερόνικα (*Veronica persica* - VERPE)

β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Αγριομπαμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH),
Χοιροβότανο (*Picris* sp. - PICSS),
Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL),
Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI),
Σετάρια (*Setaria* sp. - SETSS)

-Στη δόση των 125 κ.εκ./στρ. στις καλλιέργειες Σόγια και Ανοιξιότικων Κουκιών

α) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Αγριομπαμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH),
Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
Χοιροβότανο (*Picris* sp. - PICSS),
Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU),
Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI),
Βερόνικα (*Veronica persica* - VERPE)

β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL),
Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL),
Σετάρια (*Setaria* sp. - SETSS)

(2) Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

-Στη δόση των 100 κ.εκ./στρ. στις καλλιέργειες Ηλίανθου και Βαμβακιού:

α) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL),
Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU)

β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Βλήτα (*Amaranthus* spp. - AMASS),
Λουβουδιά (*Chenopodium* spp. - CHESS),
Διπλόταξις (*Diploaxis viminea* - DIPVI)
Σετάρια (*Setaria* spp. - SETSS),
Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)

-Στη δόση των 150 κ.εκ./στρ. μόνο στην καλλιέργεια του Βαμβακιού:

α) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Βλήτα (*Amaranthus* spp. - AMASS),
Λουβουδιά (*Chenopodium* spp. - CHESS),
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL),

Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU),
 Σετάρια (*Setaria* spp. - SETSS),
 Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)

β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
 Διπλόταξις (*Diploptaxis viminea* – DIPVI)

(3) Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη καλλιέργεια: Πατάτα

-Στη δόση των 100 κ.εκ./στρ.

α) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Βλήτα (*Amaranthus* spp. - AMASS),
 Λουβουδιά (*Chenopodium* spp. – CHESS),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
 Καπνόχορτο (*Fumaria* spp. - FUMSS)
 Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine* – GALAP),
 Τριφύλλι κίτρινο (*Medicago lupulina* - MEDLU),
 Πολυκόμπι, Αγριοπιπεριά, Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Polygonum* spp. - POLSS)
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL),
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU)
 Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)

β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
 Κύπερη πορφυρή (*Cyperus rotundus* - CYPRO)

-Στη δόση των 150 κ.εκ./στρ.

α) Ευαίσθητα ζιζάνια:

Βλήτα (*Amaranthus* spp. - AMASS),
 Λουβουδιά (*Chenopodium* spp. - CHESS),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),
 Καπνόχορτο (*Fumaria* spp. - FUMSS)
 Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine* - GALAP)
 Τριφύλλι κίτρινο (*Medicago lupulina* - MEDLU),
 Πολυκόμπι, Αγριοπιπεριά, Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Polygonum* spp. - POLSS)
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL),
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU)
 Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)

β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
 Κύπερη πορφυρή (*Cyperus rotundus* - CYPRO)
 Τσουκνίδα μικρή (*Urtica urens* - URTUR)

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Να γίνει σωστή προετοιμασία του εδάφους πριν την σπορά της καλλιέργειας (ψιλοχωματισμένο έδαφος).
- Η σπορά γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 3 εκατοστών.
- Να μην γίνεται εφαρμογή του προϊόντος όταν αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση τις επόμενες ημέρες.
- Να μην γίνεται εφαρμογή του προϊόντος σε αμμώδη εδάφη.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες **dimethenamid-P** και **clomazone**, οι οποίες ανήκουν στις **ομάδες 15** και **13**, αντίστοιχα κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή

την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της φθινοπωρινής καλλιέργειας, μπορεί να γίνει σπορά:

- χειμερινών σιτηρών, μετά από 45 ημέρες μετά από βαθιά εδαφοκατεργασία και αυξημένο αριθμό σπόρων ανά γραμμή.
- φθινοπωρινής ελαιοκράμβης, μετά από 3 εβδομάδες μετά από βαθιά εδαφοκατεργασία
- ψυχανθών, ζαχαροτεύτλων, αραβόσιτου, σόργου και ηλίανθου την επόμενη άνοιξη.
- ανοιξιιάτικων χορτοδοτικών σιτηρών την επομένη άνοιξη μετά κατεργασία του εδάφους σε μέτριο βάθος
- τριφυλλιού και μηδικής, την επόμενη άνοιξη μετά από βαθιά εδαφοκατεργασία.

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανοιξιιάτικης καλλιέργειας, μπορεί να γίνει σπορά:

- αραβόσιτου, σόργου, αρακά, φασολιού και σόγιας, μετά από 1 μήνα με κατεργασία του εδάφους σε μέτριο βάθος.
 - ηλίανθου, μετά από 45 ημέρες μετά από βαθιά εδαφοκατεργασία
- Η σπορά ζαχαροτεύτλων, τριφυλλιού και μηδικής δεν συστήνεται.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε συνέχεια της φθινοπωρινής καλλιέργειας, μπορούν να ακολουθήσουν χειμερινά σιτηρά, ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος, σόργο, αρακάς, φασόλι, σόγια, ηλίανθος, τριφύλλι, μηδική και ελαιοκράμβη χωρίς περιορισμό.

Σε συνέχεια της ανοιξιιάτικης καλλιέργειας, μπορούν να ακολουθήσουν:

- ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος, σόργο, αρακάς, φασόλι, σόγια, ηλίανθος και ελαιοκράμβη χωρίς περιορισμό.
- για την σπορά χειμερινών σιτηρών συστήνεται αναμονή 3 μηνών και επιφανειακή κατεργασία του εδάφους.
- για την σπορά τριφυλλιού και ανοιξιιάτικων χορτοδοτικών φυτών συστήνεται αναμονή 3 μηνών με βαθιά εδαφοκατεργασία .

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής,

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 Περιέχει dimethenamid-P, clomazone, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 1,2-benzisothiazolin-3-one.
ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/αέρια/ σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα.
P264: Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος, προσεκτικά μετά το χειρισμό.
P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρουχισμό και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

Χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε:

- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια της σόγιας, χειμερινών κουκιών και
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της πατάτας, των ανοιξιότικων κουκιών και του ηλίανθου, από τα επιφανειακά ύδατα.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P301+312+P330: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
: Ξεπλύνετε το στόμα.

P302+P352+P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ : Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο εφαρμογής	Ημέρες
Σόγια (0401070), Όσπρια Κουκιά (0300010), Βαμβάκι (0401090), Ηλίανθος (0401050), Πατάτα (0211000)	Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες μικρότερες των 40°C, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ