



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.07.2025  
Αρ. Πρωτ. 200860

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη

Προς: Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενίας  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας, ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

Τηλέφωνο: 210 9287228  
e-mail: [abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60821 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DIAGONAL (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο), ως προς τους παρασκευαστές της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την επικαιροποίηση της εγγυημένης σύνθεσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Τη με αριθ. πρωτ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
- Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
- ην αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.05.25).
- Την έκθεση αξιολόγησης ισοδυναμίας εργοστασίου παρασκευής της δ.ο. azoxystrobin από την εισηγήτρια χώρα: Ολλανδία (Μάιος 2019).
- Την έκθεση αξιολόγησης ισοδυναμίας εργοστασίου παρασκευής της δ.ο. azoxystrobin από την εισηγήτρια χώρα: Γαλλία (Ιούλιος 2017).

8. Την έκθεση αξιολόγησης ισοδυναμίας εργοστασίου παρασκευής της δ.ο. azoxystrobin από την εισηγήτρια χώρα: Πολωνία (Νοέμβριος 2022).
9. Την αριθμ. 9636/127239π.ε./15.01.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60821 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DIAGONAL (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τις με αρ. πρωτ. 10806/300867/04.10.2024 και 189399/14.07.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60821** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **DIAGONAL (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 9636/127239π.ε./15.01.2019 απόφασή μας, ως προς τους παρασκευαστές της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την επικαιροποίηση της εγγυημένης σύνθεσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Τα σημεία **1.3** και **1.4δ, ε, στ, 5 και 8** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Azoxystrobin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97,5% β/β min

Χημική ομάδα:

Στρομπιλουρίνες

Παρασκευαστές της δ.ο.:

1. ALBAUGH EUROPE SARL  
World Trade Center, Avenue Gratta Paille 2,  
1018 Lausanne, Ελβετία
2. CAC Chemical GmbH  
Boettgerstrasse 12, 20148 Hamburg,  
Γερμανία
3. Lianyungang Liben Crop Science Co. Ltd  
(LIBEN)  
Lianyungang Chemical Park, Duigougang  
Town Guannan Country, Lianyungang  
Jiangsu, Κίνα
4. Leeds Lifescience Ltd.  
103 High Street, Waltham Cross, EN8 7AN,  
Ηνωμένο Βασίλειο
5. Rotam Agrochemical Europe Limited  
Mabeldon Place, London WC1H 9BB,  
Ηνωμένο Βασίλειο

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Shangyu Nutrichem Co Ltd  
No. 9 Weijiu Road, Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone,  
Zhejiang, 312369, Κίνα
2. CAC Nantong Chemical Co., Ltd.

Yangkou Chemical Industrial-Park, Rudong County, Jiangsu, Κίνα

**3. Lianyungang Liben Crop Science Co. Ltd (LIBEN)**  
Lianyungang Chemical Park, Duigougang Town Guannan Country, Lianyungang Jiangsu, Κίνα

**4. Parijat Industries (India) Pvt. Ltd.**  
Village-Khera Gani, Near-Village Fatehgarth Raipur Rani Road, Distt. Ambala (Haryana), Ινδία

**5. Hebei Veyong Bio-Chemical Co. Ltd.**  
No 6, Middle Huagong Road, Circulation Chemical Industry Park, Shijiazhuang City, Hebei, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας azoxystrobin, όπως προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 6501/107984/06.09.2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τροποποιήθηκαν με τις με αριθμό 12459/344252/02.12.2021 και **10806/300867/04.10.2024 αιτήσεις** της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Albaugh TKI d.o.o.  
Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία
2. Industrias Afrasa, S.A.  
Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad de Sevilla, 53, E46988 - Paterna, Valencia, Ισπανία
3. Laboratorios Sirga, S.A.  
C/Jaime I, 7, 46560, Polígono Industrial Mediterráneo, Massalfassar, Valencia, Ισπανία
4. BAC d.o.o.  
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Albaugh TKI d.o.o.  
Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία
2. Industrias Afrasa, S.A.  
Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad de Sevilla, 53, E46988 - Paterna, Valencia, Ισπανία
3. Laboratorios Sirga, S.A.  
C/Jaime I, 7, 46560, Polígono Industrial Mediterráneo, Massalfassar, Valencia, Ισπανία
4. BAC d.o.o.  
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Azoxystrobin 25% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: **76,48% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 6501/107984/06.09.2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 12459/344252/02.12.2021 **και 10806/300867/04.10.2024 αιτήσεις** της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

| 5 Φάσμα δράσης                                                       |                                                 |                            |                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Πεδίο Εφαρμογής                                                      | Στόχος                                          | Δόσεις σκευάσματος         |                | Χρόνος εφαρμογής                                                                                                                                                                                                   | Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες |
|                                                                      |                                                 | Όγκος ψεκ. Υγρού (λ./στρ.) | κ.εκ. σκ./στρ. |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Τομάτα LYPES (Θερμοκηπίου)                                           | Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)     | 50-100                     | 80             | Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, <b>από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών</b> (BBCH 51-89)                                                                  | 1-2/ 10                                                                       |
| Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)* (SOLME)<br><br>χρήση ήσσονος σημασίας       | Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)     | 50-100                     | 80             | Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, <b>από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (οι καρποί να έχουν αποκτήσει το τυπικό για την ποικιλία τους χρώμα)</b> (BBCH 51-89) | 1-2/ 10                                                                       |
| Αγγούρι (CUMSA), Αγγουράκι (CUMSG), Κολοκυθάκι (CUUPG) (Θερμοκηπίου) | Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU) | 50-100                     | 80             | Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, <b>από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών</b> (BBCH 51-89)                                                                      | 1-3 /10                                                                       |
| Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUPE)                   | Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU) | 50-100                     | 80             | Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων <b>από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών</b> (BBCH 51-89)                                                                       | 1-3 /10                                                                       |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (Θερμοκηπίου)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Ρύζι (ORYSA)                                                                                                                                                                       | Πυρικούλάρια<br>( <i>Pyricularia oryzae</i> -<br>PYRIOR)<br>Ελμινθοσπορίωση<br>( <i>Helminthosporium</i><br>sp. - HELMSP)                           | 20-40 | 100    | Μία εφαρμογή από την<br>έναρξη της έκπτυξης<br>του φύλλου σημαίας<br>έως πριν την πλήρη<br>ωρίμανση<br>(BBCH 43-87)                                                                                                                          | 1      |
| Πατάτα<br>(SOLTU)                                                                                                                                                                  | Αλτερναρίωση<br>( <i>Alternaria solani</i> -<br>ALTESO)                                                                                             | 20-60 | 50     | Ψεκασμός<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των πρώτων<br>συμπτωμάτων, από το<br>στάδιο εμφάνισης της<br>1 <sup>ης</sup> ταξιανθίας έως<br>τον μεταχρωματισμό<br>των καρπών της 1 <sup>ης</sup><br>ταξιανθίας<br>(BBCH 51-85) | 1-2/14 |
| <u>Ψυχανθή:</u><br>Μπιζέλια με<br>λοβό (PIBSX)<br>Μπιζέλια χωρίς<br>λοβό (PIBSX),<br><br><u>Όσπρια:</u><br>Μπιζέλια<br>(PISBX)                                                     | Ασκοχύτωση<br>( <i>Ascochyta pisi</i> -<br>ASCOPI)<br><br><u>Χρήση ήσσονος<br/>σημασίας:</u><br>Σκωρίαση<br>( <i>Uromyces pisi</i> ** -<br>UROMPS)  | 15-80 | 80-100 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των πρώτων<br>συμπτωμάτων, από την<br>εμφάνιση του 7 <sup>ου</sup><br>φύλλου/ έλικα έως<br>ότου το 20% των λοβών<br>έχουν φθάσει το τυπικό<br>τους μέγεθος.<br>(BBCH 17-72)       | 1-2/10 |
| <u>Ψυχανθή:</u><br>Φασόλια με<br>λοβό (PHSVX)<br>Φασόλια χωρίς<br>λοβό (PHSVX),<br>Κουκιά<br>(φρέσκα)<br>(VICFX)<br><br><u>Όσπρια:</u><br>Φασόλια<br>(PHSVX),<br>Κουκιά<br>(VICFX) | Ασκοχύτωση<br>( <i>Ascochyta fabae</i> -<br>ASCOFA)<br><br><u>Χρήση ήσσονος<br/>σημασίας:</u><br>Σκωρίαση<br>( <i>Uromyces pisi</i> ** -<br>UROMPS) | 15-80 | 80-100 | Ψεκασμοί φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των πρώτων<br>συμπτωμάτων, από την<br>εμφάνιση του πρώτου<br>πλάγιου βλαστού έως<br>οι λοβοί αποκτήσουν το<br>τυπικό τους μέγεθος.<br>(BBCH 20-79)                                   | 1-2/10 |
| Πυτεριά (Θ)<br>(CPSAN)                                                                                                                                                             | Ωίδιο<br>( <i>Leveillula</i><br><i>taurica</i> -<br>LEVETA)                                                                                         | 30-60 | 80-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των πρώτων<br>συμπτωμάτων, από την<br>εμφάνιση των πρώτων<br>ταξιανθιών έως την<br>πλήρη ωρίμανση των<br>καρπών.<br>(BBCH 51-89)                                                  | 1-2/10 |
| Μπρόκολο*<br>(BRSOK)                                                                                                                                                               | Περονόσπορος<br>( <i>Peronospora</i>                                                                                                                | 30-60 | 80-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος.                                                                                                                                                                                                                      | 1-2/10 |

|                                                      |                                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (χρήση ήσσονος σημασίας)                             | <i>parasitica</i> -<br>PEROPA)                                   |        |        | Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο έναρξης σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει στο 80% του τυπικού μεγέθους και μορφής (BBCH 41-48)                              |            |
| Αγκινάρα*<br>(CYUSC)<br><br>(χρήση ήσσονος σημασίας) | Οίδιο<br>( <i>Leveillula taurica</i> -<br>LEVETA)                | 30-60  | 80-100 | Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ψεκασμός φυλλώματος <b>από όταν έχει αναπτυχθεί το 10% της μέγιστης φυλλικής μάζας</b> μέχρι την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής) (BBCH 41-55) | 1-2/10     |
| Λωτός*<br>(DOSKA)<br><br>(χρήση ήσσονος σημασίας)    | Μυκοσφαιρέλα<br>( <i>Mycosphaerella</i><br><i>nawae</i> -MYCONA) | 50-100 | 80-100 | Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH 60-69)                                                                                   | 1-2/10     |
| Ελαιοκράμβη<br>(BRSNN)                               | Αλτερναρίωση<br>( <i>Alternaria sp.</i> -<br>ALTESP)             | 20-40  | 100    | Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων. (BBCH 60-67)                                                         | 1-2/ 10-14 |

**Παρατηρήσεις:**

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.
2. Μπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση στη γεύση του ραφινάρισμένου λαδιού καλλιέργειας ελαιοκράμβης στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Μελιτζάνας (Θ), του μπρόκολου, της Αγκινάρας και του λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

\*\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη σκωρίαση στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, μπιζέλια (όσπρια), φασόλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κουκιά (φρέσκα), φασόλια (όσπρια) και στα κουκιά (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**8** Στοιχεία  
φυτοτοξικότητας,

1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας και μελιτζάνας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη

ευαισθησίας  
ποικιλιών και κάθε  
άλλης παρενέργειας  
στα φυτά ή τα  
προϊόντα τους

- σπορά.
2. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας **και μελιτζάνας (Θ)** υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90%) ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30°C).
  3. Το σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
  4. Να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκευάσματος πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 9636/127239π.ε./15.01.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

**ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**