



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.07.2025
Αρ. Πρωτ. 196795

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 9287228

Προς: LAINCO, S.A., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»,
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
email: info@agribiz.gr

e-mail: abratidou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14916 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΕΙΝΑ (δ.ο. Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.05.25).
- Την από 05/2025 Σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΕΜΠ 808/28.05.2025).
- Την αριθμ. 87827/02.04.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14916 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΕΙΝΑ (δ.ο. Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο).
- Τις αριθμ. 403399/20.12.2024 και 167797/23.06.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **14916** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΕΙΝΑ (δ.ο. Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 87827/02.04.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5, 13 και 17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Γκρεϊπ-φρουτ (CIDPA), Μανταρινιά (CIDRE), Λεμονιά (CIDLI) Λάιμ (CIDAF)	Αφίδες: <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	500-600	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. (BBCH 70 - 95)	2/7
	Αλευρώδεις: <i>Aleurothrixus floccosus</i> (ALTHFL)	800-1000			3/7
Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO) Κυδωνιά (CYDOB) Ιαπωνική μουσμουλιά (ΕΙΟJA)	Αφίδες: <i>Aphis pomi</i> (APHIPO)	500-600	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. (BBCH 70 - 95)	2/7
Αχλαδιά (PYUCO)	Ψύλλα της Αχλαδιάς <i>Cacopsylla pyri</i> (PSYLPPI)	800-1000	80-100		3/7
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά (PRNAR), Ροδακινιά (PRNPS) Δασμασκηνιά (PRNDO)	Αφίδες: <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	500-600	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. (BBCH 70 - 95)	2/7
Λωτός (DOSKA)	Αλευρώδεις: <i>Dialeurodes citri</i> (DIALCI)	800-1000	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από το τέλος της άνθησης έως και πριν το λήθαργο. (BBCH 70 - 95)	3/7
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ): Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Πιπεριά	Αλευρώδεις: <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	1000	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από την εμφάνιση του 3ου φύλλου έως	3/7

(CPSAN)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	600	80-100	την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13-89)	2/7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με μη βρώσιμο φλοιό (Θ): Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUMA)	Αλευρώδεις: <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> (TRIAVA)	1000	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από την εμφάνιση του 3ου φύλλου έως	3/7
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	600	80-100	την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13-89)	2/7
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με βρώσιμο φλοιό (Θ): Αγγούρι (CUMSA) Κολοκύθι (CUUPG)	Αλευρώδεις: <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> (TRIAVA)	1000	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Από την εμφάνιση του 3ου φύλλου έως	3/7
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	600	80-100	την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13-89)	2/7
Παρατηρήσεις: 1. Η δόση είναι ανάλογη με την πίεση της προσβολής. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα. 2. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN), η χρήση στην Πορτοκαλιά περιλαμβάνει και τη Νεραντζιά (CIDAU), η χρήση στην Τομάτα περιλαμβάνει το Γκότζι μπέρι (LYUHA, LYUCN) και τη Φυσαλίδα (PHYPE, PHYIX). 3. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες της Βερικοκιάς και της Δαμασκηλιάς. 4. Στα Εσπεριδοειδή, στα Σολανώδη (Θ), στα Κολοκυνθοειδή (Θ) με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό, να πραγματοποιούνται <u>έως 3 εφαρμογές</u> ανά καλλιεργητική περίοδο.					

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Ημέρες
[Πορτοκαλιά, Νεραντζιά (0110020)], Γκρέιπφρουτ (0110010), Μανταρινιά (0110050), Λεμονιά (0110030), Λάιμ (0110040)	Μη εφαρμόσιμο
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Ιαπωνική Μουσμουλιά (0130050)	
[Ροδακινιά, Νεκταρινιά (0140030)], Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηλιά (0140040)	
Λωτός (0161060)	

[Τομάτα (Θ), Γκότζι μπερί (Θ), Φυσαλίδα (Θ) (0231010)], Μελιτζάνα (Θ) (0231030), Πιπεριά (Θ) (0231020)	
Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ) (0233030), Κολοκύθα (Θ) (0233020), Αγγούρι (Θ) (0232010), Κολοκύθι (Θ) (0232030)	

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα :

--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 87827/02.04.2025 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ