



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25.09.2026
Αριθ. πρωτ.: 245580

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74, Καλλιθέα
e-mail: Kornilia.Mitsopoulou@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14883 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EXIREL 10 SE (cyantraniliprole 10% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 4901/123404/10.10.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14883 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EXIREL 10 SE (cyantraniliprole 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 237788/17.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 14883 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EXIREL 10 SE (cyantraniliprole 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 4901/123404/10.10.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Πράσινα λεμόνια (lime) CIDAF	Λεπιδόπτερα <i>Prays citri</i> PRAYC	25-50	-	30-200	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από την έκπτυξη των βλαστών έως πριν την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών BBCH 31-50	1 ανά τρία χρόνια
	Λεπιδόπτερα <i>Phyllocnistis citrella</i> PHYNC	40-74	-	30-185	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την έκπτυξη των βλαστών έως πριν την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών. BBCH 31-50	
	Αφίδες <i>Aphis spiraecola</i> APHISI <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	74	-	74-99	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από το στάδιο όπου είναι ορατές οι κορυφές των φύλλων στους οφθαλμούς έως την πλήρη ανάπτυξη των βλαστών BBCH 09-39	
	Θρίπες <i>Pezothrips kellyanus</i> PEZTKE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Αλευρώδης** <i>Parabemisia myricae</i> PRABMY Ψύλλα των εσπεριδοειδών** <i>Trioza erytreae</i> TRIZER Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης** <i>Aleurocanthus spiniferus</i> ALECSN Ασιατική ψύλλα των	74	-	74-99	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών έως την καρπόδεση BBCH 51-71	

	εσπεριδοειδών** <i>Diaphorina citri</i> DIAACI					
	Δίπτερα <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	74	--	74-99	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την καρπόδεση (οι καρποί έχουν αποκτήσει το 40% του μεγέθους) έως και την έναρξη του χρωματισμού των καρπών BBCH 74-82	
	Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL <i>Dialeurodes citri</i> DIALCI	74	--	74-200	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την καρπόδεση BBCH 51-72	
Ελιά OLVEU	Λεπιδόπτερα <i>Prays oleae</i> PRAYOL	20-35	-	70-175	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από το στάδιο όπου οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι ακόμα κλειστοί έως την έναρξη της ωρίμανσης BBCH 50-81	2 ανά τρία χρόνια (με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες)
Αμπέλι οινοποιήσιμο VITVI	Λεπιδόπτερα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	34	-	57-68	Ψεκασμός στην ζώνη των τσαμπιών στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από την καρπόδεση (οι νεαροί καρποί αρχίζουν να διογκώνονται, τα υπολείμματα των λουλουδιών χάνονται) μέχρι το μαλάκωμα των ρωγών BBCH 71-85	1 ανά τρία χρόνια
Κερασιά* PRNAV Χρήση ήσσονος σημασίας	Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU Ραγολέτιδα <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE	-	74	74-99	Από το στάδιο όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 90% του μεγέθους του έως την ωρίμαση των καρπών. BBCH 79-87	1 ανά τρία χρόνια
Ροδακινιά PRNSS	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i>	-	74	74-99	Από το τέλος της άνθησης έως την ωρίμαση των καρπών. BBCH 69-87	1 ανά τρία χρόνια

	DROSSU					
Αραβόσιτος ZEAMX (και για ενσίρωση)	Οστρίνια <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	40		30-80	Μία εφαρμογή: Από το πρώιμο στάδιο εκκίνησης (το περίβλημα των φύλλων της σημαίας επεκτείνεται) έως το τέλος της κεφαλής (ταξιανθία πλήρως ανεπτυγμένη) BBCH 40-59	1 ανά τρία χρόνια (δόση 40 κ.εκ./στρ.)
	Σεσάμια <i>Sesamia</i> sp. SESASP	ή 50			ή Από την υδαρή ωρίμανση (οι πρώτοι κόκκοι έχουν φτάσει στο μισό του τελικού τους μεγέθους) έως την αρχή της ωρίμανσης BBCH 71-83	ή 1 ανά τέσσερα χρόνια (δόση 50 κ.εκ./στρ.)

Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό καταπόνηση.
2. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τη φράπα.
3. Η χρήση στη πορτοκαλιά περιλαμβάνει και το περγαμόντο, τη νεραντζιά και το σαγκουίνι.
4. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει και το κιτρολέμονο.
5. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημεντίνες, τη σατσούμα και τις ταγγερίνες.
6. Για τον αραβόσιτο: Η συνολική δόση ανά τέσσερα χρόνια ή η μέγιστη δόση να είναι 50 κ.εκ./στρ.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του αλευρώδη, της ψύλλας των εσπεριδοειδών, του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη και της ασιατικής ψύλλας των εσπεριδοειδών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

- II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
 2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
 3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4901/123404/10.10.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ