



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.08.2026
Αριθ. πρωτ.: 222893

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: LAINCO S.A., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 61220 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FUNGIZOX (azoxystrobin 25% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 227305/26.08.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61220 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FUNGIZOX (azoxystrobin 25% β/ο).
7. Την αριθμ. 8580/82222/28.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60638 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς LEGADO 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 125827/19.05.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 61220 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FUNGIZOX (azoxystrobin 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 227305/26.08.2025 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5, 8, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
Τομάτα (Θ) LYPES	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89	1-2/10
Μελιτζάνα (Θ)* SOLME Χρήση ήσσονος σημασίας	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (οι καρποί να έχουν αποκτήσει το τυπικό για την ποικιλία τους χρώμα). BBCH 51-89	1-2/10
Αγγούρι (Θ) CUMSA Αγγουράκι (Θ) CUMSG Κολοκυθάκι (Θ) CUUPG	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89	1-3/10
Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA Κολοκύθα (Θ) CUUPE	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89	1-3/10
Ρύζι ORYSA	Πυρικουλάρια <i>Pyricularia oryzae</i> PYRIOR Ελμινθοσπορίωση <i>Helminthosporium</i> sp.	20-40	100	Μία εφαρμογή από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως πριν την πλήρη ωρίμανση. BBCH 43-87	1

	HELMSP				
Πατάτα SOLTU	Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> ALTESO	20-60	50	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο εμφάνισης της 1 ^{ης} ταξιανθίας έως τον μεταχρωματισμό των καρπών της 1 ^{ης} ταξιανθίας. BBCH 51-85	1-2/14
Ψυχανθή Μπιζέλια με λοβό PIBSX Μπιζέλια χωρίς λοβό PIBSX Όσπρια Μπιζέλια PISBX	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI Χρήση ήσσονος σημασίας: Σκωρίαση** <i>Uromyces pisi</i> UROMPS	15-80	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7 ^{ου} φύλλου/έλικα έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος. BBCH 17-72	1-2/10
Ψυχανθή Φασόλια με λοβό PHSVX Φασόλια χωρίς λοβό PHSVX Κουκιά (φρέσκα) VICFX Όσπρια Φασόλια PHSVX Κουκιά VICFX	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta fabae</i> ASCOFA Χρήση ήσσονος σημασίας: Σκωρίαση** <i>Uromyces pisi</i> UROMPS	15-80	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως οι λοβοί αποκτήσουν το τυπικό τους μέγεθος. BBCH 20-79	1-2/10
Πυτεριά (Θ) CPSAN	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89	1-2/10
Ελαιοκράμβη BRSNN	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	20-40	100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων. BBCH 60-67	1-2/10-14

Μπρόκολο* BRSOK Χρήση ήσσονος σημασίας	Περονόσπορος <i>Peronospora parasitica</i> PEROPA	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο έναρξης σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει στο 80% του τυπικού μεγέθους και μορφής. BBCH 41-48	1-2/10
Αγκινάρα* CYUSC Χρήση ήσσονος σημασίας	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από όταν έχει αναπτυχθεί το 10% της μέγιστης φυλλικής μάζας μέχρι την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής). BBCH 41-55	1-2/10
Λωτός* DOSKA Χρήση ήσσονος σημασίας	Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella nawae</i> MYCONA	50-100	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κατά την περίοδο της άνθησης. BBCH 60-69	1-2/10

Παρατηρήσεις:

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.
2. Μπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση στη γεύση του ραφινάρισμένου λαδιού καλλιέργειας ελαιοκράμβης στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες μελιτζάνας (Θ), μπρόκολου, αγκινάρας και λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της σκωρίασης στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, μπιζέλια (όσπρια), φασόλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κουκιά (φρέσκα), φασόλια (όσπρια) και στα κουκιά (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας και μελιτζάνας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.
2. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας και μελιτζάνας υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90%) ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30°C).
3. Το σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
4. Να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκευάσματος πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζεται σε αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες της πατάτας, του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή).

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε:

- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες μπιζελιού, κουκιών (πρώιμη εφαρμογή) και φασολιού (πρώιμη εφαρμογή), **αγκινάρας και μπρόκολου**
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της τομάτας (Θ), **της μελιτζάνας (Θ)** των κολοκυνθοειδών (Θ), της πιπεριάς (Θ), του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή)
- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης
- **από τα επιφανειακά ύδατα μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την καλλιέργεια του λωτού.**

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη για την καλλιέργεια του λωτού.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Τομάτα (Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030) Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030), Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ) (0233030), Κολοκύθα (Θ) (0233020), Πιπεριά (Θ) (0231020)	3

Πατάτα (0211000), Αγκινάρα (0270050)	7
Μπιζέλια με λοβό (0260030), Μπιζέλια χωρίς λοβό (0260040) Φασόλια με λοβό (0260010) Φασόλια χωρίς λοβό (0260020) Κουκιά (φρέσκα) (0260010) Μπρόκολο (0241010)	14
Ελαιοκράμβη (0401060)	21
Ρύζι (0500060)	28
Μπιζέλια (όσπρια) (0300030) Φασόλια (όσπρια) (0300010) Κουκιά (όσπρια) (0300010)	35
Λωτός (0161060)	Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 227305/26.08.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ