



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.06.2026
Αριθ. πρωτ.: 165135

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: Nufarm GmbH & Co. KG, Αυστρίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΣΙΝΔΟΣ – Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: info@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 70439 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FUSILADE MAX (δ.ο. fluazifop-p-butyl 12,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37,4 και 45 αυτού.
- Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Την αριθ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
- Την αριθ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
- Την από τον Σεπτέμβριο του 2025 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Γαλλίας για το προϊόν FUSILADE MAX (κωδ. προϊόντος CA2157).
- Την αριθ. 12253/337855/02.12.2021 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμ. 70439 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FUSILADE MAX (δ.ο. fluazifop-p-butyl 12,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθ. 7361/205990/29.06.2023 αίτηση καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 27933/04.02.2026 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθ. **70439** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) FUSILADE MAX (δ.ο. fluazifop-p-butyl 12,5% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 12253/337855/02.12.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Μανταρινιά (CIDRE) Λεμονιά (CIDLI) Γκρεϊπ-φρουτ (CIDPA) Κουμκουάτ (FOLIA) Αμυγδαλιά (PRNDU) Φουντουκιά (CYLAV) Καρυδιά (IUGRE) Καστανιά (CNSVA) Φιστικιά (PIAVE) Κουκουναριά (PIUPN) Μακαντάμια (MCDTT) Πεκάν (CYAIL) Κάσιους (ANAOC) Καρύδια Βραζιλίας (BTHEX)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300	-	10-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, όταν έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Ψεκασμός φυλλώματος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.	1
Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO) Κυδωνιά (CYDOB)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300		10-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, όταν έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους	1

Ροδακινιά (PRNPS) Βερυκοκιά (PRNAR) Δαμασκηνιά (PRNDO) Κερασιά (PRNAV)					αδερφώματος. Ψεκασμός φυλλώματος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.	
Συκιά (FIUCA)						
Ακτινίδια (ATIDE)						
Ελιές (OLVEU)						
Αμπέλια (VITVI) (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300		10-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, όταν έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος Ψεκασμός φυλλώματος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.	1
Φράουλες (Α) (FRAAN)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία της καλλιέργειας (έως BBCH 59)	1
Σμέουρα (RUBAR, RUBID) Βατόμουρα (RUBOC, RUBFR)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300		10-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, όταν έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Ψεκασμός φυλλώματος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.	1

Ζαχαρότευτλα (BEAVA) Κτηνοτροφικά τεύτλα (BEAVC)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1
Τομάτα (Υ) (LYPES)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-150		10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία της καλλιέργειας. (έως BBCH 51)	1
Αγγούρια, (A) Αγγουράκια (A) (CUMSC, CUMSG) Κολοκύθια (A) (CUUPG)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1
Καρότο (A) (DAUCA) Κοκκινογούλια (BEAVD) Ραπανοσέλινο/ Γογγύλι (ρέβα) (A) (APUGR) Χρένα (A) (ARWLA) Παστινάκι η εδώδιμη (A) (PAVSA) Ραπάνια/Ραφανίδες (RAPRA) Λαγόχορτο (TROPS) Γουλιά (BRSNA) Γογγύλι (BRSRR)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος, όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1
Μαρούλι (A) (LACSA), Ρόκα (A) (ERUVV), Κάρδαμο (A) (LEPSA) Λυκοτρίβολο (VLLLO) Σκαρόλες (CICEN) Σπανάκι (A) (SPQOL) Ανδράκλα (A) (POROS)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1

Σέσκουλα (Α) (BEAVV)						
Μυρώνια (ANRCE) Σχοινόπρασο (ALLSC) Φύλλα σέλινου (APUGV) Μαϊντανός (PARCR) Φασκόμηλο (SALOF) Δεντρολίβανο (RMSOF) Θυμάρι (THYVU), Βασιλικός (OCIBA), Δάφνη (LURNO) Εστραγκόν ή δρακόντειο (ARTDR)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος.	1
Σπαράγγι (Α) (ASPSS)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1
Αγκινάρα (CYUSC)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-200	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1
Κρεμμύδι (ALLCE), Σκόρδο (ALLSA), Ασκαλώνια (ALLAS)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος.	1
Φασόλια (Α) (με λοβό) (PHSVX) Μπιζέλια (Α) (με λοβό) (PIBSX)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την άνθηση (έως BBCH50)	1

Μπιζέλια χωρίς λοβό (PIBSX)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100 -250		10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την άνθηση (έως BBCH50)	1
Φασόλια(ξερά) (PHSVX) Μπιζέλια (ξερά) (PIBST)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία. (έως BBCH50)	1
Λούπινο (LUPAL)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία. (έως BBCH50)	1
Φακές (LENCU)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250				
Φυτώρια (Α)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία. (έως BBCH50)	1
Φυτώρια Βιομηχανικής Κάνναβης (CNISA)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία της καλλιέργειας.	1 κάθε 2 χρόνια
Πατάτα (SOLTU)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-200	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία, σχηματισμό κονδύλων και το κλείσιμο των γραμμών.	1 κάθε 2 χρόνια
Ηλίανθος (HELAN)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν σχηματιστούν 6 ζεύγη φύλλων. (έως BBCH 16)	1
Λιναρόσπορος /Λινάρι (LIUUT) Παπαρουνόσπορος (PAPSO)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία	1

Σόγια (GLXMA)		100-200	-		Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	
Καπνός (NIOA)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία της καλλιέργειας	1
Καλλωπιστικά (θερμοκηπίου): Βιόλα ή Βιολέτα (VIOSS) Γαρυφαλιά (DINCA) Ζέρμπερα 1GEBC Κρίνος (1LILG) Πετούνια (PEUHY) Πριμούλα (PRISS), Τριανταφυλλιά (ROSSS) Χρυσάνθεμα (CHYSS)	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	150-300	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος <u>μόνο με αυτόματο σύστημα</u> , όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια	100-200	-	20-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος.	1
Βαμβάκι (GOSHI)	Αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια	100-250	-	10-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος	1

Παρατηρήσεις:

1. Το προϊόν να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια έχουν τουλάχιστον 2 πραγματικά φύλλα (BBCH12) έως το στάδιο του αδελφώματος (BBCH 29)
2. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες των καλλωπιστικών φυτών. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.
3. Ειδικά για την καταπολέμηση των πολυετών ζιζανίων να χρησιμοποιούνται οι μεγαλύτερες εγκεκριμένες

δόσεις.

4. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.
5. Να μην συγκομίζετε φρούτα από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
6. Για τις ελιές επιτρέπεται η συγκομιδή τους μόνο από το δέντρο και όχι από το έδαφος.
7. Η χρήση στα φύλλα σέλινου περιλαμβάνει και το λάπαθο.
8. Η χρήση στη ρίζα μαϊντανού περιλαμβάνει και τις ρίζες αγγελικής και ρίζες λεβοντικού
9. Η χρήση στο χρένο περιλαμβάνει και τις ρίζες γεντιανής.
10. Η χρήση στα φασόλια με λοβό περιλαμβάνει και τα κουκιά.
11. Η χρήση στα μπιζέλια με λοβό περιλαμβάνει και τα ρεβύθια.

12. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ετήσια ζιζάνια :

Αλεπονούρα (*Alopecurus sp.*) (ALOSS),

Αγριοβρώμη (*Avena sp.*) (AVESS),

Βρώμος (*Bromus sp.*) (BROSS),

Κριθάρι (*Hordeum vulgare*),

Σιτάρι (*Triticum aestivum*),

Αιματόχορτο (*Digitaria sp.*) (DIGSA),

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) (ECHSS),

Σετάρια (*Setaria sp.*) (SETSS) ,

Ευαίσθητα πολυετή ζιζάνια:

Έρα *Lolium rigidum*, *Lolium sp.*) (LOLSS)

Αγριάδα (*Agropyron repens*, *Cynodon dactylon*)(AGRRE, CYNDA)

Βέλιουρας (*Sorghum halepense*) (SORHA)

13. Για την καλλιέργεια της τομάτας:

Ευαίσθητα ετήσια ζιζάνια :

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) (ECHSS),

Σετάρια (*Setaria sp.*) (SETSS), *Setaria viridis* (SETVI)

11

Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος με γεωργικό ανελκυστήρα, ψεκαστήρα ή τρακτέρ με καμπίνα.

Τα γάντια πρέπει να φοριούνται μόνο εκτός της καμπίνας και πρέπει να φυλάσσονται εκτός της καμπίνας μετά τη χρήση.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SRe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε επιφάνεια μεγαλύτερη από:

- το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, των ακρόδρυων, των πυρηνόκαρπων, των μηλοειδών, της συκιάς, της ελιάς, των δασικών ειδών, της ακτινιδιάς, των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων .
- το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, στις καλλιέργειες του αμπελιού και μούρων και μικρών φρούτων.

SRe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια-αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- για την δοσολογία 150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα: μια-αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ,
- για την δοσολογία ίση ή μεγαλύτερη από 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα: αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
- **5 μέτρων από μη γεωργική γη για την καλλιέργεια της τομάτας.**

SRe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της τομάτας.

Για την προστασία των κατοίκων και των περιοίκων:

- να τηρείται μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από κατοικημένες περιοχές για την καλλιέργεια της τομάτας.

SRe 8: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στην καλλιέργεια της τομάτας κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

13 Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ηλίανθος, Κουκιά (0300010-001), Ρεβίθια (0300030-001), Φασόλια ξερά (0300010), Μπιζέλια (ξερά) (0300030), Φακή ξερή (0300020), Λούπινο (0300040) Πατάτα (0211000), Ελαιοκράμβη, Λιναρόσπορος/Λινάρι (0401010), Παπαρουνόσπορος (0401030), Βαμβάκι (0401090)	90
Σόγια (0401070)	75
Τομάτα (0231010)	70

Ζαχαρότευτλα(0900010), Κτηνοτροφικά τεύτλα(0213010) ,	56
Σμέουρα (0153030), Βατόμουρα (0153010)	45
Μαρούλι (0251020), Ρόκα (0251060), Κάρδαμο (0251040), Λυκοτρίβολο (0251010), Σπανάκι (0252010), Ανδράκλα (0252020), Σέσκουλα (0252030), Σκαρόλες (0251030), Μυρώνια (0256010), Σχοινόπρασο (0256020), Φύλλα σέλινου (0256030), Μαϊντανός (0256040), Φασκόμηλο (0256050), Δεντρολίβανο (0256060), Θυμαρί (0256070), Βασιλικός (0256080), Δάφνη (0256090), Εστραγκόν ή δρακόντειο (0256100), Αγκινάρα (0270050), Φράουλα (0152000)	42
Μπιζέλια χωρίς λοβό (0260040)	35
Γκρέιπφρούτ (0110010), Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά (0110050), Πορτοκαλιά (0110020), Κλημεντίνη (0110050-002), Κουμκουάτ (0161040), Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Κερασιά (0140020), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Ελιά (0161030), Συκιά (0161020), Αμπέλι (για οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) (0151010) (0151020), Ακτινιδιά (0162010)	28
Σπαράγγι (0270010), Κρεμμύδια (0220010) , Σκόρδο (0220020), Ασκαλώνια (0220030) Αγγούρι(Α) (0232010),Αγγουράκι(Α) (0232020), Κολοκύθι (0232030), Φασόλια με λοβό (0260020), Μπιζέλια με λοβό (0260030) Καρότο (0213020), Κοκκινογούλια (0213010), Ραπανοσέλινο/ Γογγύλι (ρεβα) 0213030, Χρένα (0213040), Παστινάκι η εδώδιμη (0213060), Ραπάνια/Ραφανίδες (0213080), Λαγόχορτο (0213090), Γουλιά (0213100), Γογγύλι (0213110)	28
Αμυγδαλιά (0120010), Φουντουκιά (0120060), Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040), Φυστικιά (0120100), Κουκουναριά (0120090), Κάσιους (0120030), Μακαντάμια (0120070), Πεκάν (0120080), Καρύδια Βραζιλίας (0120020)	21
Φυτώρια, Φυτώρια βιομηχανική κάνναβης, Καπνός , Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (Βιόλα, Γαρυφαλλιά Ζέρμπερα, Κρίνος, Πετούνια, Πριμούλα, Τριανταφυλλιά, Χρυσάνθεμα), Ακαλλιέργητες εκτάσεις	ΔΟ

11/11

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 12253/337855/02.12.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ