



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.06.2026
Αριθ. πρωτ.: 158269

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ
Θέση Ντράσεζα, (ΒΙ.ΠΑ.)
Αυλώνας Αττικής, Τ.Κ. 190 11
e-mail: agro@elton-group.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 11111 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 11111 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 80525/31.03.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 11111 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Κολοκυθάκι (Θ) CUUPE Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Θ) CUMME Κολοκύθα (Θ) CUUMA	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	250	330	75	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως τον 3ο καρπό με τυπικό μέγεθος και μορφή. (BBCH 13-73)	5/7
Σολανώδη: Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME Πεπινό (Θ) SOLMU	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	250	330	75	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13-89)	5/7
Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες και οиноποιήσιμες ποικιλίες) VITVI	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> UNCINE Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> PLASVI	200	200-500	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 12-89)	8/8-10
Σπανάκι (Υ+Θ)* SPQOL Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Περονόσπορος <i>Peronospora farinosa</i> f. sp. <i>spinaciae</i> PEROFS Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7

Άνηθος (Υ+Θ)* AFEGR Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> ERYSHE	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Αγκινάρα (Υ)* CYUSC Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i> ERYSCI <i>Oidium cyclaminis</i> OIDICY	200	260-1000	20-75	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβα νομένων ειδών κράμβης) (Υ+Θ)	Περωνόσπορος <i>Bremia</i> sp. BREMSP <i>Hyaloperonospor</i> <i>a parasitica</i> PEROPA <i>Hyaloperonospor</i> <i>a brassicae</i> HPERBR <i>Peronospora</i> <i>farinosa</i> PEROFA	250-300	500-1000	30-50	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο των πλήρως ξεδιπλωμένων κοτυληδόνων έως τη συγκομιδή στο 8°-9° φύλλο. (BBCH 10-18)	4/7
Φράουλα (Θ) FRAAN	Ωίδιο <i>Sphaerotheca</i> <i>macularis</i> SPHRMA	250-300	250-750	40-100	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή. (BBCH 13-87)	8/7-10
Ρύζι ORYSA	Πυρικούλάρια <i>Pyricularia oryzae</i> PYRIOR	250	-	30-50	Προληπτικές εφαρμογές στην αρχή του σχηματισμού της φόβης έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 30-65)	4/10
Κρεμμύδι ALLCE	Χρήση Ήσσοнос Σημασίας: Βοτρύτης* <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	200	500-1000	20-40	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την εμφάνιση του 2 ^{ου} φύλλου και μέχρι ο βολβός να αποκτήσει το 50% του αναμενόμενου μεγέθους. (BBCH 12-45)	5/7

Βερυκοκιά PRNAR	<u>Χρήση Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Κλαδοσπόριο* <i>Venturia</i> <i>carpophila</i> VENTCA	400	400-1000	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση. (BBCH 13-89)	8/7
Ακτινίδιο* ATIDE <i>Χρήση Ήσσονος</i> <i>Σημασίας</i>	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Βακτηριακό έλκος <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>) PSDMAK	500	500-1250	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση. (BBCH 13-89)	8/7
Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο* <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL <i>Colletotrichum acutatum</i> COLLAC <i>Colletotrichum clavatum</i> COLLC	400	400-1000	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. (BBCH 13-89)	8/7
Φιστικιά* PIAVE <i>Χρήση Ήσσονος</i> <i>Σημασίας</i>	Καμαροσπόριο <i>Fusicoccum</i> sp. FUSCSP <i>Botryosphaeria dothidea</i> BOTSDO Σεπτόρια <i>Septoria pistaciarum</i> <i>Septoria pistacina</i> SEPTPZ	400	400-1000	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 13-89)	8/7
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	<u>Χρήση Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Αλτερνάρια* <i>Alternaria alternata</i> ALTEAL	400	400-1000	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση. (BBCH 13-89)	8/7

Μαϊντανός (Υ)* PARCR	Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> ERYSHE	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria</i> <i>petroselini</i> SEPTPE					
	Τεφρά σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI					
	Σηψιρριζία <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> SCLESC					
	Περωνόσπορος <i>Plasmopara</i> <i>petroselini</i> PLASPE					
	Κερκόσπορα <i>Cercospora</i> <i>petroselini</i> CERCPE					
	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. ALTESP					

Παρατηρήσεις:

1. Το Fytosave εφαρμόζεται προληπτικά σε συνδυασμό ή / και σε εναλλαγή με κατάλληλα μυκητοκτόνα ανάλογα με την πίεση των ασθενειών.
2. Για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της άμυνας των φυτών, συνιστώνται 2-4 διαδοχικές εφαρμογές στο αμπέλι και 2-3 εφαρμογές στα κηπευτικά, στις καλλιέργειες νεαρών φύλλων, στη φράουλα και στο ρύζι πριν την εμφάνιση των ασθενειών.
3. Σε περίπτωση προσβολής ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων και αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάστε με κατάλληλο διασυστηματικό μυκητοκτόνο πριν την εφαρμογή του Fytosave. Επίσης, στο αμπέλι συνιστάται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα κατά του Περωνόσπορου ή / και του Ωίδιου. Σε αυτή την περίπτωση η δόση του μυκητοκτόνου προσαρμόζεται σε συνάρτηση με την πίεση της ασθένειας και το φαινολογικό στάδιο του αμπελιού, στα πλαίσια της έγκρισης του μυκητοκτόνου.
4. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στις χρήσεις ήσσονος σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ