Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.08 14:09:37 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Ν. Αβραμίδης**
Τηλέφωνο: **210 92 87 224**
e-mail: navramidis@minagric.gr

Αθήνα, 08.10.2026
Αριθ. πρωτ: 259001

Προς: **Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.**
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 1854 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) KARATE with zeon technology 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ της εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α΄8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
   α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
5. Την από Νοέμβριο του 2019 έκθεση αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ελλάδας για το προϊόν KARATE with Zeon technology 10 CS (ΕΜΠ1966/18.11.2019) καθώς και τις συμπληρωματικές αξιολογήσεις αριθμ. 1035/25544/24.01.2020 (ΕΜΠ72/24.01.2020), 10873/321811/27.10.2022 (ΕΜΠ2690/25.10.2022), 409/10338/12.01.2024 (ΕΜΠ 75/12.01.2024) και 223140/01.09.2026 (ΕΜΠ 1899/28.08.2026).
6. Την αριθμ. 95780/09.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **1854** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) KARATE with zeon technology 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο),** η οποία ανανεώθηκε με την αριθμ. 628/15239/04.03.2024ΟΕ απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ της εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5, 7, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηλιά MABSD	Φυλλορύκτης *Phyllonorycter* sp. 1PRYCG <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO	10	--	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 19-89	1
Αχλαδιά PYUCO	Φυλλορύκτης *Phyllonorycter* sp. 1PRYCG Ψύλλα *Cacopsylla pyri* PSYLPI <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO	10	--	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 19-87	1

Πορτοκαλιά CIDSI Μανταρινιά CIDRE	**Μύγα της Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA**	**10**	--	**100-200**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο εμφάνισης των πράσινων κορυφών των φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 09-89**	**1**
Ροδακινιά PRNPS	Φυλλοδέτες *Adoxophyes orana* CAPURE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO	10	--	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 19-89	1
Βερικοκιά PRNAR	**Θρίπες *Thrips angusticeps* THRIAN *Kakothrips pisivorus* KAKORO** **Αφίδες *Aphididae* 1APHIF** **Μύγα της Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA**	**10**	**-**	**50-150**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και την συγκομιδή. BBCH 19-89**	**1**
Ελιά OLVEU	**Δάκος *Bactrocera oleae* DACUOL**	**10**	**--**	**50-200**	**Ψεκασμός φυλλώματος όταν ο πληθυσμός του εντόμου αυξάνει από το στάδιο όπου τα εξωτερικά μικρά φύλλα ανοίγουν και διασταυρώνονται κοντά στην κορυφή τους έως και τη συγκομιδή. (BBCH 09-89).**	1

Ελιά OLVEU	Πυρηνοτρήτης *Prays oleae* PRAYOL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO	10	--	50-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών και την εκκόλαψη των ωών από το στάδιο όπου τα εξωτερικά μικρά φύλλα ανοίγουν και διασταυρώνονται κοντά στην κορυφή τους έως ότου ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους (ξεκινάει η σκλήρυνση του πυρήνα). BBCH 09-75	
	Δάκος *Bactrocera oleae* DACUOL	3,75	125	3 (Εφαρμογή 300 κ.εκ. ψεκαστικού υγρού/ δέντρο. Μέγιστος αριθμός ψεκασμένων δέντρων ανά στρέμμα: 10)	Δολωματικοί ψεκασμοί από το έδαφος σε συνδυασμό με ENTOMELA 50 SL ή ENTOMELA 75 SL ή DACUS BAIT 100 στις εγκεκριμένες δόσεις, σύμφωνα με τις συλλήψεις ακμαίων στις δακοπαγίδες. Να εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια κάθε 2^{ου} δέντρου του ελαιώνα.	2/14
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Ευδεμίδα *Lobesia botrana* POLYBO Κοχυλίδα *Eupoecilia ambiguella* CLYSAM <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO	10	10-25	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των βλαστοφόρων οφθαλμών έως τη συγκομιδή. BBCH 09-89	1

	Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO					
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Πιπεριά (Υ+Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE Πράσινο σκουλήκι *Helicoverpa armigera* HELIAR Σποντόπτερα *Spodoptera* sp. SPODSP Δορυφόρος *Leptinotarsa decemlineata* LPTNDE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO	10	10-20 (Υπαίθρου) 6,6-20 (Θερμοκηπίου)	50-100 (Υπαίθρου) 50-150 (Θερμοκηπίου)	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή. BBCH 09-89	1
Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSC Κολοκύθι (Υ+Θ) CUUPG	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE Πράσινο σκουλήκι *Helicoverpa armigera* HELIAR Σποντόπτερα *Spodoptera* sp. SPODSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>: Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO	10	10-20 (Υπαίθρου) 6,6-20 (Θερμοκη-πίου)	50-100 (Υπαίθρου) 50-150 (Θερμοκηπίου)	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή. BBCH 09-89	1

Λάχανο BRSOX Μπρόκολο BRSOK	Πιερίδα *Pieris brassicae* PIERBR Μαμέστρα *Mamestra brassicae* BARABR <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR	7,5-10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή (BBCH 09-49).	1
Φακή LENCU	Βρούχος *Bruchus* sp. BRCHSP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR	10	10	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή. BBCH 09-89	1
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος *Leptinotarsa decemlineata* LPTNDE <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR	10	--	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή. BBCH 09-49	1
Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι *Helicoverpa armigera* HELIAR Ρόδινο σκουλήκι *Pectinophora gossypiella* PECTGO	15	--	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδιών. BBCH 60-81	1
	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus* sp. MYZUSP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR	15	--	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος από το στάδιο της εμφάνισης του 1^{ου} πρώτου αληθινού φύλλου έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδιών. BBCH 11-81	

Μπιζέλια χωρίς λοβό **PIBSX**	**Αφίδες** ***Myzus persicae*** **MYZUPE** ***Aphis fabae*** **APHIFA**	**10**	**-**	**100-200**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των βλαστών από το έδαφος έως και τη συγκομιδή.** **BBCH 09-89**	**1**
Φασόλια με και χωρίς λοβό **PHSVX**	**Κοφτοσκούληκα** ***Agrotis* sp.** **AGROSP**	**7,5**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των βλαστών από το έδαφος έως και τη συγκομιδή.** **BBCH 09-89**	**1**
	Αφίδες ***Myzus persicae*** **MYZUPE** ***Aphis fabae*** **APHIFA** **Θρίπες** ***Thrips angusticeps*** **THRIAN** ***Kakothrips pisivorus*** **KAKORO**	**10**				
Φασόλια ξηρά **PHSVX**	**Αφίδες** ***Myzus persicae*** **MYZUPE** ***Aphis fabae*** **APHIFA**	**10**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των βλαστών από το έδαφος έως και τη συγκομιδή.** **BBCH 09-89**	**1**
Ρύζι **ORYSA**	**Σκαθάρι του νερού του ρυζιού** ***Lissorhoptrus oryzophilus*** **LISSOR**	**12**	**-**	**30-40**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την έκπτυξη του πρώτου φύλλου έως την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου.** **BBCH 11-15**	**1**
Αραβόσιτος **ZEAMX**	**Διαβρώτικα** ***Diabrotica* sp.** **DIABSP** **Πυραλίδα** ***Ostrinia nubilalis*** **PYRUNU**	**15**	**-**	**15-30**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης του πρώτου φύλλου έως την έκπτυξη της ταξιανθίας.** **BBCH 12-51**	**1**
	Αφίδες ***Myzus persicae*** **MYZUPE** ***Aphis fabae*** **APHIFA**	**10**				

	Κοφτοσκούληκα ***Agrotis* sp.** **AGROSP**	**7,5**	**-**	**20-100**	**Ψεκασμός εδάφους, με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης του κολεόπτυλου από το έδαφος. [από BBCH 09]**	
Πεπόνι (Υ) **CUMME** **Καρπούζι (Υ)** **CITLA**	**Κοφτοσκούληκα** ***Agrotis* sp.** **AGROSP**	**7,5**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως και την συγκομιδή.** **BBCH 09-89**	**1**
	Αφίδες ***Aphididae*** **1APHIF** **Θρίπες** ***Thrips angusticeps*** **THRIAN** ***Kakothrips pisivorus*** **KAKORO**	**10**				
Πεπόνι (Θ) **CUMME** **Καρπούζι (Θ)** **CITLA**	**Αλευρώδης** ***Trialeurodes vaporariorum*** **TRIAVA** ***Bemisia tabaci*** **BEMITA** **Αφίδες** **Aphididae** **1APHIF** **Θρίπας** ***Frankliniella occidentalis*** **FRANOC**	**10**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως και τη συγκομιδή.** **BBCH 09-89**	**1**
Φράουλα (Υ) **FRAAN**	**Αφίδες** ***Aphididae*** **1APHIF** **Δροσόφιλα** ***Drosophila suzukii*** **DROSSU**	**10**	**-**	**50-150**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της ανάπτυξης των πρώτων ανθέων έως και την συγκομιδή.** **BBCH 55-87**	**1**
Μαρούλι (Υ) **LACSA**	**Αφίδες** **Aphididae** **1APHIF** **Θρίπες** ***Thrips angusticeps*** **THRIAN** ***Kakothrips pisivorus*** **KAKORO**	**10**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως και τη συγκομιδή.**	**1**

	Κοφτοσκούληκα ***Agrotis* sp.** **AGROSP**	**7,5**			**BBCH 09-89.**	
Καρότο **DAUCS**	**Θρίπες** ***Thrips angusticeps*** **THRIAN** ***Kakothrips pisivorus*** **KAKORO** **Αφίδες** **Aphididae** **1APHIF**	**10**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως και τη συγκομιδή.** **BBCH 09-89**	**1**
Σπαράγγι **ASPOF**	**Αφίδες** **Aphididae** **1APHIF**	**10**	**-**	**20-60**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο όπου το στέλεχος είναι στο 50% του μεγέθους του έως και την πλήρη ωρίμανση των ταξικαρπίων.** **BBCH 35-89.**	**1**
Αγκινάρα **CYUSC**	**Αφίδες** **Aphididae** **1APHIF** **Θρίπες** ***Thrips angusticeps*** **THRIAN** ***Kakothrips pisivorus*** **KAKORO**	**10**	**-**	**100-200**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως και τη συγκομιδή.** **BBCH 09-89**	**1**
Κρεμμύδι (Υ) **ALLCE**	**Αφίδες** **Aphididae** **1APHIF** **Θρίπας** ***Thrips angusticeps*** **THRIAN** ***Kakothrips pisivorus*** **KAKORO**	**10**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της εμφάνισης των πράσινων κορυφών έως και τη συγκομιδή.** **BBCH 09-89.**	**1**
Πράσο (Υ) **ALLPO**	**Αφίδες** **Aphididae** **1APHIF** **Θρίπας** ***Thrips angusticeps*** **THRIAN** ***Kakothrips pisivorus*** **KAKORO**	**10**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως και τη συγκομιδή.** **BBCH 09-89**	**1**

Γαιοκάρδαμο (Θ) BARVE, Ρόκα (Θ) ERUVE Καλλιέργειες (Θ) νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων των ειδών κράμβης)	**Αφίδες Aphididae 1APHIF**	**10**	**-**	**50-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως και τη συγκομιδή. BBCH 09-89**	**1**
Φύλλα σέλινου (Υ) APUGS	**Αφίδες Aphididae 1APHIF** **Θρίπας *Thrips angusticeps* THRIAN *Kakothrips pisivorus* KAKORO**	**10**	**-**	**20-40**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την εμφάνιση της ταξιανθίας. BBCH 09-49**	**1**
Θυμάρι (Υ) THYVU	**Κοφτοσκούληκα *Agrotis* sp. AGROSP**	**7,5**	**-**	**20-100**	**Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης του βλαστού έως και την πλήρη ωρίμανση των ταξικαρπίων. BBCH 09-89**	**1**
Καστανιά*** CSNSA *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Καρπόκαψα *Cydia* sp. CYDISP Σποντόπτερα *Spodoptera frugiperda* LAPHFR	10	--	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 19-89	1
Αμυγδαλιά*** PRNDU Φυστικιά*** PIAVE Καρυδιά*** IUGNI, IUGRE *Χρήσεις ήσσονος σημασίας*	Καρπόκαψα *Cydia* sp. CYDISP Σποντόπτερα *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Ευρύτομο *Eurytoma amygdali* EURTAM *Eurytoma plotnikovi* EURTPL	10	--	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 19-89	1

	Ψύλλα της φιστικιάς *Agonoscena* sp. AGONSP Καφέ Βρωμούσα *Halyomorpha halys* HALYHA Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU Ανατολική μύγα των καρπών *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων *Bactrocera zonata* DACUZO					
Κερασιά** PRNAV *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Myzus cerasi* MYZUCE *Hyalopterus pruni* HYALPR Ραγολέτιδα *Rhagoletis cerasi* RHAGCE Μύγα της Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA Θρίπας* *Thrips* sp. THRISP Ανάρσια* *Anarsia lineatella* ANARLI Καρπόκαψα* *Cydia* sp. CYDISP Λιριόμιζα* *Liriomyza trifolii* LIRITR Φυλλορύκτης* *Phyllonorycter* sp. 1PRYCG	10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 19-89	1

	Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Καφέ Βρωμούσα* *Halyomorpha halys* HALYHA Δροσόφιλα* *Drosophila suzukii* DROSSU Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO					
Δαμασκηνιά** PRNDO *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Myzus cerasi* MYZUCE *Hyalopterus pruni* HYALPR Μύγα της Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA Ραγολέτιδα* *Rhagoletis cerasi* RHAGCE Θρίπας* *Thrips* sp. THRISP Ανάρσια* *Anarsia lineatella* ANARLI Καρπόκαψα* *Cydia* sp. CYDISP Λιριόμιζα* *Liriomyza trifolii* LIRITR Φυλλορύκτης* *Phyllonorycter* sp. 1PRYCG	10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 19-89	1

	Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Καφέ Βρωμούσα* *Halyomorpha halys* HALYHA Δροσόφιλα* *Drosophila suzukii* DROSSU Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO					
Λεμονιά*** CIDLI Γκρέιπφρουτ*** CIDPA *Χρήσεις ήσσονος σημασίας*	Κοκκοειδή *Coccus hesperidum* COCCHE Πράσινη Βρωμούσα *Nezara viridula* NEZAVI Προνύμφες λεπιδοπτέρων Μετκάλφα *Metcalfa pruinosa* METFPR Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE Μύγα της Μεσογείου *Ceratitis capitata* CERTCA Καφέ Βρωμούσα *Halyomorpha halys* HALYHA Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU Φυλλορύκτης *Phyllonorycter* sp. 1PRYCG Σποντόπτερα *Spodoptera frugiperda* LAPHFR	10	--	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο εμφάνισης των πράσινων κορυφών των φύλλων έως και τη συγκομιδή. BBCH 09-89	1

	Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO					
Μύρτιλλο** VACAN, VACCO VACVG *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Ευδεμίδα *Lobesia botrana* POLYBO Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU Κοχυλίδα* *Eupoecilia ambiguella* CLYSAM Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR Καφέ Βρωμούσα* *Halyomorpha halys* HALYHA Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO	10	10-25	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 09-89	1
Κολοκύθα (Υ)** CUUMA *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis gossypii* APHIGO Προνύμφες λεπιδοπτέρων Πράσινο σκουλήκι* *Helicoverpa armigera* HELIAR Σποντόπτερα* *Spodoptera* sp. SPODSP Δορυφόρος της πατάτας* *Leptinotarsa decemlineata* LPTNDE	10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως τη συγκομιδή. BBCH 09-89	1

	Αλευρώδης* *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA Ανατολική μύγα των καρπών* *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων* *Bactrocera zonata* DACUZO					
Μπάμια (Υ)*** ABMES *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE Πράσινο σκουλήκι *Helicoverpa armigera* HELIAR Σποντόπτερα *Spodoptera* sp. SPODSP Δορυφόρος της πατάτας *Leptinotarsa decemlineata* LPTNDE Ανατολική μύγα των καρπών *Bactrocera dorsalis* DACUDO Μύγα των ροδάκινων *Bactrocera zonata* DACUZO	10	10-20	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλυδόνων έως τη συγκομιδή. BBCH 09-89	1
Κουνουπίδι** BRSOB *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Πιερίδα *Pieris brassicae* PIERBR Μαμέστρα *Mamestra brassicae* BARABR Υπονομευτής των σταυρανθών* *Dichrorampha petiverella* LASPDO Σποντόπτερα* *Spodoptera frugiperda* LAPHFR	10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως και τη συγκομιδή. BBCH 09-89	1

	Κοφτοσκούληκα* *Agrotis* sp. AGROSP Μυζητικά ημίπτερα Ετερόπτερα* 1HETER Αλευρώδης* *Aleyrodes proletella* ALEUPR Αφίδες* *Aphis* sp. 1APHIG Δορυφόρος της πατάτας* *Leptinotarsa decemlineata* LPTNDE Θρίπας* *Thrips* sp. THRISP					

Παρατηρήσεις:

1. Να ρυθμίσετε τη δόση στο εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει την μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα.
2. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά:

- της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες στις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, αμπελιού, ελιάς, τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθιού
- του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, αμπελιού, ελιάς, λάχανου, μπρόκολου, φακής, πατάτας και βαμβακιού,
- του θρίπα, της ανάρσιας, της καρπόκαψας, της λιριόμιζας, του φυλλορύκτη, της σποντόπτερας, της καφέ βρωμούσας, της δροσόφιλας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της κερασιάς,
- της ραγολέτιδας, του θρίπα, της ανάρσιας, της καρπόκαψας, της λιριόμιζας, του φυλλορύκτη, της σποντόπτερας, της καφέ βρωμούσας, της δροσόφιλας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της δαμασκηνιάς,
- της κοχυλίδας, της σποντόπτερας, της καφέ βρωμούσας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια του μύρτιλλου,
- του πράσινο σκουληκιού, της σποντόπτερας, του δορυφόρου της πατάτας, του αλευρώδη, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της κολοκύθας,
- του υπονομευτή των σταυρανθών, της σποντόπτερας, των κοφτοσκούληκων, των ετερόπτερων, του αλευρώδη, των αφίδων, του δορυφόρου της πατάτας και του θρίπα στην καλλιέργεια του κουνουπιδιού.

Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**«Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κερασιάς, δαμασκηνιάς, μύρτιλλου, κολοκύθας και κουνουπιδιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καστανιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, λεμονιάς, γκρέιπφρουτ και μπάμιας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:	--
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:	--
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:	Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη ζώνη πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια. Η επανείσοδος στον αμπελώνα επιτρέπεται μόνο αφού περάσουν <u>4 ημέρες</u> από την εφαρμογή του σκευάσματος φορώντας <u>γάντια</u>.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

<u>Υπαίθριες καλλιέργειες:</u>

- *Κατά την εφαρμογή <u>με τρακτέρ</u> φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.*
- *Κατά την χρήση ψεκαστικού μηχανήματος <u>με εκτόξευση υποβοηθούμενη από ρεύμα αέρος (τουρμπίνα),</u> πρέπει να χρησιμοποιείται τρακτέρ με <u>κλειστή καμπίνα.</u>*
- *Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή κατά την εφαρμογή με τρακτέρ με φερόμενα ή συρόμενα μέσα να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων.*
- *Κατά την χρήση με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) σε <u>χαμηλού ύψους</u> καλλιέργειες στον αγρό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.*
- *Κατά την χρήση με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) σε <u>ψηλές καλλιέργειες</u> φοράτε γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2) κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2), αδιάβροχη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για το κεφάλι/ μάτια και πρόσωπο κατά την εφαρμογή.*
- *Δεν επιτρέπεται η χρήση επινώτιου ψεκαστήρα στον αγρό.*
- *Σε περίπτωση επανεισόδου στη καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.*

- *Κατά τον δολωματικό ψεκασμό στην καλλιέργεια της ελιάς με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός):*
  - *φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2) κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.*
  - *όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων.*
  - *Δεν επιτρέπεται η χρήση επινώτιων ψεκαστήρων.*

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες:

- *Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες χαμηλής ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) φοράτε αδιάβροχο παντελόνι, σακάκι από βαμβάκι/πολυεστέρα και γάντια.*
- *Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες υψηλής ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) φοράτε αδιάβροχη ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.*
- *Σε περίπτωση επανεισόδου στο θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.*

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:

- Σε μηλιά, αχλαδιά, **πορτοκαλιά, μανταρινιά**, ροδακινιά, **βερικοκιά** καστανιά, αμυγδαλιά, φυστικιά, καρυδιά, κερασιά, δαμασκηνιά, λεμονιά, γκρέιπφρουτ: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 25 μέτρων, εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι ζώνη φυτικής ανάσχεσης και με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.
- Στο αμπέλι και το μύρτιλλο – πρώιμη εφαρμογή: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.
- Στο αμπέλι και το μύρτιλλο – όψιμη εφαρμογή: Να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% .
- Στην ελιά: Να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.
- Στο βαμβάκι **και τον αραβόσιτο**: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%.
- Σε λοιπές υπαίθριες καλλιέργειες (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, φακή, λάχανο, μπρόκολο, κολοκύθα, μπάμια, κουνουπίδι, **μπιζέλια χωρίς λοβό, φασόλια με και χωρίς λοβό, φασόλια ξηρά, πεπόνι, καρπούζι, φράουλα, μαρούλι**, **καρότο, σπαράγγι, αγκινάρα, κρεμμύδι, πράσο, φύλλα σέλινου, θυμάρι**): Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.
- Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, **πεπόνι, καρπούζι, γαιοκάρδαμο, ρόκα, καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων των ειδών κράμβης**) που γειτνιάζουν με υδάτινες επιφάνειες: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή να αφήσετε μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά 50%.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους:

- **Σε μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά, ροδακινιά, ελιά, βερικοκιά, καστανιά, αμυγδαλιά, φυστικιά, καρυδιά, κερασιά, δαμασκηνιά, λεμονιά και γκρέιπφρουτ**: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.
- Στο αμπέλι, το μύρτιλλο **και τη φράουλα**: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 60% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 90% .
- Στο βαμβάκι **και τον αραβόσιτο**: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 70%.
- **Στο ρύζι: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 60%.**
- Σε λοιπές καλλιέργειες υπαίθρου (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, φακή, λάχανο, μπρόκολο, κολοκύθα, μπάμια, κουνουπίδι, **μπιζέλια χωρίς λοβό, φασόλια με και χωρίς λοβό, φασόλια ξηρά, πεπόνι, καρπούζι, μαρούλι, καρότο, σπαράγγι, αγκινάρα, κρεμμύδι, πράσο, φύλλα σέλινου, θυμάρι**: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 30%.
- Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, **πεπόνι, καρπούζι γαιοκάρδαμο, ρόκα, καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων των ειδών κράμβης**) με ύψος <50 εκ.: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.
- Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, **πεπόνι, καρπούζι**) με ύψος >50 εκ.: Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ζιζάνια σε ανθοφορία (απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους). Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
Πολύ τοξικό σε βομβίνους και ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Αγγούρι (Υ+Θ) (0232010), Κολοκύθι (Υ+Θ) (0232030), Μπάμια (Υ) (0231040), Κολοκύθα (Υ) (0233020), **Καρότο (0213020), Κρεμμύδι (Υ) (0220020), Φασόλια με λοβό (0260010), Πεπόνι (Υ+Θ) (0233010), Καρπούζι (Υ+Θ) (0233030), Φράουλα (Υ) (0152000), Αγκινάρα (0270050)**	3

Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), **Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050),** Ροδακινιά (0140030)-Νεκταρινιά (0140030-002), **Βερικοκιά (0140010),** Ελιά επιτραπέζια (0161030), Ελιά ελαιοποιήσιμη (0402010), Καστανιά (0120040), Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110), Φιστικιά (0120100), Λεμονιά (0110030), Γκρέιπφρουτ (0110010), Κερασιά (0140020), Δαμασκηνιά (0140040), Λάχανο (0242020), Μπρόκολο (0241010), Κουνουπίδι (0241020), Πατάτα (0211000), **Μπιζέλια χωρίς λοβό (0260040), Φασόλια χωρίς λοβό (0260020), Φύλλα σέλινου (Υ) (0256030), Θυμάρι (Υ) (0256070), Αραβόσιτος (ψεκασμός φυλλώματος) (0500030)**	7
Βαμβάκι (0401090), Φακή (0300020), Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010), Αμπέλι οινοποιήσιμο (0151020), Μύρτιλλο (0154010), **Μαρούλι (Υ) (0251020), Γαιοκάρδαμο (Θ) (0251050), Ρόκα (Θ) (0251060), Καλλιέργειες (Θ) νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανο-μένων των ειδών κράμβης) (0251080), Φασόλια ξηρά (0300010)**	14
Πράσο (Υ) (0270060)	**21**
Αραβόσιτος (ψεκασμός εδάφους)	**60**
Σπαράγγι (0270010)	**>250**
Ρύζι (0500060)	**Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής**

I. Ετικέτα σκευάσματος:
- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 628/15239/04.03.2024ΟΕ απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ