



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22.06.2026  
Αριθ. πρωτ.: 162159

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: ISK Biosciences Europe N.V., Βελγίου  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ  
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της με αριθ. 60752 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KENJA (isofetamid 40% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 8680/114907/13.12.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60752 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KENJA (isofetamid 40% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 88722/07.04.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 60752 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KENJA (isofetamid 40% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8680/114907/13.12.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος                                                                            | Δόσεις σκευάσματος |                            |                            | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής                                                                                                                       | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                   | κ.εκ./ στρέμμα     | κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ |                                                                                                                                                   |                                                              |
| Βερικοκιά PRNAR | Φαιά σήψη ανθέων και βλαστών<br><i>Monilinia laxa</i><br>MONILA                   | 80                 | --                         | 50-100                     | Δύο εφαρμογές από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλος Μαΐου, από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων BBCH 57-69                               | 2/10                                                         |
|                 | Φαιά σήψη καρπών<br><i>Monilinia fructigena</i><br>MONIFG                         | 90                 |                            |                            | Δύο εφαρμογές από αρχή Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου, όταν οι καρποί έχουν το μισό του τελικού μεγέθους έως και την πλήρη ωρίμανσή τους BBCH 75-89 |                                                              |
| Ροδακινιά PRNPS | Φαιά σήψη ανθέων και βλαστών<br><i>Monilinia laxa</i><br>MONILA                   | 80                 | --                         | 50-100                     | Δύο εφαρμογές από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλος Μαΐου, από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων BBCH 57-69                               | 2/10                                                         |
|                 | Φαιά σήψη καρπών<br><i>Monilinia fructigena</i><br>MONIFG                         | 90                 |                            |                            | Δύο εφαρμογές από αρχή Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου, όταν οι καρποί έχουν το μισό του τελικού μεγέθους έως και την πλήρη ωρίμανσή τους BBCH 75-89 |                                                              |
| Κερασιά PRNAV   | Φαιά σήψη ανθέων και βλαστών<br><i>Monilinia laxa</i><br>MONILA                   | 80                 | --                         | 50-100                     | Δύο εφαρμογές από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλος Μαΐου, από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων BBCH 57-69                               | 2/9                                                          |
|                 | <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br>Φαιά σήψη καρπών<br><i>Monilinia fructigena</i> | 90                 |                            |                            | Δύο εφαρμογές από αρχή Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου, όταν οι καρποί έχουν το μισό του τελικού μεγέθους                                            | 2/10                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                              | MONIFG                                                                                                 |         |    |        | έως και την πλήρη<br>ωρίμανσή τους<br>BBCH 75-89                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Αμπέλι<br>VITVI<br>(οινοποιήσιμα<br>και επιτραπέζια<br>σταφύλια)                                                                                                                                                                             | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>BOTRCI                                                          | 150     | -- | 10-80  | Μια εφαρμογή από<br>την αρχή της<br>άνθησης έως πριν τη<br>συγκομιδή<br>BBCH 61-85                                                                                                | 1      |
| Φράουλα (Υ)<br>FRAAN                                                                                                                                                                                                                         | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>BOTRCI                                                          | 120     | -- | 40-80  | Δύο εφαρμογές:<br>από την αρχή της<br>άνθησης έως πριν τη<br>συγκομιδή<br>BBCH 60-87                                                                                              | 2/7    |
| Σολανώδη<br>Τομάτα (Θ)<br>LYPES<br>Μελιτζάνα (Θ)<br>SOLME<br>Πιπεριά (Θ)<br>CPSAN                                                                                                                                                            | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>BOTRCI<br><br>Σκληρωτινίαση<br><i>Sclerotinia</i> sp.<br>SCLESP | 100-120 | -- | 40-120 | Δύο εφαρμογές<br>προληπτικά ή στα<br>πρώιμα στάδια<br>ανάπτυξης της<br>ασθένειας, από την<br>εμφάνιση των<br>ταξιανθιών έως και<br>την πλήρη ωρίμανση<br>των καρπών<br>BBCH 51-89 | 2/7-10 |
| Κολοκυνθοειδή<br>με βρώσιμο<br>φλοιό<br>Αγγούρι,<br>Αγγουράκι (Θ)<br>CUMSA<br>Κολοκύθι (Θ)<br>CUUPG                                                                                                                                          | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>BOTRCI<br><br>Σκληρωτινίαση<br><i>Sclerotinia</i> sp.<br>SCLESP | 100-120 | -- | 40-120 | Δύο εφαρμογές<br>προληπτικά ή στα<br>πρώιμα στάδια<br>ανάπτυξης της<br>ασθένειας, από την<br>εμφάνιση των<br>ταξιανθιών έως και<br>την πλήρη ωρίμανση<br>των καρπών<br>BBCH 51-89 | 2/7-10 |
| Δαμασκηνιά<br>PRNDO<br>Αμυγδαλιά*<br>PRNDU<br><br>Χρήσεις<br>ήσσονος<br>σημασίας                                                                                                                                                             | Φαιά σήψη<br>ανθέων και<br>βλαστών<br><i>Monilinia laxa</i><br>MONILA                                  | 80      | -- | 50-100 | Δύο εφαρμογές από<br>μέσα Φεβρουαρίου<br>έως τέλος Μαΐου,<br>από την έναρξη της<br>άνθησης έως την<br>πτώση των πετάλων<br>BBCH 57-69                                             | 2/10   |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Φαιά σήψη<br>καρπών<br><i>Monilinia<br/>fructigena</i><br>MONIFG                                       | 90      |    |        | Δύο εφαρμογές από<br>αρχή Ιουνίου έως<br>μέσα Σεπτεμβρίου,<br>όταν οι καρποί<br>έχουν το μισό του<br>τελικού μεγέθους<br>έως και την πλήρη<br>ωρίμανσή τους<br>BBCH 75-89         |        |
| Παρατηρήσεις:<br>• Εφαρμόζεται προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Να αποφεύγονται οι θεραπευτικές εφαρμογές. |                                                                                                        |         |    |        |                                                                                                                                                                                   |        |

- Δεν επηρεάζεται αρνητικά από βροχή <10 mm, μία ώρα μετά από την εφαρμογή. Σε περίπτωση δυνατών βροχών (>10mm) μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να επαναληφθεί ο ψεκασμός.
- Η δόση και το χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
- Η χρήση στη Μελιτζάνα (SOLME) περιλαμβάνει και τη χρήση στη Μελιτζάνα Peripino (SOLMU).
- Η χρήση στη Πιπεριά (CPSAN) περιλαμβάνει και τη χρήση στη Πιπεριά Τσίλι (CPSFR).
- Η χρήση στο Κολοκύθι (CUUPG) περιλαμβάνει και τη χρήση στη Κουρκούβιτα η κολοκύνθη ποικ. Πατισόν (CUUPE).
- Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη χρήση στη Νεκταρινιά (PRNPN).
- Το προϊόν να εφαρμόζεται το πολύ 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο στις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων.
- **Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά.**

**\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της αμυγδαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».**

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

*«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».*

*«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια».*

**Να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων στις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων και της αμυγδαλιάς για την προστασία των κατοίκων και των παρευρισκομένων.**

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η΄ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων **και της αμυγδαλιάς.**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργεια/Προϊόν<br>(Κωδικός προϊόντος με βάση<br>το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)                                | Ημέρες    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Αμυγδαλιά (0120010)</b>                                                                                                | <b>28</b> |
| Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)<br>(0151020, 0151010)                                                      | 21        |
| Βερικοκιά (0140010)<br>Ροδακινιά-Νεκταρινιά (0140030)<br><b>Κερασιά-Βυσσινιά (0140020)</b><br><b>Δαμασκηνιά (0140040)</b> | 7         |
| Φράουλα (Υ) (0152000)                                                                                                     | 1         |
| Τομάτα (Θ) (0231010)<br>Μελιτζάνα (Θ)-Μελιτζάνα Pepino (Θ) (0231030)<br>Πιπεριά (Θ)-Πιπεριά Τσίλι (Θ) (0231020)           | 1         |
| Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020),<br>Κολοκύθι (Θ)-Κουρκούβιτα η κολοκύνθη ποικ.<br>Πατισόν (Θ) (0232030)]   | 1         |

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

**III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8680/114907/13.12.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.**

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

**ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**