



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.10.2025
Αριθ. πρωτ.: 268901

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Nufarm GmbH & Co. KG, Αυστρίας
(Δια της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ)
e-mail: info@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14463 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Kaiso Sorbie 5 EG (lambda-cyhalothrin 5% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 8534/95163/12.09.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14463 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Kaiso Sorbie 5 EG (lambda-cyhalothrin 5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 258418/24.09.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 14463 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Kaiso Sorbie 5 EG (lambda-cyhalothrin 5% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8534/95163/12.09.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	γρ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά Κλημεντίνη CIDRE	Αφίδες <i>Aphis citricola</i> APHISI Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	15-20	75-150	15-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Καρπόκαψες <i>Cydia molesta</i> LASPMO Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips meridionalis</i> TAETME Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> <i>Thrips major**</i> THRIMA Ανατολική μύγα των καρπών**	20-30	75-100	15-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	<i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Αφίδες <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL <i>Aphis pomi</i> ARHIPO <u>Χρήσεις ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Βαμβακάδα της μηλιάς** <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA Θρίπες** <i>Taeniothrips</i> <i>inconsequens</i> TAETIN <i>Taeniothrips</i> <i>meridionalis</i> TAETME Ανθονόμος** <i>Anthonomus</i> <i>pomorum</i> ANTHPO <i>Anthonomus pyri</i> ANTHPY Κηκιδόμυγα** Cecidomyiidae 1CECIF Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	15-30	75-100	10-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Καρπόκαψα μηλιάς <i>Cydia pomonella</i> CARPPO	30		25-30		

Αμπέλι VITVI Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα	Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Τσιγαρολόγος** <i>Bytiscus betulae</i> BYCTBE Μύγα της Μεσογείου** <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20-30	60-100	15-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO Θρίπας της Καλιφόρνια <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	30		30		
Ελιά OLVEU	Πυρηνотρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κοκκοειδή** Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL <i>Pollinia pollini</i> POLNPO <i>Leucaspis riccae</i> LEUARI <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE	15-20	75-150	15-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

<i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Ρυγχίτης** <i>Rhynchites cribripennis</i> COENCR Καλόκορη** <i>Calocoris trivialis</i> CLCRTR Κηκιδόμυγα** <i>Dasineura oleae</i> DASYOL <i>Resseliella oleisuga</i> CLINOL Κόσσοι** <i>Cossus cossus</i> COSSCO Ωτιόρυγχος** <i>Otiorhynchus cribricollis</i> OTIOCR Μετκάλφα** <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR Σκολύτεις** Φλοιοτρίβης <i>Phloeotribus scarabaeoides</i> PHLBOL Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
--	--	--	--	--	--

Λαχανικά Τομάτα (Υ+Θ) LYPES	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Heliothis armigera</i> HELIAR Πλούζια <i>Plusia</i> sp. PLUSSP Αλευρώδης <i>Bemisia tabacci</i> BEMITA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20-30	60-100	15-30	Για τις αφίδες κατευθυνόμενοι ψεκάσμοι στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει να αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Για λοιπούς εχθρούς ψεκάσμοι όταν οι πληθυσμοί αυξάνουν σε επίπεδο προβλήματος.	2/14
Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Θρίπες** <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>T. angusticeps</i> THRIAN <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>F. intonsa</i> FRANIT Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20-30	60-100	15-30	Όταν οι πληθυσμοί αυξάνουν σε επίπεδο προβλήματος.	2/14

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPE	Αλευρώδης <i>Bemisia tabacci</i> BEMITA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20-30	60-100	15-30	Όταν οι πληθυσμοί αυξάνουν σε επίπεδο προβλήματος.	2/14
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA	Αλευρώδης <i>Bemisia tabacci</i> BEMITA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20-30	60-100	15-30	Όταν οι πληθυσμοί αυξάνουν σε επίπεδο προβλήματος.	2/14
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME	Αλευρώδης <i>Bemisia tabacci</i> BEMITA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Μαμέστρα** <i>Mamestra brassicae</i> BARABR <i>M. oleracea</i> POLIOL Πιερίδα** <i>Pieris</i> sp. PIERSP Πράσινο σκουλήκι* <i>Heliothis armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα* <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP	20-30	60-100	15-30	Όταν οι πληθυσμοί αυξάνουν σε επίπεδο προβλήματος.	2/14

	Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Ψυχανθή Φασόλι χλωρό με λοβό και χωρίς λοβό (Υ+Θ) PHSVX	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA	20-30	60-100	15-30	Κατευθυνόμεν ος ψεκασμός στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει να αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.	2/14
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	20-30	60-100	15-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Ζαχαρότευτλα BEAVX	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA Φυλλορύκτης <i>Pegomya betae</i> PEGOHY <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Myzus persicae**</i> MYZUPE	20-50	50-60	10-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Σιτάρι TRZDU, TRZAX Κριθάρι HORVX Σίκαλη SECCE	Αφίδες <i>Sitobion</i> spp. MACSSP <i>Rhopalosiphum</i> spp. RHOPSP	30-50	50-60	15-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
Αραβόσιτος ZEAMX	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	30-50	50-60	15-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Ελαιοκράμβη BRSNN	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA Κοφτοσκούληκο <i>Agrotis</i> spp. AGROSP	20-25	50-60	10-15	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1

	Κολεόπτερα <i>Meligethes aeneus</i> MELIAE Φυτονόμος <i>Hypera posticus</i> HYPRPO Άλτης <i>Psyllioides</i> <i>chrysocephala</i> PSYICH					
Καλλωπιστικά (Υ)* NNNZZ Χρήση ήσσονος σημασίας	Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC <i>F. intonsa</i> FRANIT	20-30	75-100	20-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Δενδρύλλια φυτωρίων (Θ)* Χρήση ήσσονος σημασίας	Αφίδες <i>Macrosiphon rosae</i> MACSRO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>A. viburni</i> APHIVB <i>A. craccivora</i> APHICR Προνύμφες λεπιδοπτέρων <i>Coecimorpha</i> <i>pronubana</i> TORTPR <i>Hyphantria cunea</i> HYPHCU <i>Tortrix viridana</i> TORTVI <i>Lymantria dispar</i> LYMADI <i>Thaumetopoea</i> <i>proccessionea</i> THAUPR <i>T. pityocampa</i> THAUPI Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20-30	80-100	20-30	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

Παρατηρήσεις:

1. Για την αντιμετώπιση του πηρυνοτρήτη στην ελιά, να εφαρμόζεται η χαμηλή δόση για την αντιμετώπιση της ανθόβιας γενιάς, και η μεγάλη δόση για την αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς.
2. Εφόσον χρησιμοποιείται διαφορετικός όγκος ψεκαστικού υγρού (μειωμένοι όγκοι ψεκασμού) να τηρείται η προτεινόμενη δόση ανά στρέμμα που προτείνεται για τους συνήθεις όγκους.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα Καλλωπιστικά και στα Δενδρύλλια φυτωρίων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.»

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά:

- του *Thrips major*, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων
- της βαμβακάδας, του θρίπα, του ανθονόμου, της κηκιδόμυγας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες των μηλοειδών
- του τσιγαρολόγου, της μύγας της Μεσογείου, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια του αμπελιού
- των κοκκοειδών, του ρυγχίτη, της καλόκορης, της κηκιδόμυγας, του κόσσου, του ωτιόρυγχου, της μετκάλφας, των σκολυτών, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της ελιάς
- του θρίπα, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της μελιτζάνας
- της μαμέστρας, της πιερίδας, του πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια του πεπονιού
- της *Myzus persicae* στην καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων
- της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, της τομάτας, του κολοκυθιού και του καρπουζιού

Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8534/95163/12.09.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ