



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αρ. πρωτ.

20.03.2025
76890

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Παπαλέξη Μελομένη
Τηλέφωνο: 210 928 7247
e-mail: mpapalexi@minagric.gr

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα

e-mail: athanasios.lysandropoulos@corteva.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LADIVA EC (δ. ο. halauxifen-methyl 1% β/ο, picloram 4% β/ο, aminopyralid 3,2% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2018/155 της επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...aminopyralid...
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 2015/1165 της επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...halauxifen-methyl...
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 2023/2592 της επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...picloram...
 - ε) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - στ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ζ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

η) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

3. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’131/27.06.2023).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β’4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
8. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
9. Την από τον Οκτώβριο του 2022 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος LADIVA στην Γαλλία με κωδικό GF-4021 (αριθμ. έγκρισης: 2220690).
10. Την αριθμ. 4286/112387/11.04.2023 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία και τα συμπληρωματικά στοιχεία με αριθμ. πρωτ. 5475/139973/20.05.2024, 343867/07.11.2024, 3251/08.01.2025 και 25964/30.01.2025.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) LADIVA EC (δ. ο. halauxifen-methyl 1% β/ο, picloram 4% β/ο, aminopyralid 3,2% β/ο)** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70587

20.03.2025

31.12.2025

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

LADIVA EC

1.2.β Μορφή

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

halauxifen-methyl

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	93% (β/β) min
Χημική ομάδα	6-Arylpicolinates
Παρασκευαστής	Corteva Agriscience International Sàrl Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία
Εργοστάσια παρασκευής της δ. ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: CALACHEM FINE CHEMICALS LTD Earls Road, Grangemouth, Stirlingshire, FK3 8XG, Ηνωμένο Βασίλειο Corteva Agriscience LLC 701 Washington Street, Midland, Michigan, 48640, 48667, ΗΠΑ Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited SEZ – Unit, Kesavaram & Rajavaram, Venkatanagaram Post, Payakaraopeta Mandal, Visakhapatnam Dist., Andhra Pradesh – 531127, Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 4286/112387/11.04.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	picloram
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	92% (β/β) min
Χημική ομάδα	Πυριδίνες
Παρασκευαστής	Corteva Agriscience International Sàrl Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία
Εργοστάσια παρασκευής της δ. ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Corteva Agriscience LLC 2301 N. Brazosport Boulevard, Freeport, Texas, 77541-3257, ΗΠΑ LIER CHEMICAL CO. LTD Economic & Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan, 621000, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 4286/112387/11.04.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 3	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	aminopyralid
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	92% (β/β) min
Χημική ομάδα	Ομάδα πικολινικού καρβοξυλικού οξέος
Παρασκευαστής	Corteva Agriscience International Sàrl Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία
Εργοστάσια παρασκευής της δ. ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Corteva Agriscience LLC 701 Washington St, Midland, Michigan, 48640, ΗΠΑ 2. LIER CHEMICAL CO. LTD Economic & Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan, 621000, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 4286/112387/11.04.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280

Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: +30 2106889700

E-mail: athanasios.lysandropoulos@corteva.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280

Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: +30 2106889700

E-mail: athanasios.lysandropoulos@corteva.com

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280

Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: +30 2106889700

E-mail: athanasios.lysandropoulos@corteva.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος

Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Corteva Agriscience France S.A.S.**
Route de Herrlisheim 8,
Drusenheim, CS10820, Alsace, 67410, Γαλλία
- 2. DIACHEM S.p.A**
Via Mozzanica, 9/11, 24043 Caravaggio, Bergamo, Ιταλία
- 3. Corteva Agriscience LLC**
701 Washington Street, Midland Michigan, 48640, ΗΠΑ

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Corteva Agriscience France S.A.S.**
Route de Herrlisheim, 8,
Drusenheim, CS10820, Alsace, 67410, Γαλλία
- 2. DIACHEM S.p.A**
Via Mozzanica, 9/11, 24043 Caravaggio, Bergamo, Ιταλία
- 3. Corteva Agriscience LLC**
701 Washington Street, Midland Michigan, 48640, ΗΠΑ
- 4. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**
80^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας
- 5. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ**
ΒΙΠΕΘ, Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
- 6. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ, Τ.Θ. 1089, 570 22, Σίνδος, Θεσσαλονίκη

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστικές ουσίες:

Halauxifen-methyl: 1% β/ο

Picloram: 4,8% β/ο

Aminopyralid: 3,2% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 89,66% β/ο

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 4286/112387/11.04.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2	Συσκευασίες		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη/Μπιτόνι	250 ml – 2 L	PET, HDPE/PA
2	Δοχείο	250 ml – 20 L	PET, HDPE/PA

3 Οδηγίες χρήσης**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος.**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. Η ανάδευση να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο με ράβδο ψεκασμού. Χρησιμοποιήστε πίεση ψεκασμού και ύψος ράβδου κατάλληλα για τον τύπο των ακροφυσίων και την καλλιέργεια στην οποία θα εφαρμοστεί.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται εσωτερικά και εξωτερικά με νερό και απορρυπαντικό όπως παρακάτω:

1. Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείως το ψεκαστικό μηχάνημα. Απομακρύνετε με νερό τα ίχνη του σκευάσματος που βρίσκονται εξωτερικά του βυτίου.
2. Πλύνετε το εσωτερικό του βυτίου και τις σωληνώσεις χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 του όγκου του βυτίου και στη συνέχεια αδειάστε εντελώς το βυτίο.
3. Γεμίστε το βυτίο έως τη μέση και προσθέστε απορρυπαντικό ή οποιοδήποτε άλλο αμμωνιακό απορρυπαντικό. Ανακινήστε και ξεπλύνετε τα εσωτερικά τμήματα και τις σωληνώσεις με το διάλυμα. Συμπληρώστε τη δεξαμενή με νερό αφού βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλεισμένη και αναδεύστε επί 15λεπτού.
4. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα να απομακρύνονται και να καθαρίζονται ξεχωριστά με τη χρήση απορρυπαντικού.
5. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη του βυτίου συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των άλλων τμημάτων του ψεκαστικού, τουλάχιστον με νερό ίσο με το 1/10 του βυτίου και αδειάστε τελείως το βυτίο.
6. Για τη διαχείριση των νερών του καθαρισμού ακολουθήστε τη συνήθη πρακτική διαχείρισης φ.π. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη, τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

Σημείωση: Αν είναι δυνατό, για το πλήρες άδειασμα του βυτίου το βήμα 3 πρέπει να επαναλαμβάνεται πριν συνεχιστεί η διαδικασία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων στη χειμερινή ελαιοκράμβη. Αποτελείται από τρεις δραστικές ουσίες που διαταράσσουν τη ρύθμιση της αυξίνης: halauxifen-methyl, picloram και aminopyralid, Ο Group HRAC. Το Halauxifen-methyl απορροφάται κυρίως μέσω των φύλλων και ως εκ τούτου θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.

Οι δραστικές εισέρχονται στα ζιζάνια από το φύλλωμα και από τις ρίζες. Μεταφέρονται γρήγορα μέσω του ηθμού και του ξύλου.

Προκαλούν υπερβολική διέγερση με αποτέλεσμα τη διατάραξη της φυσιολογικής ανάπτυξης των ζιζανίων, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Χειμερινή ελαιοκράμβη BRSNN	Πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 ή 25	10-30	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της έκπτυξης του 2 ^{ου} φύλλου μέχρι τα 9 (ή περισσότερα) φύλλα ή το τέλος του σχηματισμού της ροζέτας (BBCH 12-19)	1/3 χρόνια

Παρατηρήσεις:

1. Η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται στα νεαρά στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων.
2. Το σκεύασμα δεν ξεπλένεται από την βροχή, εφόσον έχει περάσει 1 ώρα από την εφαρμογή.
3. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας και των ζιζανίων, την πυκνότητα των ζιζανίων, αλλά και από τις κλιματικές συνθήκες.
4. Αποφύγετε τον ψεκασμό κατά τη διάρκεια παρατεταμένων ψυχρών περιόδων ή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 25 °C υπό σκιά.
5. Εφαρμόστε σε ημέρες χωρίς άνεμο (ή όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μικρότερη από 19 km/h).
6. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε καταπονημένη καλλιέργεια.

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Δόση 25 κ.εκ./στρ.:**

Πολύ ευαίσθητα:

Παπαρούνα - *Papaver rhoeas* (PAPRH)

Χαμομήλι - *Matricaria chamomilla* (MATCH)

Στελλάρια - *Stellaria media* (STEME)

Ευαίσθητα:

Βερόνικα *Veronica persica* (VERPE)

Μετρίως ευαίσθητα:

Ανάκυκλος ο κορυνώδης - *Anacyclus clavatus* (ANYCL)

Δόση 20 κ.εκ./στρ.:

Ευαίσθητα:

Παπαρούνα *Papaver rhoeas* (PAPRH)

Χαμομήλι *Matricaria chamomilla* (MATCH)

Στελλάρια - *Stellaria media* (STEME)

Μετρίως ευαίσθητα:

Βερόνικα *Veronica persica* (VERPE)

Ανάκυκλος ο κορυνώδης - *Anacyclus clavatus* (ANYCL)

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει halauxifen-methyl, picloram και aminopyralid που ανήκουν στην ομάδα 4 κατά HRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή ή ο συνδυασμός, στο ίδιο χωράφι, σκευασμάτων που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, τόσο κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου όσο και κατά την αμειψισπορά.

7

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο (π.χ. λόγω παγετού, ξηρασίας, ασθενειών κ.λπ.), οι καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση της αποτυχημένης καλλιέργειας την άνοιξη είναι:

- σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι: 4 μήνες (120 ημέρες)
- ηλίανθος: 5 μήνες (150 ημέρες)

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μετά από εφαρμογή του σκευάσματος LADIVA EC σε δόση 20-25 κ. εκ./στρ έως το αναπτυξιακό στάδιο BBCH 19 σε κανονική αμειψισπορά μπορούν να σπαρούν φθινοπωρινά-χειμερινά δημητριακά και ελαιοκράμβη διατηρώντας τη συνιστώμενη περίοδο από την εφαρμογή έως την επόμενη σπορά: σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, κτηνοτροφικά δημητριακά. Όλες οι άλλες καλλιέργειες πρέπει να σπαρούν 1 έτος μετά.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή έως ότου περάσουν 24 ώρες.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες καλλιέργειες, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας. Πρόκειται κυρίως για προσωρινές παραμορφώσεις των φύλλων που εμφανίζονται τις πρώτες εβδομάδες μετά την εφαρμογή. Αυτά τα συμπτώματα δεν επηρεάζουν την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε καταπονημένη καλλιέργεια.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ





GHS05

GHS07

GHS09

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας/μακρυμανικό πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήσετε μία απσέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα.

SPE3: Για την προστασία των φυτών μη-στόχων, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη ή μειώστε τη διασπορά του ψκαστικού υγρού κατά 75%.

SPE1: Για την προστασία των υπόγειων υδάτων, μετά την εφαρμογή σε δόση 25 κ.εκ. σκ./στρ., μην εφαρμόζετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει aminopyralid περισσότερες από μία φορές κάθε **τρία** χρόνια.

SPE1: Για την προστασία των υπόγειων υδάτων, μετά την εφαρμογή σε δόση 20 κ.εκ. σκ./στρ., μην εφαρμόζετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει aminopyralid περισσότερες από μία φορές κάθε **δύο** χρόνια.

SPE1: Για την προστασία των υπόγειων υδάτων, μην εφαρμόζετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει picloram περισσότερες από μία φορές κάθε **δύο** χρόνια.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Γενικές συμβουλές: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς.

P302 + P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

P304 + P340: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε γιατρό.

P305+P351+P338+P310: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό αν δεν αισθάνεστε καλά.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

13

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Χειμερινή ελαιοκράμβη 401000	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει από την να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- 2-years storage stability study

B Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ