



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.05.2026
Αριθ. πρωτ.: 113790

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)
MATSUDA DUO (δ.ο. flazasulfuron 3% β/ο + iodosulfuron-methyl-sodium 1% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37§4 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθ. 2017/407 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **iodosulfuron**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Τη με αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

- Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β'2339/14.05.2025).
- 4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
 - 5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
 - 6. Την από τον Ιούλιο του 2024 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Μάλτας για το προϊόν MATSUDA DUO (κωδ.προϊόντος SAP1240H).
 - 7. Την αριθ. 5921/161961/19.06.2020 αίτηση καθώς και τα με αριθμ. 262088/29.09.2025 και τα από 24.04.2026 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37§4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) MATSUDA DUO (δ.ο. flazasulfuron 3% β/ο + iodosulfuron-methyl-sodium 1% β/ο)** της εταιρείας **ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλίας** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	70621
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	07.05.2026
1.1.β Ημερομηνία λήξης	31.03.2033
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν	
1.2.α Εμπορικό όνομα:	MATSUDA DUO
1.2.β Μορφή:	Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
1.3 Δραστική ουσία	
Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	Flazasulfuron
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	Min 97% β/β
Χημική ομάδα:	Σουλφονουλουρίες
Παρασκευαστής:	ASCENZA AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Jiangsu Repont Agrochemicals Co., Ltd. Yangkou Chemical Cluster Area, Nantong city, Jiangsu, Rudong, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 5921/161961/19.06.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Iodosulfuron (υπό μορφή *iodosulfuron–methyl sodium*)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Min 97,7% β/β

Χημική ομάδα:

Σουλφονουλουρίες

Παρασκευαστής:

ASCENZA AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Huaian Glory Chemical Co., Ltd.**
No. 2 Guoqiao Road,
Huaian Salt Chemical Industry Park,
Huaian, Postal code 223100, Κίνα
- 2. Jiangsu Repont Agrochemicals Co., Ltd.**
Yangkou Chemical Cluster Area, Nantong city, Jiangsu,
Rudong, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 5921/161961/19.06.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ASCENZA AGRO S.A.
Avenida do rio Tejo,
Herdade das Praias 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ASCENZA GREECE IKE
Λεωφόρος Μεσογείων 396, 15341, Αγία Παρασκευή, Αθήνα
Τηλ.: 211 10 32000
E-mail: info.greece@ascenza.rovensa.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που

παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ASCENZA AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

ASCENZA AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

ASCENZA AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: Flazasulfuron 3% β/ο

Iodosulfuron-methyl-sodium 1% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 95,68 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 5921/161961/19.06.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2	Συσκευασίες		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή δοχεία	60 κ.εκ. έως 20 λίτρα	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	60 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE Κουτί χάρτινο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός, με μηχανοκίνητα ή χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα, σε λωρίδες (στη γραμμή φύτευσης) προφυτρωτικά ή νωρίς, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για να αποφεύγεται να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος, με τα πράσινα μέρη των καλλιεργειών (φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, άνθη, τσαμπιά ή τις παραφυάδες) και τις μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Να μην παρασκευάζεται ποσότητα ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για την εφαρμογή.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε αμπέλι και ελιά. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (έως τα 4 φύλλα). Μίγμα δυο ζιζανιοκτόνων της ομάδας των Σουλφονουριών, δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο σύνθεση του οξειγαλακτικού (ALS), απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων και έχει υπολειμματική διάρκεια δράσης. Αναστέλλει τη σύνθεση πρωτεϊνών και την ανάπτυξη των ζιζανίων, οδηγώντας σε αποχρωματισμό των φύλλων και σταδιακή νέκρωση.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) VITVI	Καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων *	75 - 150 ⁽¹⁾⁽²⁾	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός, σε λωρίδες (στη γραμμή φύτευσης), προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, κατά τον χειμώνα – άνοιξη, καλύπτοντας το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.	1
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ελιές) OLVEU	Καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων *	75 - 100 ⁽¹⁾	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός, σε λωρίδες (στη γραμμή φύτευσης), προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων το φθινόπωρο.	1
		75 - 150 ⁽¹⁾		Κατευθυνόμενος ψεκασμός, σε λωρίδες (στη γραμμή φύτευσης), προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων κατά τον χειμώνα – άνοιξη, καλύπτοντας το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.	

Παρατηρήσεις:

1. Ανάλογα με την δόση, αλλάζει το φάσμα των ελεγχόμενων ζιζανίων.
2. Στη καλλιέργεια του αμπελιού, να χρησιμοποιείται το σκεύασμα με μέγιστη δόση 75 κ.εκ./στρ. όταν εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του λήθαργου.
3. Οι εφαρμογές μεταφυτρωτικά θα πρέπει να γίνονται μέχρι το στάδιο των τεσσάρων (4) φύλλων των ζιζανίων.
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
5. Να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη του ψεκαστικού υγρού κατά την εφαρμογή του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της απόδοσης της καλλιέργειας.
6. Να τηρείται ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών σε όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις:
 - Στο αμπέλι: Όταν πραγματοποιείται μία εφαρμογή τον χειμώνα, δεν επιτρέπεται επανάληψη της εφαρμογής την άνοιξη.
 - Στην ελιά: Όταν πραγματοποιείται μία εφαρμογή το φθινόπωρο, δεν επιτρέπεται επανάληψη της εφαρμογής τον χειμώνα / την άνοιξη.

***Καταπολεμούμενα Ζιζάνια:**

- Αμπέλι, Ελιά (χειμερινή εφαρμογή):

Προφυτρωτικά:

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75-150 κ. εκ. σκ./στρ.:

Πλατύφυλλα:

Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides* - AMABL)
 Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)
 Περικοκλάδα (*Erigeron bonariensis* - ERIBO),
 Ερίγκερο, Κόνιζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)
Diplotaxis muralis - DIPMU
 Βελονίδα μαλακοειδής (*Erodium malacoides* - EROMC)
 Κοινό ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum* - HEOEU)
 Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule* - LAMAM)
 Κοινή μολόχα (*Malva sylvestris* - MALSI)
Medicago lupulina - MEDLU
 Κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas* - PAPRH)
 Γλυστρίδα (Αντράκλα) (*Portulaca oleracea* - POROL)
Pulicaria arabica subsp. *hispanica* - PULPA
 Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)

Αγρωστώδη:

Αγριοβρώμη (*Avena fatua* - AVEFA)
 Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum* - LOLMU)

Νωρίς μεταφυτρωτικά (έως τα 4 φύλλα των ζιζανίων):

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75-150 κ. εκ. σκ./στρ.:

Πλατύφυλλα:

Ερίγκερο, Κόνιζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)
 Βελονίδα μαλακοειδής (*Erodium malacoides* - EROMC)
 Αγριομάρουλο (*Lactuca serriola* - LACSE)
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU)
 Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)

Αγρωστώδη:

Κοινή πόα (*Poa annua* - POAAN)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75-150 κ.εκ. σκ./στρ:**Αγρωστώδη:**

Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum* - LOLMU)

• Αμπέλι, Ελιά (ανοιξιάτικη εφαρμογή):**Προφυτρωτικά:****Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75 κ. εκ. σκ./στρ.:****Πλατύφυλλα:**

Symphyotrichum squamatum – ASTSQ

Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)

Ερίγκερο, Κόνιζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)

Τραχύς ζωχός (*Sonchus asper* - SONAS)

Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)

Αγρωστώδη:

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75 κ. εκ. σκ./στρ.:**Πλατύφυλλα:**

Γλυστρίδα (Αντράκλα) (*Portulaca oleracea* - POROL)

Αγριοντοματιά, Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 100-150 κ. εκ. σκ./στρ.:**Πλατύφυλλα:**

Symphyotrichum squamatum - ASTSQ

Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)

Ερίγκερο, Κόνιζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)

Γλυστρίδα (Αντράκλα) (*Portulaca oleracea* - POROL)

Αγριοντοματιά, Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)

Τραχύς ζωχός (*Sonchus asper* - SONAS)

Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)

Αγρωστώδη:

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)

Νωρίς μεταφυτρωτικά (έως τα 4 φύλλα των ζιζανίων):**Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75 κ. εκ. σκ./στρ.:****Πλατύφυλλα:**

Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)

Αγρωστώδη:

Μεγάλη αγριοβρώμη (*Avena sterilis* - AVEST)

Λεπτή ήρα (*Lolium rigidum* - LOLRI)

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 100-150 κ.εκ.σκ. / στρ:**Πλατύφυλλα:**

Ερίγκερο, Κόνιζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)
 Βελονίδα μαλακοειδής (*Erodium malacoides* - EROMC)
 Αγριοράδικο (*Taraxacum officinale* - TAROF)
 Βερόνικα (*Veronica persica* - VERPE)

Αγρωστώδη:

Μεγάλη αγριοβρώμη (*Avena sterilis* - AVEST)
 Λεπτή ήρα (*Lolium rigidum* - LOLRI)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ.σκ./ στρ:**Αγρωστώδη:**

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA) στο στάδιο των 1-2 φύλλων.

• Ελιά (φθινοπωρινή εφαρμογή):**Προφυτρωτικά:****Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75-100 κ. εκ. σκ./στρ.:****Πλατύφυλλα:**

Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides* - AMABL)
 Περικοκλάδα (*Erigeron bonariensis* - ERIBO)
 Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine* - GALAP)
 Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule* - LAMAM)
 Κοινή μολόχα (*Malva sylvestris* - MALSI)
 Κοινό χαμομήλι (*Matricaria chamomilla* - MATCH)
 Γλυστρίδα (Αντράκλα) (*Portulaca oleracea* - POROL)
 Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum* - RAPRA)
 Προβατόχορτο (*Sherardia arvensis* - SHRAR)
 Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)
 Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75 κ. εκ. σκ./στρ.:**Πλατύφυλλα:**

Πολυετής Ζωχός (*Sonchus arvensis* - SONAR)

Αγρωστώδη:

Αγριοβρώμη (*Avena fatua* - AVEFA)
 Βρόμος (*Bromus sterilis* - BROST)
 Αγριοκρίθαρο (*Hordeum murinum* - HORMU)

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 100 κ. εκ. σκ./στρ.:**Πλατύφυλλα:**

Πολυετής Ζωχός (*Sonchus arvensis* - SONAR)

Αγρωστώδη:

Αγριοβρώμη (*Avena fatua* - AVEFA)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 100 κ. εκ. σκ./στρ.:**Αγρωστώδη:**Βρόμος (*Bromus sterilis* - BROST)Αγριοκρίθαρο (*Hordeum murinum* - HORMU)**Νωρίς μεταφυτρωτικά (έως τα 4 φύλλα των ζιζανίων):****Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75-100 κ. εκ. σκ./στρ.:****Πλατύφυλλα:**Περικοκλάδα (*Erigeron bonariensis* - ERIBO)Κοινή Μολόχα (*Malva sylvestris* - MALSI)Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum* - RAPRA)Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)**Αγρωστώδη:**Κοινή Πόα (*Poa annua* - POAAN)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 75-100 κ. εκ. σκ./στρ.:****Πλατύφυλλα:**Ερίγκερο, Κόνιζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες Flazasulfuron και Iodosulfuron, οι οποίες ανήκουν στην **ομάδα 2** κατά **HRAC**.

- Για τις ελιές, να αποφεύγεται κάθε επαφή των καρπών με το προϊόν ή με το ψεκασμένο έδαφος, όταν η εφαρμογή πραγματοποιείται λιγότερο από 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή.
- Για ελιές και σταφύλια, να μη συλλέγονται καρποί που έχουν πέσει στο έδαφος.
- Για το αμπέλι, να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη από 35% και σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο μεγαλύτερη από 50%.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, βιολογικές μέθοδοι, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στη ετικέτα του σκευάσματος. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας στο αμπέλι όπως: μείωση της φυλλικής επιφανειας, αποχρωματισμός και συστροφή φύλλων. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης, αποφύγετε την επικάλυψη του ψεκαστικού υγρού κατά την εφαρμογή του προϊόντος.
----------	--	--

9 Εικονογράμματα κινδύνου/
Προειδοποιητική λέξη:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο κατά την ανάμειξη / φόρτωση του σκευάσματος.
 Φοράτε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.
 Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.*

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** στην ελιά και στο αμπέλι (χειμερινή/ανοιξιάτικη εφαρμογή).
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** στην ελιά (φθινοπωρινή εφαρμογή).

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε από γειτονικές καλλιέργειες / μη γεωργική γη μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στην ελιά και στο αμπέλι.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες [Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005]	Ημέρες
Αμπέλι [επιτραπέζιες (0151010) και οινοποιήσιμες (0151020) ποικιλίες]	14
Ελιά (επιτραπέζια-0161030, ελαιοποιήσιμη-0402010)	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **τμήμα Α** της έκθεσης **αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα

απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ