



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.12.2021
Αριθ. πρωτ: 12290/338762

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON S.p.A., Ιταλία
(Δια της SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ)
e-mail: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70267 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MENTOR GOLD (dimethenamid-p 26,5% β/ο + terbuthylazine 30% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofor, fluorogran, ipconazole και **terbuthylazine** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
5. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 6260/61064/03.01.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70267 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MENTOR GOLD (dimethenamid-p 26,5% β/ο + terbuthylazine 30% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 12290/338762/29.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70267 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MENTOR GOLD (dimethenamid-p 26,5% β/ο + terbutylazine 30% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 6260/61064/03.01.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης.

Τα σημεία 5, 7 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Καλαμπόκι ZEAMX	Ετήσια* αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200-280	20-40	Προφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό
Καλαμπόκι ZEAMX	Ετήσια* αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200-250	20-40	Νωρίς μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια στο στάδιο από ένα έως τρία πραγματικά φύλλα	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Η μικρή δόση εφαρμόζεται σε ελαφρά και η μεγάλη σε βαριά εδάφη. 2. Για να έχουμε την καλύτερη αποτελεσματικότητα απαιτείται εντός δύο εβδομάδων, βροχή τουλάχιστον 10-15 χιλιοστών. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει άρδευση. 3. Το προϊόν δεν δρα σε τυρφώδη εδάφη. 4. Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση των 280 κ.εκ./στρ. 5. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σκευάσματος MENTOR GOLD στην καλλιέργεια του καλαμποκιού σε αμμώδη εδάφη και περιοχές με υψηλή βροχόπτωση. <p>* Ευαίσθητα ζιζάνια:</p> <p><u>A. Αγρωστώδη ζιζάνια:</u> <i>Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli-ECHCG), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum-PANDI), Σετάρια (Setaria viridis-SETVI, Σπονδυλωτή σετάρια (Setaria verticillata.-SETVE), Αιματόχαρτο (Digitaria sanguinalis-DIGSA), Βέλιουρας (Sorghum halepense-SORHA).</i></p> <p><u>B. Πλατύφυλλα ζιζάνια:</u> <i>Βλήτα (Amaranthus spp.-AMASS), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare-POLAV), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum-SOLNI), Λουβουδιά (Chenopodium album-CHEAL), Αντράκλα (Portulaca oleracea-POROL), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria-POLPE), Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium-POLLA), Πολύγωνο (Polygonum convolvus-POLCO), Βερόνικα (Veronica persica-VERPE), Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis-VIOAR), (Atriplex patula- ATXPA), Solanum physalifolium (SOLPS).</i></p> <p>* Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti-ABUTH), Ξάνθιο (Xanthium spp.-XANSS), Τάτουλας (Datura stramonium DATST), Χαμομήλι (Matricaria spp.-MATSS).</i></p>					

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μετά από βαθιά άρση (40 εκ.) και περίοδο αναμονής τουλάχιστον 5 μηνών για σιτηρά και τουλάχιστον 10 μηνών για άλλες καλλιέργειες από την εφαρμογή του προϊόντος.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

11

Δηλώσεις Προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P264: Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό να φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbutylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας έως τις 14.02.2022.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 14.05.2022.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 14.06.2022.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 6260/61064/03.01.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ