



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.06.2026  
Αριθ. πρωτ: 163579

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 225  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70246 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MINSK (δ.ο. flzasulfuron 25% β/β), ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45),
  - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
3. Την αριθμ. 81040/31.03.2026 απόφασή μας, με την οποία ανανεώθηκε η με αριθμ. 70246 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MINSK ( δ.ο. flzasulfuron 25% β/β).
4. Την από 12/2022 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 2215/01.12.2022).
5. Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
6. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).

7. Τις αριθ. πρωτ. 3812/100276/10.04.2020, 1908/57563/03.03.2022 και 12737/375152/09.12.2022 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **70246** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **MINSK ( δ.ο. flazasulfuron 25% β/β)**, η οποία ανανεώθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 81040/31.03.2026, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

| <b>5</b> Φάσμα δράσης   |   |                    |                                  |   |                                       |
|---|---|--------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Πεδίο Εφαρμογής   | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος |                                  | Χρόνος εφαρμογής  | Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο |
|   |   | Γραμ./ στρ.        | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |   |                                       |
| Λεμονιά<br>CIDLI,<br>Μανταρινιά<br>CIDRE,<br>Πορτοκαλιά<br>CIDSΙ<br>Γκρέιπ Φρουτ<br>CIDPA | Ετήσια<br>αγρωστώδη και<br>πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br>Πολυετή ζιζάνια * | 16                 | 20 – 40                          | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός στη γραμμή<br>φύτευσης ή τοπικά,<br>καλύπτοντας<br>επιφάνεια έως το 1/3<br>της συνολικής έκτασης<br>του αγρού.<br>Εφαρμόζεται<br>προφυτρωτικά ή νωρίς<br>μεταφυτρωτικά των<br>ζιζανίων, την άνοιξη –<br>καλοκαίρι (Απρίλιος –<br>Αύγουστος).               | 1                                     |
| Ελιά<br>OLVEU   | Ετήσια<br>αγρωστώδη και<br>πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br>Πολυετή ζιζάνια * | 16                 | 20 – 40                          | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός στην γραμμή<br>φύτευσης ή τοπικά,<br>καλύπτοντας<br>επιφάνεια έως το 1/3<br>της συνολικής έκτασης<br>του αγρού.<br>Εφαρμόζεται<br>προφυτρωτικά ή νωρίς<br>μεταφυτρωτικά των<br>ζιζανίων, από το<br>φθινόπωρο έως και την<br>άνοιξη (Οκτώβριος-<br>Μάρτιο). | 1                                     |
| Αμπέλι<br>VITVI   | Ετήσια<br>αγρωστώδη και<br>πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br>Πολυετή ζιζάνια * | 16                 | 10 – 40                          | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός στην γραμμή<br>φύτευσης ή τοπικά,<br>καλύπτοντας<br>επιφάνεια έως το 1/3<br>της συνολικής έκτασης<br>του αγρού.<br>Εφαρμόζεται<br>προφυτρωτικά ή νωρίς<br>μεταφυτρωτικά των  | 1                                     |

|  |  |    |         |   |   |
|--|--|----|---------|---|---|
|  |  |    |         | ζιζανίων, στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης (Φεβρουάριος-Απρίλιος).  |   |
| Αμυγδαλιά<br>PRNDU<br>Καρυδιά<br>IUGRE<br>Φουντουκιά<br>CYLAV  | Ετήσια<br>Αγρωστώδη και<br>πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br>Πολυετή ζιζάνια* | 16 | 20 – 40 | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός στην<br>γραμμή<br>φύτευσης,<br>καλύπτοντας<br>επιφάνεια έως το 1/3<br>της συνολικής έκτασης<br>του αγρού.<br>Εφαρμόζεται τέλος<br>χειμώνα-άνοιξη,<br>προφυτρωτικά ή νωρίς<br>μεταφυτρωτικά των<br>ζιζανίων<br>(Φεβρουάριος-<br>Απρίλιος) | 1 |
| Ακαλλιέργητες<br>εκτάσεις<br>(Σιδηρόδρομοι,<br>βιομηχανικές<br>περιοχές,<br>αρχαιολογικοί<br>χώροι,<br>νεκροταφεία,<br>πλατείες, πλάι σε<br>δρόμους και<br>εθνικοί οδοί, σε<br>χώροι με<br>φωτοβολταϊκά<br>πάνελ, σε<br>αστικές και<br>αγροτικές<br>περιοχές). | Ετήσια<br>αγρωστώδη και<br>πλατύφυλλα<br>ζιζάνια<br>Πολυετή ζιζάνια* | 20 | 10 – 40 | Εφαρμόζεται<br>προφυτρωτικά ή νωρίς<br>μεταφυτρωτικά των<br>ζιζανίων.   | 1 |

## Παρατηρήσεις:

1. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με προφυτρωτικές εφαρμογές.
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ ύψος (BBCH 14).
3. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
4. Η χρήση στη Μανταρινιά (CIDRE) περιλαμβάνονται και τις Κλημεντίνες (CIDCL)
5. Η χρήση στη Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνονται και τα Κίτρα (CIDME)

**\*Καταπολεμούμενα Ζιζάνια για Εσπεριδοειδή, Ελιά, Αμπέλι και Ακαλλιέργητες εκτάσεις:**

## Ευαίσθητα ζιζάνια

Αγρωστώδη:

*Avena fatua* - AVEFA (Αγριοβρώμη)*Bromus sterilis* - BROST (αγριοβρώμη)*Echinochloa crus-galli* - ECHCG (Μουχρίτσα)*Lolium spp*- LOLSS (Ηρα)

*Poa annua* - POAAN (πόα)

*Setaria verticillata* - SETVE, *S. viridis* - SETVI, *S. pumila* - SETPU (Σετάριας)

Πλατύφυλλα:

*Amaranthus retroflexus* - AMARE (Βλήτο)

*Calendula arvensis* - CLDAR (Καλεντούλα)

*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP (Καψέλλα)

*Chenopodium album* - CHEAL (Λουβουδιά)

*Conyza (Erigeron) canadensis* - ERICA (Κόνυζα)

*Daucus carota* - DAUCA (Αγριοκαρότο)

*Diplotaxis erucoides* - DIPER (Άγρια ρόκα)

*Fumaria spp.* - FUMOF (Καπνόχορτο)

*Geranium dissectum* - GERDI *G. rotundifolium* - GERRT (Γεράνι)

*Lamium sp.* - LAMSS (Λάμιο)

*Malva sp* - MALSS (Μολόχα)

*Portulaca oleracea* - POROL (Αντράκλα)

*Senecio vulgaris* - SENVU (Μαρτιάκος)

*Stellaria media* - STEME (Στελλάρια)

*Solanum nigrum* - SOLNI (Στύφνος)

*Taraxacum officinale* - TAROF (Αγριοράδικο)

*Trifolium spp* - TRFSS (Τριφύλλι)

*Urtica spp.* - URTSS (Τσουκνίδα)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

*Convolvulus arvensis* - CONAR (Περιπλοκάδα)

*Cyperus spp.* - CYPSS - (Κύπερη)

*Euphorbia spp* - EPHSS (Γαλατσίδα)

*Sonchus arvensis* - SONAR, *S. oleraceus* - SONOL (Ζωχοί)

*Veronica persica* - VERPE (Βερόνικα)

**\*Καταπολεμούμενα Ζιζάνια για Αμυγδαλιά, Φουντουκιά και Καρυδιά:**

**Προφυτρωτική εφαρμογή:**

Ευαίσθητα ζιζάνια

*Amaranthus blitoides* - AMABL (Βλήτο πλαγιαστό)

*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP (Καψέλλα)

*Chenopodium album* - CHEAL (Λουβουδιά)

*Cyperus rotundus* - CYPRO (Κάπουρος)

*Diplotaxis erucoides* - DIPER (Άγρια ρόκα)

*Euphorbia serpens* - EPHSN (Ευφόρβια)

*Erigeron bonariensis* - ERIBO

*Hordeum murinum* - HORMU (Αγριοκρίθαρο)

*Poa annua* - POAAN (πόα)

*Portulaca oleracea* - POROL (Αντράκλα)

*Stellaria media* - STEME (Στελλάρια)

**Μεταφυτρωτική εφαρμογή:**

Ευαίσθητα ζιζάνια

*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP (Καψέλλα)

*Hordeum murinum* - HORMU (Αγριοκρίθαρο)

*Poa annua* - POAAN (Πόα)

*Stellaria media* - STEME (Στελλάρια)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

*Convolvulus arvensis* - CONAR (Περιπλοκάδα)

**Taraxacum officinale – TAROF (Αγριοραδίκι / Ταραξάκο)****11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
 P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
 P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμο φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.*

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- Αμπέλι: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων
- Εσπεριδοειδή: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων,
- Ελιά: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων,
- Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων
- **Αμυγδαλιά, φουντουκιά και καρυδιά: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων**

SPe3: Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργειες                          | Ημέρες                                  |
|---------------------------------------|---|
| Αμπέλι                                | 75                                      |
| Εσπεριδοειδή                          | 45                                      |
| Ελιά                                  | 45                                      |
| <b>Καρυδιά, Φουντουκιά, Αμυγδαλιά</b> | <b>Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής</b> |
| Ακαλλιέργητες εκτάσεις                | Δεν ορίζεται                            |

II. Ετικέτα σκευάσματος

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 81040/31.03.2026 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

**ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**