

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02-06-2026
Αριθ. πρωτ.: 140066

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

ΠΡΟΣ: 1. ΣΑ Θεσσαλίας ΘΕΣγη
2. ΓΕΟΚ ΑΕ ΟΠ (ΕΓΑ) - ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
3. ΓΣ ΧΑΛΚΗΣ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ"

ΚΟΙΝ.: 1. ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΜΑΓΜΑ ΑΓΡΟ ΑΕΒΕ
3. ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα **BORUZIN 70 WG, MISTRAL 70 WG** και **BUZIN 70 WG** (δραστική ουσία *metribuzin*), για χρήση σε **τομάτα υπαίθρου** »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006".
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαιών συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1 αυτού.

8. Τη με αριθ. 123088/15.5.2026 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΚ4653ΠΓ-5ΩΡ) Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 85662/3.4.2026 αίτηση του ΣΑ Θεσσαλίας ΘΕΣγη για το σκεύασμα MISTRAL 70 WG (PPP-2026-38531).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 78126/27.3.2026 αίτηση της ΓΕΟΚ ΑΕ ΟΠ (ΕΓΑ) - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ για το σκεύασμα BORUZIN 70 WG (PPP-2026-38871).
11. Τη με αριθ. πρωτ. 99203/22.4.2026 αίτηση του ΓΣ ΧΑΛΚΗΣ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" για το σκεύασμα BUZIN 70 WG (PPP-2026-39153).
12. Το αριθ. 132451/25.5.2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
13. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ για χορήγηση κατά παρέκκλιση αδειών για την εξεταζόμενη χρήση.
14. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα επειδή:

- 1) Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, δύναται να χορηγείται, σε ειδικές περιστάσεις, άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση διάρκειας έως 120 ημερών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα.
- 2) Στην προκειμένη περίπτωση, υποβλήθηκαν αιτήσεις για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία *metribuzin* για μεταφυτρωτική εφαρμογή στην καλλιέργεια της υπαίθριας τομάτας, με στόχο την αντιμετώπιση της αντράκλας (*Portulaca oleracea*).
- 3) Από τα στοιχεία των αιτήσεων, τις εισηγήσεις των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών και το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών προκύπτει ότι η αντράκλα αποτελεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσχερώς αντιμετωπίσιμο ζιζάνιο στην υπαίθρια τομάτα, ιδίως στις μεταφυτευόμενες καλλιέργειες, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στην ανάπτυξη της καλλιέργειας και στην παραγωγή.
- 4) Παρότι υφίστανται εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζιζανίου, οι διαθέσιμες λύσεις για αποτελεσματική μεταφυτρωτική αντιμετώπιση στην πράξη είναι περιορισμένες, ενώ ορισμένες από τις διαθέσιμες εφαρμογές αφορούν μόνο κατευθυνόμενο ψεκασμό ή παρουσιάζουν περιορισμούς ως προς την πρακτική εφαρμογή ή/και την ασφάλεια της καλλιέργειας. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα τρόπων δράσης αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- 5) Επιπλέον, η δραστική ουσία *metribuzin* χρησιμοποιούνταν επί σειρά ετών στην καλλιέργεια της υπαίθριας τομάτας για την ίδια ουσιαστικά γεωργική πρακτική με την αιτούμενη χρήση. Η μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επακόλουθη απόσυρση των σχετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ολοκληρώθηκαν εντός του 2025, με αποτέλεσμα η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδος να αποτελεί την πρώτη περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη χρήση δεν είναι πλέον διαθέσιμη στους παραγωγούς. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι συντρέχει ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος προσαρμογής στις νέες αγρονομικές συνθήκες που προέκυψαν από την κατάργηση ευρέως διαδεδομένης χρήσης του παρελθόντος.
- 6) Επίσης, η αιτούμενη χρήση αντιστοιχεί ουσιαστικά σε ήδη εφαρμοζόμενη στο παρελθόν χρήση (ίδια GAP), χωρίς επέκταση σε νέες καλλιέργειες ή ουσιαστική διαφοροποίηση των παραμέτρων εφαρμογής. Περαιτέρω, τα ισχύοντα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία *metribuzin* στην τομάτα παραμένουν αμετάβλητα και η αιτούμενη χρήση δεν εισάγει νέο καταναλωτικό σενάριο σε σχέση με εκείνο που είχε αξιολογηθεί κατά το προηγούμενο καθεστώς έγκρισης της δραστικής ουσίας και των σχετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- 7) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η παρούσα άδεια αφορά περιορισμένη χρονικά και ελεγχόμενη χρήση, κρίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά των αιτούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία *metribuzin* για χρήση στην υπαίθρια τομάτα, υπό τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για χρήση στην καλλιέργεια της **τομάτας υπαίθρου**, στα ακόλουθα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία *metribuzin* και εντός των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω:

- 1) **MISTRAL 70 WG**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ηλείας και Αρκαδίας,
- 2) **BORUZIN 70 WG**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας, Καστοριάς, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας.
- 3) **BUZIN 70 WG**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών, Δράμας, Κοζάνης, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Καστοριάς, Λάρισας, Ηλείας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Ξάνθης, Έβρου Ροδόπης, Καρδίτσας και Αττικής.

Τα στοιχεία των κατά παρέκκλιση αδειών είναι τα ακόλουθα:

I. MISTRAL 70 WG:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

7580
02-06-2026
30-09-2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

MISTRAL 70 WG
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Metribuzin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	93 % (β/β) min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	ADAMA AGAN Ltd Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel <i>European address</i> ADAMA Deutschland GmbH Edmund Rumpler Str. 6, 51149 Köln, Germany
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yancheng South Chemicals Co., Ltd, Κίνα (a production plant of Nutrichem Laboratory Co. Ltd Nutrichem Laboratory Co. Ltd, Κίνα) 2. Rallis India Limited, Ινδία Plot no 15, MIDC Estate TTC Industrial Area, Thane Belapur Road At Post: Turbhe, Taluka: Thane, Dist: Thane – 400703 Maharashtra, India 3. Rallis India Limited Plt no. Z110, Dahej, SEZ Part II

	P.O. Lakhigam, Taluk Varga, Dist. Bharuch – 392 130 Gujarat 4. Bharat Rasayan Limited Plot no 42/4, Amod Road GIDC, Dahej, District Bharuch-392130 Gujarat, Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη δραστική ουσία metribuzin έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΣΑ Θεσσαλίας ΘΕΣγη

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στους κατόχους της άδειας χρήσης

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λ. Κηφισίας 44, Κτίριο Γ, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Email: technical@adama.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Deutschland GmbH

Edmund Rumpler Str. 6, 51149 Köln, Germany

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. ADAMA AGAN Ltd

Northern Industrial Zone, P.O. Box 262
77102 Ashdod, Ισραήλ

2. Schirm GmbH Division Sideco

Mecklenburger Str. 229, D - 23568 Lübeck, Germany

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. ADAMA AGAN Ltd

Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

2. Schirm GmbH Division Sideco, Mecklenburger Str. 229,
D - 23568 Lübeck, Γερμανία

3. MAGMA-AGRO AEBE

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας

Ταχ. Δ/ση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

metribuzin 70% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 24,73% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	50 γραμ εως και 1 κιλού	Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα PE/Al/PE ή Κουτί χάρτινο με εσωτερική επίστρωση PE/Al/PE
2	Σακούλα	5 κιλών	Χάρτινος σάκος δύο στρώσεων με εσωτερική επίστρωση PE/Al/PE

3 Οδηγίες χρήσης:	<p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Το MISTRAL 70 WG εφαρμόζεται πριν ή μετά το φύτευμα τόσο των καλλιεργειών όσο και των ζιζανίων. Πριν την εφαρμογή του, προετοιμάστε καλά το χωράφι, ώστε να είναι ψιλοχωματισμένο. Οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (αυλάκωμα, παράχωμα, κ.λ.π.) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Η ύπαρξης αρκετής υγρασίας στο έδαφος κατά την εφαρμογή του ευνοεί τη δράση του σκευάσματος. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm.) και μπεκ τύπου σκούπας.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 1/3 – ½ του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε τη προδιάλυση του φαρμάκου στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.</p> <p>Συνδυαστικότητα: --</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι σακούλες μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας</p>
--------------------------	--

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μηδικής, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.
---------------------------------------	--

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Τομάτα (Υ) (LYPES)	Αντράκλα (Portulaca oleracea, POROL)	40	40-50	<p>A. Προφυτρωτικά: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά μέχρι το κέντρωμα των σπόρων</p> <p>ή</p> <p>B. Μεταφυτρωτικά: Εφαρμογή στο στάδιο των 2- 4 πραγματικών φύλλων μετά από αυλάκωμα ή το σχηματισμό «τραπεζιών».</p> <p>ή</p> <p>ΣΕ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ Εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και όταν τα φυτά έχουν «ριζοπιάσει» και έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Όταν εφαρμόζεται στα σαμάρια και στα αυλάκια η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια.</p>	1
Παρατηρήσεις:					
1) Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη, οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη					

- 2) Η εφαρμογή του σκευάσματος στην TOMATA, (προφυτρωτικά - μεταφυτρωτικά), συνιστάται στις ποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campell 33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198,, Euromeck, ACE-55, Early Pack-7. Στην ποικιλία Fantastic η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πλάτης και μπεκ τύπου σκούπας.
- 3) Να μη χρησιμοποιείται σε ποικιλίες τομάτας ευαίσθητες στο *metribuzin*.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα.
 - Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
 - Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα ή καλαμπόκι.
 - Αποφεύγετε τη χρήση του σε αμμώδη εδάφη σε εδάφη με περιεκτικότητα οργανικής ουσίας μεγαλύτερη από 6% σε οργανική ουσία.
 - Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
 - Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν.
 - Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
 - Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
 - Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε πολλές φορές τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό.
 - Κατά τους θερινούς μήνες αποφεύγετε να ψεκάζετε τις ζεστές ώρες της ημέρας.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας:

-σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα ή καλαμπόκι.

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή
των ζώων στην καλλιέργεια που
έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες και ποικιλίες που αναφέρονται στην ετικέτα.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

- 11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 Μακριά από παιδιά.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

EUH 401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777.
--------------------------------------	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Τομάτα	60

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος.	Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 35 °C, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
--	--

II. BORUZIN 70 WG:**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.629**02-06-2026****30-09-2026****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

BORUZIN 70 WG

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Metribuzin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97% (β/β) min
Χημική ομάδα	Τριαζινονών
Παρασκευαστής	Jiangsu Repont Agrochemical Co., Ltd. No. 18 Haiyou Road, Yangkou, Rudong, Jiangsu, 226407 China
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Jiangsu Repont Agrochemical Co., Ltd. No. 18 Haiyou Road, Yangkou, Rudong, Jiangsu, 226407 China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας metribuzin είναι εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένουν στη διάθεση της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Γ.Ε.Ο.Κ. ΑΕ ΟΠ (Ε.Γ.Α.) - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
--

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

MAGMA-AGRO A.E.B.E.Λ. Κηφισίας 55, 15123, Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 211 9904700
e-mail: info@magma-agro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

MAGMA-AGRO A.E.B.E.Λ. Κηφισίας 55, 15123, Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 211 9904700
e-mail: info@magma-agro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Jiangsu RepontAgrochemical co.,Ltd.No. 18 Haiyou Road, Yangkou, Rudong, Jiangsu,
226407 China

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Jiangsu RepontAgrochemical co.,Ltd.No. 18 Haiyou Road, Yangkou, Rudong, Jiangsu,
226407 China

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Jiangsu RepontAgrochemical co.,Ltd.**2. **MAGMA-AGRO A.E.B.E.**Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα, 32011, Βοιωτία,
Τηλ: 211 9904 800

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Metribuzin 70% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 27,84% β/β

2 Συσσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100 και 500 γραμ., 1 κιλό	Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα PET/PE
2.	Σακούλα	5 κιλών	Χάρτινος σάκος δύο στρώσεων με εσωτερική επίστρωση PET/PE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους ή του φυλλώματος με 40-50 λίτρα νερό στο στρέμμα. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο.

Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm.). Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.**Συνδυαστικότητα:** Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες τομάτας.

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα (Υ) (LYPES)	Αντράκλα (Portulaca oleracea, POROL)	40	40-50	A. Προφυτρωτικά: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά μέχρι το κέντρωμα των σπόρων ή B. Μεταφυτρωτικά: Εφαρμογή στο στάδιο των 2- 4 πραγματικών φύλλων μετά από αυλάκωμα ή το σχηματισμό «τραπεζιών». ή ΣΕ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ Εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και όταν τα φυτά έχουν «ριζοπιάσει» και έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Όταν εφαρμόζεται στα σαμάρια και στα αυλάκια η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια.	1
Παρατηρήσεις: 1. Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη, οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη. 2. Η εφαρμογή του σκευάσματος στην TOMATA, (προφυτρωτικά-μεταφυτρωτικά), συνιστάται στις ποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campell 33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198,, Euromeck, ACE-55, Early Pack-7. Στην ποικιλία Fantastic η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πλάτης και μεκ τύπου σκούπας. 3) Να μη χρησιμοποιείται σε ποικιλίες τομάτας ευαίσθητες στο <i>metribuzin</i> .					

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	Κατά τους θερινούς μήνες να αποφεύγετε να ψεκάσετε τις ζεστές ώρες της ημέρας.
---	--


7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προ-στατευόμενης καλλιέργειας:

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις αναφερθείσες καλλιέργειες και ποικιλίες.
----------	--	--

9	Εικονογράμματα κινδύνου:	 GHS09 ΠΡΟΣΟΧΗ
----------	--------------------------	---

10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
-----------	---------------------------	---

11	Δηλώσεις προφύλαξης:	<p>P102 Μακριά από παιδιά.</p> <p>P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.</p> <p>ΕΥΗ 401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»</p>
-----------	----------------------	--

12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:</p> <p>Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777</p>
-----------	----------------------------	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Τομάτα	60 ημέρες

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
-----------	--	--

III. BUZIN 70 WG:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70333

02-06-2026

30-09-2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

BUZIN

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δρ. ουσίας κατά ISO	Metribuzin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία	96,5 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Τριαζιόνες
Παρασκευαστές	1) Sharda Cropchem Limited 2nd floor , Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai - 400056, Ινδία Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη: Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία 2) Hemani Crop Care Private Limited C-301, C Wing, 3rd Floor, Neekanth Business Park, Ramdev Mandir Road, Vidhyavhan (W), Mumbai-400086, Ινδία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	1) Jianguo Seven Continent Green Chemical Co. Ltd 28 Chengbei Road, Zhargjiangang, Jiangsu, Κίνα 2) Hemani Crop Care Private Limited Plot No. DP 73-74, GIDC, Sayakha, Taluka-Vagra District-Bharuch, Gujarat-391340, Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>metribuzin</i> είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΗΣ “**Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ**”

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/κης, 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310798021, Fax: 2310545036, Email: info@profarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/κης, 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Sharda Cropchem Limited
2nd floor , Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) Mumbai - 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. **Spachem S.L.**, Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Ισπανία
2. **LUQSA (Lérida Union Quimica/SA)**
Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA), Ισπανία
3. **Torre S.r.l.**, Via Pian d'Asso, Torrenieri (Siena) - Ιταλία
4. **Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co. Ltd**
28 Chengbei Road, Zhargjiangang, Jiangsu, Κίνα
5. **Jiangsu Sword Agrochemicals Co., Ltd.**, No. 1008,
East Guanhua Road, Jianhu County, Jiangsu Province, Κίνα
6. **Jiangsu Repont Agrochemical Co. Ltd.**
No. 18 Haibin 2 Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu 226407 Κίνα
7. **Agrow Allied Ventures Pvt. Ltd.**
Plot No. SP - 3-7/B1, RIICO Industrial Area Keshwana, Kotputli,303108 Jaipur, Rajasthan, Ινδία
8. **Bharat Rasayan Ltd.**
42/4, Amod Road, GIDC Estate Dahej-392130, Gujarat, Ινδία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Spachem S.L.**, Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Ισπανία
2. **LUQSA (Lerida Union Quimica/SA)**
Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA), Ισπανία
3. **Torre S.r.l.**, Via Pian d'Asso, Torrenieri (Siena), Ιταλία
4. **Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co. Ltd**
28 Chengbei Road, Zhargjiangang, Jiangsu, Κίνα
5. **Agropak Spolka Jawna**
Brzeziński i wspolnicy, 43-603 Jaworzno Darwina Id, Πολωνία
6. **Agrototal-Productos Agroquimicos S.A.**, R. Dos NAVEGANTES,
No. 48 – R/C ESQ. 1200-732 Lisboa, Πορτογαλία
7. **ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: metribuzin 70% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 27,46 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακίδιο	30 γραμ. έως 10 κιλά	Σακούλα σύμμεικτου υλικού (αλουμίνιο - πολυαιθυλένιο).
2	Σακίδιο μέσα σε κουτί	30 γραμ. έως 10 κιλά	Σακούλα σύμμεικτου υλικού (αλουμίνιο - πολυαιθυλένιο), κουτί χάρτινο.

3	Οδηγίες χρήσης:	<p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά το φύτευμα τόσο των καλλιεργειών όσο και των ζιζανίων. Πριν την εφαρμογή του προετοιμάστε καλά το χωράφι, ώστε να είναι ψιλοχωματισμένο. Η συνιστώμενη κατά περίπτωση δοσολογία εφαρμόζεται με 40-50 λίτρα νερό / στρέμμα. Οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (αυλάκωμα, παράχωμα κ.λ.π.) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του σκευάσματος. Η ύπαρξη αρκετής υγρασίας στο έδαφος κατά την εφαρμογή του ευνοεί τη δράση του σκευάσματος.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το έτοιμο μίγμα στον ψεκαστήρα, εφαρμόστε το αμέσως.</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος 2-3 φορές με καθαρό νερό.</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p> <p>Συνδυαστικότητα: --</p>
----------	-----------------	---

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση της αντράκλας σε καλλιέργεια τομάτας υπαίθρου, νωρίς μεταφυτρωτικά.</p> <p>Δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης. Απορροφάται από τις ρίζες και το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του φυτού.</p>
----------	------------------------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος και τρόπος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		γρ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Τομάτα (Υ) LYPES	Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>) POROL	30-40	40-50	<p>1. Μεταφυτρωτικά (2-4 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας).</p> <p>2. Μεταφυτευόμενη 20 ημέρες μετά την μεταφύτευση, οπότε οι τομάτες πρέπει να έχουν ριζοπιάσει και να έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Πρέπει επίσης να ριζοπιάσουν και τα φυτά που αντικαθιστούν τα απωλεσθέντα απ' την αρχική φύτευση. Ψεκάζεται όλη η επιφάνεια ή τα «σαμάρια» μετά το ριζόπιασμα και τα αυλάκια μετά το παράχωμα. Δόση σε όλη την επιφάνεια 40 γρ. /στρέμμα. Όταν εφαρμόζεται στα «σαμάρια» και στα αυλάκια η δόση μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια.</p>	1

Παρατηρήσεις:

1. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την εφαρμογή, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του σκευάσματος σε ευαίσθητες παρακείμενες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
2. Η αποτελεσματικότητα του μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση έλλειψης υγρασίας στο έδαφος ή σε περίπτωση που δε σημειώνεται βροχή μετά από την εφαρμογή.
3. Τομάτες: Ποικιλίες Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J.Campell 30, Perlita, Petomec, Heinz 1706, AT 70/14 , TOKO-70, es 58, VF 65, VF 198, Euromek, ACE-55, Early Pack-7.
4. Να μη χρησιμοποιείται σε ποικιλίες τομάτας ευαίσθητες στο *metribuzin*.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνει εναλλαγή επεμβάσεων με ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα πλαίσια αμειψισποράς και μεθόδων καλής γεωργικής πρακτικής.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθούν, μετά από όργωμα του χωραφιού, ψυχανθή και σιτηρά.

-σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν:

-της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενη καλλιέργεια και δόσεις εφαρμογής.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.
 Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή.
 Κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική ανάσχεση 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P302+P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό εάν χρειαστεί.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα (Υ)	60

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα
του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

B. Ανάκληση των εγκρίσεων / παράταση των εγκρίσεων:

Οι παρούσες κατά παρέκκλιση άδειες έχουν **αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα** και χορηγούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ανάγκης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η αναγκαιότητα ενδεχόμενης νέας μελλοντικής χορήγησής τους θα αξιολογηθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του φυτοπροστατευτικού προβλήματος και τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων.

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Η διαφήμιση των σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
3. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση των σκευασμάτων. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
4. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι κάτοχοι των κατά παρέκκλιση αδειών και οι εταιρείες που διακινούν τα σκευάσματα, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τις 30-11-2026 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 4.1. Για τη συνολική ποσότητα των σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 4.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τα σκευάσματα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 4.3. Καταγραφή καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν τα σκευάσματα.Επίσης οφείλουν να αποστείλουν στην υπηρεσία μας εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της παρούσας, εκτίμηση για τις ποσότητες που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν δυνάμει της παρούσας, προκειμένου να συμπληρωθεί από την υπηρεσία μας το σχετικό πεδίο στην πλατφόρμα της ΕΕ.
5. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ