



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.09.2025  
Αριθ. πρωτ.: 263132

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: CBC (Europe) S.r.l., Ιταλίας  
(Δια της BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.)  
e-mail: [info@biogard.gr](mailto:info@biogard.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 14531 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14531 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 254787/22.09.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 14531 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (*Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο), που

χορηγήθηκε με την αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |                                                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                                                                | Στόχος                                                                                                                                                                                                                                                                           | Δόσεις σκευάσματος |                              | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                                        | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες) |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | κ.εκ./ στρ.*       | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ) |                                                                                                                    |                                                              |
| Εσπεριδοειδή<br>1CIDG<br>Γκρέιπφρουτ<br>CIDPA<br>Λεμονιά<br>CIDLI<br>Μανταρινιά<br>CIDRE<br>Πορτοκαλιά<br>CIDSΙ<br>Κουμκουάτ<br>FOLIA, FOLMA<br>Μοσχολέμονο<br>Πράσινα λεμόνια (Λάιμ)<br>CIDAF | Μύγα Μεσογείου<br><i>Ceratitis capitata</i><br>CERTCA<br><br>Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης<br><i>Aleurocanthus spiniferus</i><br>ALECSN<br><br>Τετράνυχος<br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR<br><i>Panonychus citri</i><br>METTCI<br><i>Eutetranychus orientalis</i><br>EUTEOR | 100-200            | 80-200                       | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89 | 10/5                                                         |
| Μηλιά<br>MABSD<br>Αχλαδιά<br>PYUCO                                                                                                                                                             | Ψύλλα αχλαδιάς<br><i>Cacopsylla pyri</i><br>PSYLP1<br><br>Εριόσωμα<br><i>Eriosoma lanigerum</i><br>ERISLA<br><br>Τίγρης της αχλαδιάς<br><i>Stephanitis pyri</i><br>STEPPR                                                                                                        | 100-200            | 60-150                       | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89 | 10/5                                                         |
|                                                                                                                                                                                                | Κόκκινος τετράνυχος<br><i>Panonychus ulmi</i><br>METTUL                                                                                                                                                                                                                          | 100-150            | 60-150                       |                                                                                                                    |                                                              |
| Πυρηνόκαρπα<br>Βερικοκιά<br>PRNAR<br>Δαμασκηνιά<br>PRNDO                                                                                                                                       | Θρίπες<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><i>Thrips major</i><br>THRIMA<br><i>Taeniothrips meridionalis</i><br>TAETME                                                                                                                                             | 100-150            | 80-120                       | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89 | 10/5                                                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                                                                                                                    |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                        | Μύγα Μεσογείου<br><i>Ceratitis capitata</i><br>CERTCA                                                                                                                                                                                    | 100-200 | 80-120 |                                                                                                                    |      |
| Ροδακινιά<br>PRNPS     | Θρίπες<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><i>Thrips major</i><br>THRIMA<br><i>Taeniothrips meridionalis</i><br>TAETME                                                                                                     | 100-150 | 80-120 |                                                                                                                    |      |
|                        | Μύγα Μεσογείου<br><i>Ceratitis capitata</i><br>CERTCA<br><br><u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u><br>Ανατολική μύγα των καρπών***<br><i>Bactrocera dorsalis</i><br>DACUDO<br><br>Μύγα των ροδάκινων***<br><i>Bactrocera zonata</i><br>DACUZO | 100-200 | 80-120 |                                                                                                                    |      |
| Κερασιά<br>PRNAV       | Μύγα κερασιάς<br><i>Rhagoletis cerasi</i><br>RHAGCE<br><br><u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u><br>Ανατολική μύγα των καρπών***<br><i>Bactrocera dorsalis</i><br>DACUDO<br><br>Μύγα των ροδάκινων***<br><i>Bactrocera zonata</i><br>DACUZO   | 100-200 | 60-150 |                                                                                                                    |      |
| Φράουλα (Υ+Θ)<br>FRAAN | Αλευρώδεις<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>TRIAVA<br><i>Bemisia tabaci</i><br>BEMITA                                                                                                                                              | 75-100  | 60-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89 | 10/5 |
|                        | Θρίπες<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><i>Thrips sp.</i>                                                                                                                                                               | 100-150 | 60-100 |                                                                                                                    |      |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                             | THRISP                                                                                                                                                                                      |         |        |                                                                                                                    |      |
|                                                                             | Κοινός τετράνυχος<br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR                                                                                                                                   | 75-100  | 60-100 |                                                                                                                    |      |
| Αμπέλι<br>VITVI                                                             | Τετράνυχτοι<br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR<br><i>Eotetranychus carpinii</i><br>EOTECA<br><br>Θρίπτες<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><i>Thrips</i> sp.<br>THRISP | 100-150 | 60-150 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89 | 10/5 |
|                                                                             | Τζιτζικάκια<br><i>Scaphoideus titanus</i><br>SCAPLI<br><i>Empoasca vitis</i><br>EMPOFL<br><i>Jacobiasca lybica</i><br>EMPOLY                                                                |         | 30-150 |                                                                                                                    |      |
|                                                                             | Ψευδόκοκκος<br><i>Planococcus ficus</i><br>PLANFI<br><i>Pseudococcus comstocki</i><br>PSECCO                                                                                                | 100-200 | 30-100 |                                                                                                                    |      |
| Λωτός<br>DOSKA                                                              | Μύγα Μεσογείου<br><i>Ceratitis capitata</i><br>CERTCA                                                                                                                                       | 100-200 | 80-200 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89 | 10/5 |
| Ελιά<br>OLVEU                                                               | Δάκος<br><i>Bactrocera oleae</i><br>DACUOL                                                                                                                                                  | 100-200 | 80-200 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. BBCH 11-89 | 10/5 |
| Σολανώδη (Υ+Θ)<br>Τομάτα<br>LYPES<br>Πιπεριά<br>CPSAN<br>Μελιτζάνα<br>SOLME | Αλευρώδεις<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>TRIAVA<br><i>Bemisia tabaci</i><br>BEMITA                                                                                                 | 75-100  | 60-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.            | 10/5 |
|                                                                             | Θρίπτες                                                                                                                                                                                     | 100-150 | 60-100 |                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |        |                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                 | <i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><i>Thrips</i> sp.<br>THRISP                                                                       |         |        | BBCH 11-89                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                 | Κοινός τετράνυχος<br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR<br><br>Άκαρι τομάτας<br>(σκωριώδης τετράνυχος)<br><i>Aculops lycopersici</i><br>VASALY | 100-200 | 60-100 |                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                 | Σιδηροσκώληκες<br><i>Agriotes</i> sp.<br>AGRISP                                                                                                  | 100-200 | 20-100 |                                                                                                                       |      |
| Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ):<br>Καρπούζι<br>CITLA<br>Πεπόνι<br>CUMME<br>Κολοκύθες<br>CUUPE<br><br>Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ):<br>Κολοκυθάκια<br>CUUPG<br>Αγγούρι<br>CUMSA | Αλευρώδεις<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>TRIAVA<br><i>Bemisia tabaci</i><br>BEMITA                                                      | 75-100  | 60-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.<br>BBCH 11-89 | 10/5 |
|                                                                                                                                                                                                 | Θρίπες<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><i>Thrips</i> sp.<br>THRISP                                                             | 100-150 | 60-100 |                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                 | Κοινός τετράνυχος<br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR                                                                                        | 75-100  | 60-100 |                                                                                                                       |      |
| Κραμβοειδή (Υ+Θ):<br>Μπρόκολο<br>BRSOK<br>Κουνουπίδι<br>BRSOB                                                                                                                                   | Αλευρώδεις<br><i>Aleyrodes proletella</i><br>ALEUPR                                                                                              | 100-200 | 60-150 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.<br>BBCH 11-89 | 10/5 |
| Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη (Θ)<br>3LEAC, 3LFBC, 3HSMC, NNNEF:<br>Μαρούλι<br>LACSA<br>Αντίδι<br>CICEN<br>Ραδίκι                                                                   | Αφίδες<br><i>Nasonovia ribisnigri</i><br>NASORN                                                                                                  | 75-100  | 30-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή.<br>BBCH 11-89 | 10/5 |
|                                                                                                                                                                                                 | Θρίπας<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC                                                                                            | 100-150 | 30-100 |                                                                                                                       |      |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                       |         |           |                                                                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CICIN                                                                                                                                              |                                                                                                       |         |           |                                                                                                                                                                            |      |
| Φυλλώδη<br>λαχανικά, βότανα<br>και βρώσιμα άνθη<br>(Υ)<br>3LEAC, 3LFBC,<br>3HSMC, NNNEF:<br>Μαρούλι<br>LACSA<br>Αντίδι<br>CICEN<br>Ραδίκι<br>CICIN | Θρίπας<br><i>Frankliniella</i><br><i>occidentalis</i><br>FRANOC                                       | 100-150 | 30-100    |                                                                                                                                                                            |      |
| Ψυχανθή (Υ+Θ):<br>Φασόλι με λοβό<br>και χωρίς λοβό<br>PHSVX, VIGSI<br>Μπιζέλια με λοβό<br>και χωρίς λοβό<br>PIBSX                                  | Αλευρώδεις<br><i>Trialeurodes</i><br><i>vaporariorum</i><br>TRIAVA<br><i>Bemisia tabaci</i><br>BEMITA | 100-150 | 60-100    | Με την εμφάνιση<br>των πρώτων<br>προσβολών και<br>επαναλήψεις<br>(εφόσον κριθεί<br>απαραίτητο) μέχρι<br>και τη συγκομιδή.<br>BBCH 11-89                                    | 10/5 |
|                                                                                                                                                    | Κοινός τετράνυχος<br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR                                             | 100-200 | 30-100    |                                                                                                                                                                            |      |
| Φακές (Υ+Θ)**<br>LENCU                                                                                                                             | Κοινός τετράνυχος<br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR                                             | 100-200 | 30-100    | Με την εμφάνιση<br>των πρώτων<br>προσβολών και<br>επαναλήψεις<br>(εφόσον κριθεί<br>απαραίτητο) μέχρι<br>και τη συγκομιδή.<br>BBCH 11-89                                    | 10/5 |
| Πατάτα<br>SOLTU                                                                                                                                    | Σιδηροσκώληκες<br><i>Agriotes</i> sp.<br>AGRISP                                                       | 200-300 | 8-50      | Εφαρμογή με<br>ψεκασμό<br>φυλλώματος.<br>Μία εφαρμογή κατά<br>τη φύτευση και<br>επανάληψη κατά το<br>παράχωμα.                                                             | 2/7  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 50-100  | 1000-4000 | Εφαρμογή με<br>στάγδην άρδευση.<br>Με την εμφάνιση<br>των πρώτων<br>προσβολών και<br>επαναλήψεις<br>(εφόσον κριθεί<br>απαραίτητο) μέχρι<br>και τη συγκομιδή.<br>BBCH 00-99 | 6/7  |
| Ανθοκομικά &<br>καλλωπιστικά<br>φυτά (Υ+Θ)<br>NNNZZ                                                                                                | Αλευρώδεις<br><i>Trialeurodes</i><br><i>vaporariorum</i><br>TRIAVA<br><i>Bemisia tabaci</i><br>BEMITA | 75-100  | 60-150    | Με την εμφάνιση<br>των πρώτων<br>προσβολών και<br>επαναλήψεις<br>(εφόσον κριθεί<br>απαραίτητο) μέχρι                                                                       | 10/5 |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |         |        |                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                     | <i>Aleyrodes proletella</i><br>ALEUPR                                                                                                                   |         |        | και τη συγκομιδή.<br>BBCH 11-89                                                                                                         |      |
| Βολβώδη<br>λαχανικά ALLSS<br>(Υ):<br>Πράσο **<br>ALLPO<br>Κρεμμύδι<br>ALLCE<br>Σχοινόπρασο**<br>ALLSC<br>Σκόρδο<br>ALLSA<br>Ασκαλώνια<br>ALLAS<br>Βολβίνα<br>(σκορδόχορτο)<br>ALLFI | Θρίπες<br>Thripidae<br>1THRIF<br><i>Thrips tabaci</i><br>THRITB<br><i>Frankliniella</i><br><i>occidentalis</i><br>FRANOC<br><i>Thrips</i> sp.<br>THRISP | 100-200 | 30-100 | Με την εμφάνιση<br>των πρώτων<br>προσβολών και<br>επαναλήψεις<br>(εφόσον κριθεί<br>απαραίτητο) μέχρι<br>και τη συγκομιδή.<br>BBCH 11-89 | 10/5 |
| Ακτινιδιά<br>ATISS                                                                                                                                                                  | Μύγα Μεσογείου<br><i>Ceratitis capitata</i><br>CERTCA                                                                                                   | 100-200 | 30-100 | Με την εμφάνιση<br>των πρώτων<br>προσβολών και<br>επαναλήψεις<br>(εφόσον κριθεί<br>απαραίτητο) μέχρι<br>και τη συγκομιδή.<br>BBCH 11-89 | 10/5 |

\* Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

\*\* Δεν έχει γίνει έλεγχος της φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες φακής (LENCU), πράσου (ALLPO), σχοινόπρασου (ALLSC) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις καλλιέργειες σε μικρή κλίμακα.

\*\*\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της Ανατολικής μύγας των καρπών (*Bactrocera dorsalis*) και της Μύγας των ροδάκινων (*Bactrocera zonata*) στις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η εφαρμογή του σκευάσματος να διενεργείται κατά τις πρώτες πρωινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή και τα ενήλικα είναι λιγότερο δραστήρια. Σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης αμέσως μετά την εφαρμογή, συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού.
3. Γενικά να εφαρμόζεται όταν οι πληθυσμοί των εντόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων δύναται να συνδυαστεί με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα, περιλαμβανομένων των θερινών παραφινικών λαδιών.
4. Η χρήση στην Πορτοκαλιά (CIDSΙ) περιλαμβάνει και τη Νεραντζιά (CIDAU).
5. Η χρήση στο Γκρέιπφρουτ (CIDPA) περιλαμβάνει τη Φράπα (CIDGR) και το Τάντζελο (CIDRP).
6. Η χρήση στο Φασόλι με λοβό (PHSVX) περιλαμβάνει και τη Φάβα (VICFX).

- II. Διάθεση αποθεμάτων**
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
  2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
  3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.**

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**