



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.09.2026
Αριθ. πρωτ.: 248947

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Ξεφτέρη/ Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287247 /210 9287165
e-mail: dxafteri@minagric.gr/
lapocha@minagric.gr

Προς: Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - "AGRIBIZ"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
e-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΟΚΥΜΑ (pyraclostrobin 20 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2026/1826 της επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2026 για την για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών..... **pyraclostrobin**.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.
 - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την

τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).
4. Την αριθμ. 61232 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΑΜΜΑΡΙ (δ.ο. pyraclostrobin 20 % β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 304392/04.11.2025 απόφασή μας.
5. Την αριθμ. 234641/14.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(μυκητοκτόνο) ΟΚΥΜΑ (pyraclostrobin 20 % β/ο)** της εταιρείας **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

61278
29.09.2026
15.12.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

ΟΚΥΜΑ
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (ΕC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

pyraclostrobin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97,5 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Στρουμπιλουρίνες
(ομάδα μεθοξυκαρβαμικά)

Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Shandong Kangqiao Bio-Technology Co. Ltd.

Lvyi Industrial Park, 256500, Boxing County, Shandong Province, Κίνα

2. Hailir Pesticides and Chemicals Group Co. Ltd.

East Industry Zone, Chengyang District, Qingdao, Shandong, Κίνα

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Shandong Kangqiao Bio-Technology Co. Ltd

Lvyi Industrial Park, 256500, Boxing County, Shandong Province, Κίνα

2. Shandong Hailir Chemical Company Ltd.

Linngang Industrial Zone, Coastal Econ, Development Zone, Weifang, Shandong, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθ. 1096/27239/29.01.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, Rače, 2327, Σλοβενία
Contact person: Edward Smith
Τηλ.: +44 741 580 0193
E-mail: esmith@albaugh.eu

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "AGRIBIZ"

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφόρος Μεσογείων 335 Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα
Τηλ.: 213 006 5000
E-mail: contact@elanco.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21, Rače, 2327, Σλοβενία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd.

No. 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan City, Jiangsu Province, Κίνα

2) Albaugh India Private Limited

G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Mavli, District - Udaipur - 313205, Rajasthan, Ινδία

3) Lanlix Cropscience Co., Ltd.

No.79, Hsiang Yang Road, Chang Chih Hsiang, Ping Tung Hsien, Ταϊβάν

4) Rotam Biotechnology Limited

No.566, Longpu St., Yongkang Dist., Tainan City 710 Ταϊβάν

5) Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, Rače, 2327, Σλοβενία

6) Industrias Afrasa S.A.

Calle Ciudad de Sevilla 53, Poligono Industrial Fuente del Jarro - 46988 Paterna (Valencia), Ισπανία

7) Shandong Kangqiao Bio-Technology Co. Ltd

Lvyi Industrial Park, 256500, Boxing County, Shandong Province, Κίνα

8) Shandong Hailir Chemical Company Ltd.

Linngang Industrial Zone, Coastal Econ, Development Zone, Weifang, Shandong, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd.

No. 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan City, Jiangsu Province, Κίνα

2) Albaugh India Private Limited

G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Mavli, District - Udaipur - 313205, Rajasthan, Ινδία

3) Lanlix Cropscience Co., Ltd.

No.79, Hsiang Yang Road, Chang Chih Hsiang, Ping Tung Hsien, Ταϊβάν

4) Rotam Biotechnology Limited

No.566, Longpu St., Yongkang Dist., Tainan City 710 Ταϊβάν

5) Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, Rače, 2327, Σλοβενία

6) Industrias Afrasa S.A.

Calle Ciudad de Sevilla 53, Poligono Industrial Fuente del Jarro - 46988 Paterna (Valencia), Ισπανία

7) Shandong Kangqiao Bio-Technology Co. Ltd

Lvyi Industrial Park, 256500, Boxing County, Shandong Province, Κίνα

8) Shandong Hailir Chemical Company Ltd.

Linngang Industrial Zone, Coastal Econ, Development Zone, Weifang, Shandong, Κίνα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: pyraclostrobin 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 80,3 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθ. 1096/27239/29.01.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 <u>Συσκευασίες:</u>			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250 κ.εκ. έως 1 λίτρο	Fluorinated HDPE ή HDPE-PA (COEX)
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	250 έως 500 κ.εκ.	Fluorinated HDPE ή HDPE-PA (COEX) Κουτί χάρτινο
3	Δοχείο / Βαρέλι	2 - 15 λίτρα	Fluorinated HDPE ή HDPE-PA (COEX)

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με χρήση γεωργικού ελκυστήρα.**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.**Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά των ασθενειών που προσβάλλουν το φύλλωμα και τους στάχεις των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι). Περιέχει pyraclostrobin, το οποίο παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Μετά την εφαρμογή του, απορροφάται μερικώς από τα φύλλα, το οποίο εξηγεί την προστατευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηματική του δράση.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο /Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)		
Χειμερινό σιτάρι (TRZAW)	Σεπτορίωση: <i>(Zymoseptoria tritici - SEPTTR),</i> <i>(Parastagonospora nodorum - LEPTNO)</i> Καστανή Σκωρίαση <i>(Puccinia recondita - PUCCRE / Puccinia triticina - PUCCRT)</i>	100-125	20-40	Ψεκασμοί φυλλώματος μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου, από το στάδιο εμφάνισης του 5 ^{ου} αδελφίου έως το στάδιο κατά το οποίο οι πρώτοι σπόροι έχουν φτάσει στο 50% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 25-71) ¹ .	2/ 21

	Κίτρινη Σκωρίαση (<i>Puccinia striiformis</i> – PUCST/ <i>Puccinia striiformis</i> f. sp. tritici –PUCCSI)				
Ανοιξιάτικο σιτάρι (TRZAS)	Σεπτορίωση: (<i>Zymoseptoria tritici</i> - SEPTTR), (<i>Parastagonospora nodorum</i> , LEPTNO) Καστανή Σκωρίαση (<i>Puccinia recondita</i> - PUCCRE / <i>Puccinia triticina</i> - PUCCRT)	100-125	20-40	Ψεκασμοί φυλλώματος μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου, από το στάδιο εμφάνισης του 5 ^{ου} αδελφίου έως το στάδιο κατά το οποίο οι πρώτοι σπόροι έχουν φτάσει στο 50% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 25-71) ¹ .	2/21
Χειμερινό κριθάρι (HORVW), Ανοιξιάτικο κριθάρι (HORVS)	Δικτυωτή κηλίδωση (<i>Pyrenophora teres</i> - PYRNTE), Ρυγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i> - RHYNSE) Καστανή σκωρίαση (<i>Puccinia hordei</i> -PUCCHD)	100-125	20-40	Ψεκασμοί φυλλώματος, μεταξύ Μαρτίου – Μαΐου, από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως το τέλος ξεσταχυάσματος / πλήρης έκπτυξη της ταξιανθίας (BBCH 30-59).	2/21

Παρατηρήσεις:

1. Στο χειμερινό ή ανοιξιάτικο σιτάρι να πραγματοποιείται μόνο ένας ψεκασμός έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 29).
2. Σε περίπτωση υψηλής έντασης προσβολής της ασθένειας να χρησιμοποιείται η υψηλότερη δόση.
3. Η χρήση στο σιτάρι (TRZAW, TRZAS) περιλαμβάνει τις χρήσεις: Σκληρό σιτάρι (TRZDU), Τριτικάλε (TTLWI), TTLSO), Σίτος σπέλτα (όλυρα) (TRZSP), Σίτος μονόκοκκος (TRZMO), Σίτος δίκοκκος (TRZDI).
4. Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyraclostrobin, η οποία ανήκει στην **ομάδα 11** κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- η εφαρμογή δραστικής ουσίας της ομάδας 11, να περιορίζεται σε 2 εφαρμογές ανά έτος, είτε αυτή είναι σε μίγμα είτε ως μεμονωμένη δραστική ουσία σε σκεύασμα.
- να εφαρμόζονται τα μυκητοκτόνα της ομάδας προληπτικά, στα πρώτα στάδια της προσβολής. Αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις δόσεις εφαρμογής όπως περιγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/
Προειδοποιητική λέξη:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H361d: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ, στο γαστρεντερικό σύστημα και στην ρινική κοιλότητα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά, τους βραχίονες και το πρόσωπο μετά το χειρισμό.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και την αναπνοή κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος, να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε

μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μια απέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων**, εκ των οποίων τα **10 μέτρα** να είναι φυτική ζώνης ανάσχεσης κατά την εφαρμογή έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 29), στην καλλιέργεια του χειμερινού/ανοιξιάτικου σιταριού, σκληρού σιταριού, τριτικάλε, σίτου σπέλτα (όλυρα), σίτου μονόκοκκου, σίτου δίκοκκου.
- μια απέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** ή μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** κατά την εφαρμογή μετά την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους (BBCH 30) σε χειμερινό/ανοιξιάτικο σιτάρι, σκληρό σιτάρι, τριτικάλε, σίτο σπέλτα (όλυρα), σίτο μονόκοκκο, σίτο δίκοκκο, και κατά την καλλιέργεια του χειμερινού και ανοιξιάτικου κριθαριού.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P304+P340+ P312 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P302+P352+P332+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Σιτάρι (0500090)	56
Σκληρό σιτάρι (0500090-001)	
Σίτος ο μονόκοκκος (0500090-002)	
Σίτος ο δίκκοκος (0500090-003)	
Σίτος σπέλτα (0500090-005)	
Τριτικάλε (0500090-006)	
Κριθάρι (0500010)	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση».
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ