Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.29 12:02:01 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **29.09.2026**
Αριθ. πρωτ: **248596**

Προς: **SEIPASA SA, Ισπανίας**
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – "AGRIBIZ")
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της με αριθ. 14732 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PIRECRIS (pyrethrins 2% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 13626/325114 ΠΕ/15.01.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14732 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PIRECRIS (pyrethrins 2% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 240364/21.09.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14732 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PIRECRIS (pyrethrins 2% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 13626/325114 ΠΕ/15.01.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού		
Τομάτα (Υ/Θ) LYPES Μελιτζάνα (Υ/Θ) SOLME	Αλευρώδεις *Bemisia tabaci* BEMITA *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA	90-150	30-100	150-225 (1)	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Πιπεριά (Υ/Θ) CPSAN	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis gossypii* APHIGO	70-120	30-100	120-180 (1)	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Μαρούλι (Υ) LACSA Σπανάκι (Υ) SPQOL	Αφίδες *Nasonovia ribisnigri* NASORN *Myzus persicae* MYZUPE *Hyperomyzus lactucae* HYPELA	70-150	30-75	150-200 (1)	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Τζιτζικάκια *Empoasca vitis* EMPOFL *Scaphoideus titanus* SCAPLI *Jacobiasca lybica* EMPOLY	70-150	20-80	-	Με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη της άνθησης μέχρι την συγκομιδή (BBCH 50-80)	3/7
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνική Μουσμουλιά EIOJA	Αφίδες *Aphis pomi* APHIPO *Dysaphis plantaginea* DYSAPL	100-150	30-100	-	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της εμφάνισης των ταξιανθιών και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την ωρίμαση των καρπών για κατανάλωση (*Να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της άνθησης*). BBCH 40-59 και 70-89	3/7

Αμυγδαλιά PRNDU Καρυδιά Βραζιλίας BTHEX Ανακάρδια (κάσιους) ANAOC Καστανιά CSNSA Φουντουκιά CYLAV Μακαντάμια MCDTT, MCDTE Καρυδιά πεκάν CYAIL Κουκουναριά PIUPN Φιστικιά PIAVE Καρυδιά IUGRE	Αφίδες *Dysaphis plantaginea* DYSAPL	100-150	30-100	-	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της εμφάνισης των ταξιανθιών. BBCH 40-59	3/7
Πορτοκαλιά CIDSI Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA Λιμμετία (Μοσχολεμονιά) CIDAF	Αφίδες *Dysaphis plantaginea* DYSAPL **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Ασιατική ψύλλα των εσπεριδοειδών*** ***Diaphorina citri*** **DIAACI**	100-150	30-100	-	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της εμφάνισης των ανθέων. BBCH 40-59	3/7
Ροδακινιά PRNPS Βερυκοκιά PRNAR	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis gossypii* APHIGO	100-150	30-100	-	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της εμφάνισης των ταξιανθιών και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης της βλάστησης (το φύλλωμα παραμένει πράσινο). (*Να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της άνθησης*).	3/7

					BBCH 40-59 και 70-91	
Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV					Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της εμφάνισης των ταξιανθιών . BBCH 40-59	
Σέλερυ (Υ) APUGD	Αφίδες *Cavariella aegopodii* CAVAAE	100-150	30-100	-	Από το στάδιο της έκπτυξης του 2ου πραγματικού φύλλο μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμασης. BBCH 12-89	3/7
Φινόκιο (Υ) (Μαραθόριζα) FOEVA					Από το στάδιο της έκπτυξης του 2ου πραγματικού φύλλο μέχρι την ολοκλήρωση της εμφάνισης των ταξιανθιών και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών και των σπόρων. (*Να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της άνθησης*). BBCH 12-59 και 70-89	
Φράουλα (Θ) FRAAN	Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU	100-150	30-100	-	Από την έναρξη της έκπτυξης των στολώνων μέχρι και τη 2η συγκομιδή. BBCH 40-89	3/7
Βατομουριά (Θ) RUBFR Ασπροβατομουριά (Θ) RUBCA Σμέουρο (Κόκκινο και κίτρινο) (Θ) RUBID Μύρτιλλο (Θ) VACAN, VACCO	Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU	100-150	30-100	-	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την πλήρη ωρίμαση του καρπού. BBCH 40-89	3/7

VACVG						
Λωτός DOSKA	Δροσόφιλα *Drosophila suzukii* DROSSU	100-150	30-100	-	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της εμφάνισης των ταξιανθιών και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την ωρίμαση των καρπών για κατανάλωση (*Να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της άνθησης*). (BBCH 40-59 και 70-89)	3/7
Αγγούρι Αγγουράκι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG	Αλευρώδεις *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA *Bemisia tabaci* BEMITA	100-150	30-100	-	Από το στάδιο της έκπτυξης του 2ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμαση του καρπού. BBCH 12-89	3/7
Πεπόνι (Υ) CUMME Καρπούζι (Υ) CITLA Κολοκύθα (Υ) CUUMA	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis gossypii* APHIGO	100-150	30-100	-	Από το στάδιο της έκπτυξης του 2ου πραγματικού φύλλου έως και πριν την άνθιση BBCH 12-59 και από το σημείο όπου ο πρώτος καρπός αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα έως την πλήρη ωρίμανσή τους BBCH 71-89	3/7
Καλλωπιστικά δένδρα Μηλοειδών MABSS	Αφίδες *Aphis pomi* APHIPO *Dysaphis plantaginea* DYSAPL	100-150	30-100	-	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της εμφάνισης των ταξιανθιών και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την ωρίμαση των καρπών για κατανάλωση (*Να μην εφαρμόζεται κατά*	3/7

					την περίοδο της άνθησης). (BBCH 40-59 και 70-89)	
Καλλωπιστικά Ιβίσκος (Υ) HIBSS Χρυσάνθεμο (Υ) CHYSS	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Aphis gossypii* APHIGO	100-150	30-100	-	Από το στάδιο της έκπτυξης του 2ου πραγματικού φύλλο μέχρι την πλήρη ωρίμαση του καρπού. BBCH 12-89	3/7

Παρατηρήσεις:

1. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα, όπως είναι ορισμένη ανά καλλιέργεια (κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα).
2. Για φυλλική εφαρμογή ρυθμίστε το νερό της δεξαμενής σε pH 5-7.
3. Οι εφαρμογές να γίνονται κατά τις δροσερές ώρες τις ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
5. Εξασφαλίστε καλή κάλυψη των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση προσβολής από αλευρώδεις.
6. Η χρήση στο μαρούλι περιλαμβάνει τα μαρούλια: iceberg, σαλάτα, στρογγυλό, κοινό.
7. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.
8. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά.
9. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά και το περγαμόντο.
10. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτριά.
11. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα.
12. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες βερυκοκιάς, δαμασκηνιάς, κερασιάς, βυσσινιάς, πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς, γκρέιπφρουτ, λιμμετίας, νερατζιάς, περγαμόντου, κιτριάς, φράπας, αμυγδαλιάς, καρυδιάς Βραζιλίας, ανακάρδιας (κάσιους), καστανιάς, φουντουκιάς, μακαντάμιας, καρυδιάς πεκάν, κουκουναριάς, φιστικιάς, καρυδιάς, λωτού, φινόκιου, ιβίσκου, χρυσάνθεμου, καρπουζιού και κολοκύθας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε αυτές τις καλλιέργειες να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
13. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

*__«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της ασιατικής ψύλλας των εσπεριδοειδών στις καλλιέργειες πορτοκαλιάς, μανταρινιάς, λεμονιάς, γκρέιπφρουτ και λιμμετίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».__

ΙΙ. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13626/325114 ΠΕ/15.01.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ