



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.06.2026
Αριθ. πρωτ.: 154710

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: PYRAGRO S.R.L., Ιταλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
MEDPEST I.K.E.
25^{ης} Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763 19009 Ντράφι-Πικέρμι)
e-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PYREVERT 5 EC (δ.ο. pyrethrins 4,65% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2026/372 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2026 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιώνpyrethrins (πυρεθρίνες).....
 - γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 14737 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ASSET FIVE (δ.ο. pyrethrins 4,65% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 1240/32644/06.02.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 330105/26.11.2025 αίτηση καθώς και τα με αριθ. 342091/08.12.2025 και 149070/10.06.2026 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(εντομοκτόνο) PYREVERT 5 EC (δ.ο. pyrethrins 4,65% β/ο)** της εταιρείας **PYRAGRO S.R.L., Ιταλίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

14987

15.06.2026

30.04.2029

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

PYREVERT 5 EC

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Pyrethrins

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

48% β/β min

Χημική ομάδα:

Πυρεθρινοειδών

Παρασκευαστές της δ.ο.:

- 1. McLaughlin Gormley King Co**
8810 Tenth Avenue North, Minneapolis MN 55427, Η.Π.Α.
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:
Sumitomo Chemical (UK) plc
Hythe House, 200 Shepherds Bush Road, London W6 7NL,
Ην. Βασίλειο
- 2. Botanical Resources Australia Pty Ltd**
8 Gregory Street, Sandy Bay, Tasmania 7004, (PO Box 852,
Sandy Bay, Tasmania, 7006)
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:
Sumitomo Chemical (UK) plc
Hythe House, 200 Shepherds Bush Road, London W6 7NL,
Ην. Βασίλειο

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. McLaughlin Gormley King Co**
8810 Tenth Avenue North, Minneapolis MN 55427, Η.Π.Α.
- 2. Botanical Resources Australia Pty Ltd**
A.C.N. 072 872 201, 44-46 Industrial Drive, Ulverstone,
Tasmania 7315, Αυστραλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθμ. 8241/109197/06.08.2018 αίτηση και τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 81015/31.03.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

PYRAGRO S.R.L.
Via G. Stephenson 73, 20157 Milano, Ιταλία
e-mail: regulatory@pyragro.it

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

MEDPEST I.K.E.
Κος Κώστας Μαρκάκης
25ης Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763, 19009 Ντράφι-Πικέρμι
Τηλ.: 210 6044534, 6947 693457
e-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Copyr SpA
Via Stephenson 73, 20157 Milano, Ιταλία
Τηλ.: +3902390368535

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. ABIOTECH Institute S.r.l.**
Via Desman, 43 - 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία
- 2. Diachem S.p.A.**
Via Mozzanica 9/11, 24043 Caravaggio (Bergamo), Ιταλία
- 3. IRCA SERVICE S.p.A.**
Strada Statale Cremasca 591 n.10, 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo), Ιταλία
- 4. Ferbi S.r.l.**
Viale I Maggio, C.da Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. ABIOTECH Institute S.r.l.

Via Desman, 43 - 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία

2. Diachem S.p.A.

Via Mozzanica 9/11, 24043 Caravaggio (Bergamo), Ιταλία

3. IRCA SERVICE S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n.10, 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo), Ιταλία

4. Ferbi S.r.l.

Viale I Maggio, C.da Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: pyrethrins 4,65% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 89,58 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 8241/109197/06.08.2018 αίτηση και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81015/31.03.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 mL, 750 mL, 1 L	HDPE/COEX
2	Δοχείο	5L, 10L	HDPE/COEX

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος με μηχανοκίνητα ή χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό δοχείο με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα για πάνω από 24 ώρες. Το pH του νερού δεν πρέπει να είναι αλκαλικό.

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το pH του νερού και, αν ξεπεράσει το 7, θα πρέπει να το οξύνετε. Το έτοιμο προς χρήση διάλυμα πρέπει να έχει pH περίπου 5-6. Μέχρι αυτό το επίπεδο οξύτητας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και αυξάνει την ανθεκτικότητα της δράσης του. Επομένως, συνιστάται να οξύνετε το διάλυμα, εάν είναι απαραίτητο, έως ότου επιτυγχάνεται πάνω από την τιμή, φροντίζοντας να μην πέσει κάτω από μια τιμή pH 5.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

1. Αδειάστε εντελώς το δοχείο και ξεπλύνετε το δοχείο και τις σωληνώσεις με καθαρό νερό. Αδειάστε εντελώς.

2. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό σε ποσότητα τουλάχιστον 10% του συνολικού όγκου της δεξαμενής και προσθέστε ένα απορρυπαντικό ή ένα διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Ξεπλύνετε το ψεκαστικό δοχείο και τους σωλήνες και στη συνέχεια αφήστε για 10 λεπτά με ανάδευση. Αποστραγγίστε εντελώς (Επαναλάβετε δύο φορές).

3. Προκειμένου να αφαιρεθούν υπολείμματα απορρυπαντικού ξεπλύνετε με καθαρό νερό τον περιέκτη μαζί με το το ψεκαστικό δοχείο και τους σωλήνες.
4. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά με το διάλυμα απορρυπαντικού στην ίδια συγκέντρωση όπως παραπάνω.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο επαφής.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)
		κ.εκ./ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
<u>Εσπεριδοειδή:</u> Πορτοκαλιά CIDS Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI) Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus floccosus</i> (ALTHFL)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
<u>Μηλοειδή:</u> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO) Βρωμούσα <i>Halyomorpha halys</i> (HALYHA), Ψύλλα <i>Cacopsylla pyri</i> (PSYLPI)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
<u>Πυρηνόκαρπα:</u> Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7

	Βρωμούσα <i>Halyomorpha halys</i> (HALYHA)				
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) VITVI	Κοχυλίδα <i>Clysia ambiguella</i> (CLYSAM) Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> (POLYBO) Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> (EMPOFL) <i>Scaphoideus titanus</i> (SCAPLI)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Φράουλα (Υ) FRAAN	Θρίπες (1THRIF) Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)	64	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	64	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
<u>Μικροί καρποί:</u> Σμέουρο RUBID Μύρτιλλο VACMY Μούρο RUBFR	Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)	51	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Μαρούλι (Υ) LACSA <u>Βότανα και βρώσιμα άνθη:</u> Φραγκομαϊντα-νός ANRCE Σχοινόπρασο ALLSC Φύλλα σέλινου APUGS Μαϊντανός PARCR Φασκόμηλο SALOF Δενδρολίβανο RMSOF Θυμάρι THYVU Βασιλικός OCIBA Δάφνη/	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN) <i>Hyperomyzus lactucae</i> (HYPELA)	51	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7

δαφνόφυλλα LURNO Δρακόντιο/ Εστραγκόν ARTDR					
Μαρούλι (Θ) (LACSA) Βότανα και βρώσιμα άνθη: Φραγκομαϊντανός (ANRCE) Σχοινόπρασο (ALLSC) Φύλλα σέλινου (APUGS) Μαϊντανός (PARCR) Φασκόμηλο (SALOF) Δενδρολίβανο (RMSOF) Θυμάρι (THYVU) Βασιλικός (OCIBA) Δάφνη/ δαφνόφυλλα (LURNO) Δρακόντιο/ Εστραγκόν (ARTDR)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Nasonovia</i> <i>ribisnigri</i> (NASORN)	51	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος της πατάτας <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> (LPTNDE)	38	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> (TRIAVA) Θρίπες (1THRIF)	77	120	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> (TRIAVA)	77	120	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Ανθοκομικά (Υ) & Καλλωπιστικά (Υ) φυτά	Αφίδες <i>Macrosiphum</i> <i>rosae</i> (MACSRO) Θρίπες (1THRIF)	64	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	2/7

Ανθοκομικά (Θ) & Καλλωπιστικά (Θ) φυτά	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), Θρίπες (1THRIF)	64	100	Με την εμφάνιση της προσβολής	2/7
Μηδική (MEDSA)	Αφίδες <i>Aphis craccivora</i> (APHICR)	38	60	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Δασικά φυτά	Δαντέλα του πλατάνου <i>Corythucha</i> sp. (CRTHSP)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Κολοκυνθοειδή (Υ) Πεπόνι (CUMME) Κολοκύθι (CUUPG) Αγγούρι/Αγγουράκι (CUMSA)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	51	80	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) (OLVEU)	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> (<i>Dacus oleae</i>) (DACUOL)	96	150	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7

Παρατηρήσεις:

- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
- Επαναληπτική εφαρμογή στο αμπέλι για τον εχθρό *Scaphoideus titanus* στην περίπτωση που παρατηρηθεί η ασθένεια του κίτρινου μωσαϊκού.
- Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στις ποικιλίες ελιάς Καλαμών και Κορωνέικη. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αυτές από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σε αυτές τις καλλιέργειες.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα περιέχει Pyrethrins και ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνεται εναλλαγή με εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:



ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή»

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας»

«Σε περίπτωση επανεισόδου στο θερμοκήπιο να έχει προηγηθεί καλός αερισμός»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στα μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, δασικά φυτά (εφαρμογές σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης):

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στα **μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, δασικά φυτά (εφαρμογές σε όψιμα στάδια ανάπτυξης)** :

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **25 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στο **αμπέλι (εφαρμογές σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης)**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στο **αμπέλι (εφαρμογές σε όψιμα στάδια ανάπτυξης)**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στα **εσπεριδοειδή** και την **ελιά**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στα **καλλωπιστικά** και στα **ανθοκομικά**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στη **φράουλα**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στους **μικρούς καρπούς (εφαρμογές σε όψιμα στάδια ανάπτυξης)**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων**.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** στην **τομάτα**, στην **πιπεριά** και στη **μελιτζάνα**:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων**.

SPe3: Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη στα **πυρηνόκαρπα**, στα **μηλοειδή**, **δασικά φυτά** και **ελιά**.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ζιζάνια.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά (0110050), Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020),	1

Αμπέλι οινοποιήσιμο (0151020), Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010),	
Μαρούλι (Υ+Θ) (0251020), Βότανα και βρώσιμα άνθη (Υ+Θ): Φραγκομαϊντανός (0256010), Σχοινόπρασο (0256020), Φύλλα σέλινου (0256030), Μαϊντανός (0256040), Φασκόμηλο (0256050), Δενδρολίβανο (0256060), Θυμάρι (0256070), Βασιλικός (0256080), Δάφνη/δαφνόφυλλα (0256090), Δρακόντιο/Εστραγκόν (0256100),	
Πατάτα (0211000),	
Ντομάτα (Υ+Θ) (0231010), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030),	
Μηδική (0632010-003),	
Δασικά είδη,	
Αγγούρι (Υ) (0232030), Αγγουράκι (Υ) (0232020),	
Ελιά [επιτραπέζιες (0161030) & ελαιοποιήσιμες (0402010) ποικιλίες]	
Φράουλα (Υ+Θ) (0152000), Μικροί καρποί: Σμέουρο (0153030), Μύρτιλλο (0154010), Μούρο (0153020-001),	
Ανθοκομικά (Υ) & Καλλωπιστικά (Υ) φυτά	
	2
	-

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, σε θερμοκρασίες 4-35°C, και καλά αεριζόμενο, μακριά από την έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- The submission of 2 additional trials on stone fruits demonstrating that residues of pyrethrins are below the LOQ at 7 days after the last treatment.
- Applicant to provide ILV study for the method described in KIIIA 5.3.1/01 (Hamberger R., 2010), in order to be accepted for monitoring/enforcement.
- Chronic study on adult and honeybee larvae.
- Δύο πειράματα αγρού σε μία τουλάχιστον ποικιλία ελιάς Καλαμών ή Κορωνέικη, προκειμένου να αξιολογηθεί η φυτοτοξικότητα και οι επιπτώσεις στις οργανοληπτικές ιδιότητες.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ