Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.16 14:06:55 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.10.2026
Αριθ. πρωτ.: 267258

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Προς: **MAGMA AGRO A.E.B.E.**
Λεωφ. Κηφισίας 55, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι
e-mail: efi.voulgari@magma-agro.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14984 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) RADICO 50 WG (flonicamid 50% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 139874/02.06.2026 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14984 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) RADICO 50 WG (flonicamid 50% β/β).
7. Την αριθμ. 173581/02.07.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14984 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) RADICO 50 WG (flonicamid 50% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 139874/02.06.2026 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Πορτοκαλιές CIDSI Μανταρινιές CIDRE Λεμονιές CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA	Αφίδες Εσπεριδοειδών *Aphis citricola* APHISI *Toxoptera auranti* TOXOAU *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE	10	3,5-10	100-300	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ροδακινιές PRNPS	Αφίδες *Myzus persicae* MYZUPE *Hyalopterus pruni* HYALPR *Brachycaudus helichrysi* ANURHE *Brachycaudus schwartzi* APPESW	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κερασιές PRNAV	Αφίδες *Myzus cerasi* MYZUCE *Myzus persicae* MYZUPE *Brachycaudus helichrysi* ANURHE *Brachycaudus schwartzi* APPESW *Hyalopterus pruni* HYALPR	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Δαμασκηνιές PRNDO	Αφίδες *Hyalopterus pruni* HYALPR *Myzus persicae* MYZUPE *Brachycaudus helichrysi* ANURHE *Brachycaudus schwartzi* APPESW	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται

Μηλιές MABSD	Γκρίζα αφίδα *Dysaphis plantaginea* DYSAPL *Dysaphis pyri* DYSAPY *Eriosoma lanigerum* ERISLA Πράσινη αφίδα *Aphis pomi* APHIPO	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [(1)]	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αχλαδιές PYUCO Κυδωνιές CYDOB	Αφίδες Γκρίζα αφίδα της αχλαδιάς *Dysaphis pyri* DYSAPY *Eriosoma lanigerum* ERISLA	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [(1)]	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Τομάτες (Υ) LYPES Μελιτζάνες (Υ) SOLME	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Macrosiphum* sp. MACSSP *Aphis fabae* APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [(1)]	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Τομάτες (Θ) LYPES Μελιτζάνες (Θ) SOLME	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Macrosiphum* sp. MACSSP *Aphis fabae* APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. [(1)] (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Τομάτες (Θ) LYPES <u>(εφαρμογές με στάγδην άρδευση)</u> Μελιτζάνες (Θ) SOLME <u>(εφαρμογές με στάγδην άρδευση)</u>	Αλευρώδεις *Bemisia tabaci* BEMITA *Trialeurodes vaporariorum* TRIAVA	16	--	200-500	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο	

					επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος	
Αγγούρια (Θ) CUMSA Αγγουράκια (Θ) CUMSA Κολοκυθάκια (Θ) CUUPG	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE *Macrosiphum euphorbiae* MACSEU *Macrosiphum* sp. MACSSP *Aphis fabae* APHIFA	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. (1) (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σιτάρι TRZSS	Αφίδες *Aphis nasturtii* APHINA *Macrosiphum avenae* MACSAV *Macrosiphum dirhodum* MACSSP *Metopolophium dirhodum* METODR *Rhopalosiphum padi* RHOPPA	14	--	20-50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καπνός NIOTA	Αφίδες *Myzus sp.* MYZUSP **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u>** **Θρίπας*** ***Thrips tabaci*** **THRITB**	14	--	40-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καπνός* **NIOTA** **(εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης)** ***Χρήση ήσσονος σημασίας***	**Αφίδες** ***Myzus nicotianae*** **MYZUNI** ***Myzus sp.*** **MYZUSP** ***Aphis* sp.** **APHISP** **Θρίπες** ***Thrips tabaci*** **THRITB**	**14**	**--**	**40-60**	**Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση χωρίς την παρουσία μελισσών**	**2 εφαρμογές max** **(1 εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος μετά από 14 ημέρες) εφόσον απαιτείται**

Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u>** **Λύγκος*** ***Lygus* sp.** **LYGUSP**	7,5	--	50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών[(1)]	2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u> 2ORNH Τριανταφυλλιές ROSSS υπαίθρου και θερμοκηπίου	Αφίδες *Aphis gossypii* APHIGO *Myzus persicae* MYZUPE *Macrosiphum sp.* MACSSP *Aphis fabae* APHIFA	14	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών - εντόμων. [(1)] (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ</u> 2ORNW					Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης**.**
3. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
4. Η χρήση στην Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνει και τα Κιτρολέμονα (CIDME).
5. Η χρήση στα Γκρέιπφρουτ (CIDPA), περιλαμβάνει και τις Φράπες (CIDGR).
6. Η χρήση στη Πορτοκαλιές (CIDSI), περιλαμβάνει και τις Νεραντζιές (CIDAU) και Περγαμόντο (CIDAB).
7. Η χρήση στις Αχλαδιές (PYUCO) περιλαμβάνει και τα Ασιατικά αχλάδια (Αχλαδιές NASHI) (PYUPC).

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του θρίπα στην καλλιέργεια του καπνού (εφαρμογή με ψεκασμό), κατά του λύγκου στην καλλιέργεια του βαμβακιού και στην καλλιέργεια του καπνού (εφαρμογή με ριζοπότισμα). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 139874/02.06.2026 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ