



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.09.2025
Αριθ. πρωτ.: 240520

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON S.p.A, Ιταλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 194 00, Κορωπί, Αττική
e-mail: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) REXXAR (δ.ο. clomazone 36% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2025/787 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιώνclomazone (κλωμαζόνη).....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).

- 4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
- 5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
- 6. Τη με αριθ. πρωτ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
- 7. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
- 8. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
- 9. Την από τον Ιούλιο του 2024 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος KLOMA στην Ιταλία (αριθμ. έγκρισης: 17726/ 04.12.2020).
- 10. Την αριθμ. 42989/14.02.2025 αίτηση και τα από 01.09.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) REXXAR (δ.ο. clomazone 36% β/ο)** της εταιρείας **SIPCAM OXON S.p.A, Ιταλίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)		70596
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης		09.09.2025
1.1.β Ημερομηνία λήξης		30.09.2027
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν		
1.2.α Εμπορικό όνομα:	REXXAR	
1.2.β Μορφή:	Μικροκάψουλες σε αιώρημα (CS)	
1.3 Δραστική ουσία		
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	Clomazone	
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	96,5% β/β min	
Χημική ομάδα:	Ισοξαζολιδινόνες	
Παρασκευαστής της δ.ο.:	SIPCAM OXON S.p.A Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Ιταλία	

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SIPCAM OXON S.p.A**
Strada Prov.le Km 2,6 Mezzana Bigli (PV), 27030, Ιταλία
2. **Weifang Cynda Chemical Co., Ltd.**
N.2 of East Partial Lingang Chemical Zone, Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong, P.R., Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 42989/14.02.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SIPCAM OXON S.p.A
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία
Τηλ.: +39 02 35378235
Fax: +39 (02) 3390 275
E-mail: egallizia@sipcam.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834
E-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834
E-mail: info@sipcam.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM OXON S.p.A
Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

SIPCAM OXON S.p.A
Via Vittorio Veneto 81, 20090, Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SIPCAM OXON S.p.A**
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

2. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.

Μάνδρα Αττικής

3. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Τ.Κ. 56403 Νέα Σάντα, Κιλκίς

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **Clomazone 36% β/ο**
 Βοηθητικές ουσίες: **67,98% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 42989/14.02.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2	Συσκευασίες		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 κ. εκ. έως 1 λίτρο	HDPE/EVOH
2	Μπιτόνια	2 λίτρα έως 10 λίτρα	HDPE/EVOH

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα απουσία ανέμου, σε υγρό έδαφος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε τον ψεκαστήρα με το 30-50% του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος συνεχίζοντας την ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό και πρώιμα μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής και υπολειμματικής δράσης για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων που δρα μετά την απορρόφηση του από τις ρίζες και τους νεαρούς βλαστούς των ζιζανίων στόχων αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών. Μετά την απορρόφησή του από τις ρίζες και τους βλαστούς μετακινείται διασυστηματικά προς το πάνω μέρος του φυτού.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο) VITVI	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (TTTTT)	40-50	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιεργείας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας του αμπελώνα: - <u>Φθινοπωρινή εφαρμογή:</u> Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99) - <u>Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή:</u> Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07)	1
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνική μουσμουλιά EIOJA	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (TTTTT)	40-50	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιεργείας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας του οπωρώνα: - <u>Φθινοπωρινή εφαρμογή:</u> Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99) - <u>Χειμερινή/ Ανοιξιάτικη εφαρμογή:</u> Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07)	1
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηινιά PRNDO Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (TTTTT)	40-50	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιεργείας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας της φυτείας: - <u>Φθινοπωρινή εφαρμογή:</u> Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99) - <u>Χειμερινή/ Ανοιξιάτικη εφαρμογή:</u> Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07)	1

Ελιά OLVEU	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (ΤΤΤΤΤ)	40-50	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 50% της επιφάνειας του ελαιώνα: - <u>Χειμερινή/ Ανοιξιότικη</u> <u>εφαρμογή</u> : Από το λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών έως και την έναρξη επιμήκυνσης τους και διαχωρισμό τους (BBCH 00-03)	1
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA Μανταρινιά CIDRE Λάιμ (Πράσινα λεμόνια) CIDAF	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (ΤΤΤΤΤ)	40-50	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας της φυτείας: - <u>Χειμερινή/ Ανοιξιότικη</u> <u>εφαρμογή</u> : Από τον λήθαργο των οφθαλμών έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07)	1
Ακρόδρυα Καρυδιά IUGRE Αμυγδαλιά PRNDU Φουντουκιά CYLAV Καστανιά CSNSA	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (ΤΤΤΤΤ)	40-50	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 50% της επιφάνειας του οπωρώνα: - <u>Φθινοπωρινή εφαρμογή</u> : Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99) - <u>Χειμερινή/ Ανοιξιότικη</u> <u>εφαρμογή</u> : Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07)	1
Ακτινιδιά (Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο) ATIDE, ATICH	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια (ΤΤΤΤΤ)	40-50	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας του οπωρώνα: - <u>Φθινοπωρινή εφαρμογή</u> : Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99) - <u>Χειμερινή/ Ανοιξιότικη</u> <u>εφαρμογή</u> : Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07)	1

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΙΔΗ:**Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:**

Έρα (*Lolium rigidum* - LOLRI)

Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:

Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum* – SOLNI), Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL), Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME), Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule* - LAMAM), Ήμερο σινάπι (*Sinapis alba* - SINAL)

ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΙΔΗ:**Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:**

Έρα (*Lolium multiflorum* - LOLMU), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),

Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:

Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL), Καλεντούλα (*Calendula arvensis* - CLDAR), Πικρίς (*Picris/ Helminthotheca echinoides* – PICEC), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE), Κίρσιο (*Cirsium arvense* - CIRAR), Άγρια ρόκα (*Diploaxis erucoides* - DIPER), Κόνυζα (*Erigeron canadensis* - ERICA), Άγριο γεράνιο (*Geranium molle* - GERMO), Μολόχα (*Malva sylvestris* - MALSI), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU), Ζωχός (*Sonchus arvensis* - SONAR, *Sonchus asper* - SONAS, *Sonchus oleraceus* - SONOL), Αγριοράδικο (*Taraxacum officinale* - TAROF), Βερόνικα (*Veronica* spp. - VERSS), Πορφυρή κύπερη (*Cyperus rotundus* - CYPRO), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP), *Lactuca denticulata* - LACDL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χρήση στη ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η χρήση στην κερασιά (PRNAV) περιλαμβάνει τη βυσσινιά (PRNCE).
3. Η χρήση στη δαμασκηλιά (PRNDO) περιλαμβάνει και την αγριοδαμασκηλιά (PRNAM).
4. Η χρήση στη μανταρινιά (CIDRE) περιλαμβάνει την κλημεντίνη (CIDCL).
5. Η χρήση στην πορτοκαλιά (CIDSJ) περιλαμβάνει τη νεραντζιά (CIDAU) και το περγαμόντο (CIDAB).
6. Η δράση του σκευάσματος επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν βρέξει σε 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται άρδευση περίπου 10mm νερού για την ενσωμάτωση - ενεργοποίηση του σκευάσματος στο έδαφος.
7. Μεταφυτρωτικά το σκεύασμα εφαρμόζεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων (2-3 πραγματικά φύλλα).
8. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
9. Για τις καλλιέργειες αμπελιού, μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, ακρόδρυων και ακτινιδιάς η φθινοπωρινή εφαρμογή πραγματοποιείται μετά τη συγκομιδή.
10. Για τις καλλιέργειες ελιάς και εσπεριδοειδών η ανοιξιάτικη εφαρμογή πραγματοποιείται μετά τη συγκομιδή.
11. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού, Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα, στις ποικιλίες αχλαδιού, Κρυστάλλι και Κοντούλα, καθώς και στις ποικιλίες ελιάς, Καλαμών και Κορωνέικη. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία clomazone, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 13 κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

7

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα λεύκανσης στην καλλιέργεια τα οποία εξαφανίζονται μετά από 1-2 εβδομάδες, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση της καλλιέργειας.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/
Προειδοποιητική λέξη:



ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση του σκευάσματος».

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή».

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν ασφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Δείξτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.

Συνιστάται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το συμβάν.

P301+P313+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό (οφθαλμίατρο).

P302+P352+P361: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα

	μολυσμένα ρούχα. P304+P340+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων τοποθετήστε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια στάση για μεταφορά. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777
--	--

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες [Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005]	Ημέρες
Αμπέλι (0151010, 0151020), Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Ιαπωνική μουσμουλιά (0130050), Βερικοκιά (0140010), Ροδακινιά – Νεκταρινιά (0140030), Δαμασκηνιά – Αγριοδαμασκηνιά (0140040), Κερασιά – Βυσσινιά (0140020), Ελιά (0161030, 0402010), Πορτοκαλιά – Νερατζιά – Περγαμόντο (0110020), Μανταρινιά – Κλημεντίνη (0110050), Γκρέιπ- φρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030), Λιμμετία (0110040), Φουντουκιά (0120060), Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120020), Καστανιά (0120040), Ακτινιδιά (0162010)	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική απαράβιαστη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε μία τουλάχιστον από τις ποικιλίες αχλαδιού, Κρυστάλλι ή Κοντούλα, στις ποικιλίες αμπελιού, Κορινθιακή σταφίδα ή Σουλτανίνα, στις ποικιλίες ελιάς, Καλαμών ή Κορωνέικη.

Β Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ