



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.04.2026
Αριθ. πρωτ: 87389

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60586 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (pyrimethanil 40 % β/ο), ως προς την κατηγορία, τον τρόπο δράσης και το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 & 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
7. Την αριθμ. 13118/142055/19.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60586 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (pyrimethanil 40 % β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την από τον Σεπτέμβριο του 2024 έκθεση αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου-ΜΦΙ για τη διεύρυνση τη άδειας διάθεσης στην αγορά του μυκητοκτόνου SCALA 40 SC.
9. Την αριθμ. 2318/63769/02.03.2023 αίτηση καθώς επίσης τα αριθμ. 2944/78288/14.03.2023 και 322896/20.11.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. **Τροποποιούμε** την αριθμ. **60586** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (pyrimethanil 40 % β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 13118/142055/19.12.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, **ως προς την κατηγορία, τον τρόπο δράσης και το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή.**

Συγκεκριμένα τα σημεία **4, 5, 6, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση. Περιέχει pyrimethanil, το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των ανιλοσπυριμιδινών και δρα παρεμποδίζοντας την έκκριση των υδρολυτικών ενζύμων των μυκήτων που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία προσβολής των φυτών. Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό δράσης, το σκεύασμα είναι αποτελεσματικό κατά στελεχών μυκήτων που δεν είναι επαρκώς ευαίσθητα σε άλλα βοτρυδιοκτόνα. Όσον αφορά στο φουζικλάδιο, η δράση του είναι τόσο προληπτική όσο θεραπευτική (ακόμη και 2-3 ημέρες μετά την προσβολή).
----------	------------------------------	---

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρ.		
Μηλιά ¹ MABSD Αχλαδιά ¹ PYUCO	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN <i>Venturia pyrina</i> - VENTPI)	110-150	75- 100	150	Εφαρμογές που ξεκινούν από την πράσινη κορυφή. Η υψηλότερη δόση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής και από το στάδιο πριν την άνθιση ως το στάδιο που οι καρποί έχουν διάμετρο 20 χιλιοστών (καρπίδιο). Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα μυκητοκτόνα κατά του φουζικλαδίου, η δόση του Scala® 40 SC μπορεί να μειωθεί σε 50-60 κ.εκ. ανά εκατόλιτρο (BBCH 10-72)	4*/7-10
Μηλιά ¹ MABSD Αχλαδιά ¹ PYUCO	Μετασυλλεκτικές ασθένειες από <i>Neofabraea</i> sp. (NFABSP)	150	-	20-200	Προληπτικές εφαρμογές στον αγρό από την πλήρη ανάπτυξη μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 79-89)	3*/10

Ροδακινιά ² PRNPS, PRNPN Βερικοκιά PRNAR, Κερασιά ^{3,4} PRNAV, PRNCE Δαμασκηνιά ⁵ PRNDO	Μετασυλλεκτικές ασθένειες από Μονίλια <i>Monilinia sp.</i> (<i>MONISP</i>)	150	-	20-200	Προληπτικές εφαρμογές στον αγρό από την πλήρη ανάπτυξη των καρπών (70% του τελικού τους μεγέθους) μέχρι την πλήρη ωρίμανσή τους πριν την συλλογή τους. (BBCH 77-89)	2**/7
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>) Δευτερογενείς προσβολές από <i>Aspergillus sp.</i> - ASPESP και <i>Penicillium sp.</i> - PENISP	200-250	200	100-125	Εφαρμογές κατά την τυπική περίοδο καταπολέμησης του βοτρύτη, δηλαδή, στο τέλος της άνθισης, πριν το κλείσιμο των σταφυλιών, κατά την ωρίμανση ή 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Εξασφαλίστε μια καλή και ομοιόμορφη κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό (BBCH 69)	1
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο)						3/14
Φράουλα FRAAN (αγρού)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200-250	150-200	100-125	Εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης (BBCH 55)	3/7-14
Φράουλα FRAAN (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200	150-200	100	Εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης (BBCH 55)	2/7-14
Μαρούλι Σκαρόλα (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200	150-200	100	Εφαρμογές που ξεκινούν κατά την κύρια βλαστητική ανάπτυξη. Καλύψτε με το ψεκαστικό υγρό την περιοχή του λαιμού και τα εξωτερικά	2/10-14

					φύλλα που ακουμπούν στο έδαφος (BBCH 19)	
Τομάτα LYPES, Μελιτζάνα SOLME (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200	150- 200	100	Εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης (BBCH 29)	3/10-14
Πιπεριά CPSAN (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200	150- 200	100	Εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης (BBCH 29)	3/10-14
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (αγγούρι CUMSA, αγγουράκι CUMSA, κολοκυθάκι CUYPE) (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200	150- 200	100	Εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης (BBCH 29)	3/10-14
Καρότο DAUCS (αγρού)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria dauci</i>) Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200	200	100	Εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 4 φύλλων (BBCH 14)	2/10-14
Κρεμμύδι ALLCE (αγρού)	Βοτρύτης (<i>Botrytis</i> sp.- <i>BOTRSP</i>)	200	150- 200	100	Εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 3-6 φύλλων (BBCH 13)	3/10
Φασολάκι PHSVX (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	150-200	150- 200	100	Εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης (BBCH 29)	2/10-14
Κυκλάμινο (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	150-225	100- 150	-	εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/7-10
Αμυγδαλιά ⁶ PRNDU (χρήση ήσσονος σημασίας)	Φαιά σήψη (<i>Monilinia laxa</i> - MONILA, <i>Monilinia fructicola</i> - MONIFC)	150	100- 150	100-150	Εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-85)	2/7

Φιστικιά ⁶ ΡΙΑΒΕ (χρήση ήσσονος σημασίας)	Καμαροσπόριο (<i>Botryosphaeria dothidea- BOTSDO</i>)	150	100- 150	100-150	Εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-85)	2/7
---	--	-----	-------------	---------	--	-----

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στην καλλιέργεια των μηλοειδών δεν θα πρέπει οι εφαρμογές να ξεπερνούν τις τέσσερις (4) συνολικά, ανά καλλιεργητική περίοδο, για το φουζικλάδιο και για την προστασία από μετασυλλεκτικές ασθένειες. Οι εφαρμογές να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) συνολικά, ανά καλλιεργητική περίοδο, για την προστασία από μετασυλλεκτικές ασθένειες στα μηλοειδή.
2. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη Νεκταρινιά (PRNPN).
3. Η χρήση στην Κερασιά (PRNAV) περιλαμβάνει τη Βυσσινιά (PRNCE)
4. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στην Κερασιά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρό αριθμό δένδρων.
5. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια Δαμασκηνιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.
6. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyrimethanil, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα
- ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών με ανιλνοπυριμιδίνες να μην ξεπερνά το 50% των συνολικών εφαρμογών.
- Όταν γίνονται περισσότερες από 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο για την καταπολέμηση του βοτρύτη, ο αριθμός των εφαρμογών των ανιλνοπυριμιδινών περιορίζεται σε 1. Όταν γίνονται 4-6 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο για την καταπολέμηση του βοτρύτη, συστήνονται 2 εφαρμογές με ανιλνοπυριμιδίνες. Σε περιπτώσεις που οι εφαρμογές κατά του βοτρύτη ξεπερνούν τις 7 ανά καλλιεργητική περίοδο, συστήνονται 3 εφαρμογές με ανιλνοπυριμιδίνες κατά το μέγιστο, αλλά δεν πρέπει να γίνονται περισσότερες από 2 συνεχόμενες

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P101: Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και την εφαρμογή

Σε δενδρώδεις καλλιέργειες πυκνού φυλλώματος (δηλαδή σε καλλιέργειες για τις οποίες ο χειριστής τεχνικά δεν μπορεί να αποφύγει την επαφή με το ψεκασμένο φύλλωμα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού) η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσω εξοπλισμού τοποθετημένου σε γεωργικό ελκυστήρα.

Σε περίπτωση επανεισόδου θα πρέπει να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.

Για την προστασία των κατοίκων και των περιοίκων να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους].

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για το αμπέλι.
- Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για το κυκλάμινο.
- Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων, στην περίπτωση πρώιμης εφαρμογής στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς.
- Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων, εκ' των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης ή μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, στην περίπτωση όψιμης εφαρμογής στην καλλιέργεια της μηλιάς, της αχλαδιάς, της αμυγδαλιάς και της φιστικιάς.
- **Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για τα πυρηνόκαρπα.**

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός φυτικού προϊόντος με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Ροδακινιά-Νεκταρινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010),	1
Κερασιά-Βουσσινιά (0140020), Δαμασκηνιά (0140040), Φράουλα (Α+Θ) (0152000), Τομάτα (Α+Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Α+Θ) (0231030), Πιπεριά (Θ) (0231020), Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030)	3
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020)	7
Μαρούλι (Α+Θ) (0251020), Σκαρόλα (Α+Θ) (0251030), Καρότο (Α) (0213020), Κρεμμύδι (Α) (0220020), Φασολάκι (Θ) (0260010)	14
Αμπέλι (0151010)	21
Αμυγδαλιά (0120010), Φιστικιά (0120100)	30
Κυκλάμινο (Α+Θ)	Δεν ορίζεται

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρθμ. 13118/142055/19.12.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ