



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.04.2026
Αριθ. πρωτ.: 87570

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience SAS, Γαλλίας
(Δια της UPL Ελλάς Α.Ε.)

e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 70276 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 12 EC (clethodim 12% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 10233/99269π.ε./20.03.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 70276 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 12 EC (clethodim 12% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 247070/15.09.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Διευρύνουμε την αριθμ. 70276 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 12 EC (clethodim 12% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 10233/99269π.ε./20.03.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Καρότο DAUCA	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-45)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum halepense</i> SORHA	200	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45)	
Κρεμμύδι ALLCE	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-45)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum halepense</i> SORHA	200	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45)	
Ηλιάνθος HELAN Βαμβάκι GOSHI	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-19)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum halepense</i> SORHA	200-250	20-40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ.	

				(BBCH 12-19)	
	Άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	250-300	20-40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-19)	
Πατάτα SOLTU	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-33)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum halepense</i> SORHA	200-250	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-33)	
	Άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	250-300	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν τα ζιζάνια είναι 15εκ. (BBCH 12-33)	
Ζαχαρότευτλο BEAVA Κτηνοτροφικό τεύτλο BEAVC	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-33)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum halepense</i> SORHA	200	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-33)	
	Άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	250-300	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-33)	

Σκόρδο* ALLSA Χρήση ήσσονος σημασίας	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 12-45)	1
	Βέλιουρας <i>Sorghum halepense</i> SORHA	200	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45)	
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) (εγκατεστημένοι αμπελώνες)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια ³	200	30-50	Ψεκασμός σε λωρίδες, από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως πριν τη συγκομιδή των καρπών (BBCH 00-85) και πάντα μεταξύ των μηνών Μαρτίου έως Αυγούστου.	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια ³	400		Ψεκασμός σε λωρίδες από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως πριν τη συγκομιδή των καρπών. (BBCH 00-85) και πάντα μεταξύ των μηνών Μαρτίου έως Αυγούστου.	
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνική μουσμουλιά ΕΙΟJA (εγκατεστημένες καλλιέργειες και φυτώρια)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια ³	200	30-50	Ψεκασμός σε λωρίδες από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 00-85) και πάντα μεταξύ των μηνών Μαρτίου έως Οκτωβρίου.	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια ³	400		Ψεκασμός σε λωρίδες από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 00-85) και πάντα μεταξύ των μηνών Μαρτίου έως Οκτωβρίου	
Τομάτα LYPES	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια ³	100-150	20-40	Ψεκασμός από το στάδιο του σχηματισμού του 2 ^{ου} φύλλου στον κεντρικό βλαστό έως την εμφάνιση εννέα ή περισσότερων πλευρικών βλαστών (BBCH 12-29). Και πάντα μεταξύ των μηνών Μαΐου έως Ιουνίου.	1

	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια ³	200		Ψεκασμός από το στάδιο του σχηματισμού του 2 ^{ου} φύλλου στον κεντρικό βλαστό έως την εμφάνιση εννέα ή περισσότερων πλευρικών βλαστών (BBCH 12-29) και πάντα μεταξύ των μηνών Απριλίου έως Ιουνίου.	
Φακή* LENCU Ρεβύθι* CIEAR	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100	20-40	Ψεκασμός από το 3^ο έως το 9^ο πραγματικό φύλλο. (BBCH 13-19)	1
Χρήσεις ή σσονος σημασίας					

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου, **φακής και ρεβυθιού** από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του.
2. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης.
3. Η εφαρμογή του σκευάσματος να πραγματοποιείται όταν τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του 5^{ου} αδελφού βλαστού (BBCH 12-25) και τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως πριν την επιμήκυνση του στελέχους (BBCH 13-29).
4. Στις καλλιέργειες των μηλοειδών, εσπεριδοειδών, ελιάς και αμπελιού να γίνεται στοχευμένος ψεκασμός στα ζιζάνια και με κατεύθυνση προς τα κάτω.
5. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
7. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

- για τις καλλιέργειες καρότο, κρεμμύδι, ηλιάνθος, βαμβάκι, πατάτα, ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα, σκόρδο:

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγριοβρώμη (*Avena barbata* – AVEBA)

Αγριοβρώμη (*Avena fatua* – AVEFA)

Αγριοβρώμη (*Avena sativa* – AVESA)

Άγριο ρύζι (*Oryza sp.* – ORYSS)

Αλεπονουρά (*Alopecurus pratensis* – ALOPR,

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* – DIGSA)

Βρόμος (*Bromus erectus* – BROER)

Λειβαδοπόα (*Poa pratensis* – POAPR)

Λεπτή ήρα (*Lolium rigidum* – LOLRI)

Λεπτόχλοα (*Leptochloa caerulescens* – LEFCA)

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* – ECHCG)

Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum* – LOLMU)

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγριάδα (*Cynodon dactylon* – CYNDA)

Αγρόπυρος (*Agropyron repens* – AGRRE)

Βέλιουρας (*Sorghum halepense* – SORHA)

Νεραγριάδα (*Paspalum distichum* – PASDS)

Πολυετής ήρα (*Lolium perenne* – LOLPE)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Πόα κοινή (*Poa annua* – POAAN)

Σετάρια (*Setaria verticillata* – SETVE)

Φάλαρη (*Phalaris brachystachys* – PHABR)

- για τις καλλιέργειες: Μηλοειδή, Αμπέλι:

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* – DIGSA)

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* – ECHCG)

Αγριοκρίθαρο (*Hordeum murinum* – HORMU)

Ήρα (*Lolium* sp. - LOLSS)

Σετάρια (*Setaria* sp. – SETSS)

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγρόπυρος (*Agropyron repens* – AGRRE)

Αγριάδα (*Cynodon dactylon* – CYNDA)

Πολυετής ήρα (*Lolium perenne* – LOLPE)

Βέλιουρας (*Sorghum halepense* – SORHA)

- για την καλλιέργεια της τομάτας

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* – DIGSA)

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* – ECHCG)

Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum* – PANDI)

Φάλαρη (*Phalaris minor* - PHAMI)

Σετάρια (*Setaria* sp. - SETSS, *Setaria viridis* - SETVI)

Λεπτή ήρα (*Lolium rigidum* – LOLRI)

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγριάδα (*Cynodon dactylon* – CYNDA)

Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum* – PANDI)

Βέλιουρας (*Sorghum halepense* – SORHA)

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας.

P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την φόρτωση και εφαρμογή του προϊόντος. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

Σε περίπτωση επανεισόδου στον χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

Sp1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη:

1) 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%, στις καλλιέργειες: καρότο, κρεμμύδι, ηλιάνθος, βαμβάκι, πατάτα, ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα, σκόρδο, **φακή και ρεβύθι**.

2) 5 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75% για τη δόση των 100 κ.εκ./στρ., στην καλλιέργεια της τομάτας,

3) 5 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%, για τη δόση των 150 κ.εκ./στρ. στην

καλλιέργεια της τομάτας,

4) 10 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% για τη δόση των 200 κ.εκ./στρ. στις καλλιέργειες: αμπέλι, τομάτα και μηλοειδή.

5) 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75% για τη δόση των 400 κ.εκ./στρ. στις καλλιέργειες: αμπέλι και μηλοειδή.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Καρότο (0213020)	40
Ζαχαρότευτλο (0900010), Κτηνοτροφικό τεύτλο (0900990), Κρεμμύδι (0220020), Πατάτα (0211000), Σκόρδο (0220010)	56
Βαμβάκι (0401090), Ηλίανθος (0401050)	100
Αμπέλι (εγκατεστημένοι αμπελώνες) (0151010, 0151020)	21
Τομάτα (0231010)	30
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μεσπιλιά (0130040), Μουσμουλιά (0130050) (εγκατεστημένες καλλιέργειες)	Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
Φυτώρια: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά, Μουσμουλιά	Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
Φακή (0300020), Ρεβύθι (0300030)	60

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10233/99269π.ε./20.03.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ