



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.05.2026
Αριθ. πρωτ.: 139537

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience SAS, Γαλλίας
(Δια της UPL Ελλάς Α.Ε.)

e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 70565 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 24 EC (clethodim 24% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 338697/04.11.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 70565 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 24 EC (clethodim 24% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 247076/15.09.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Διευρύνουμε την αριθμ. 70565 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 24 EC (clethodim 24% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 338697/04.11.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Σκόρδο ALLSA	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου. (BBCH 12-45)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50-75			
Αγκινάρα CYUCA	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας μέχρι τη διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών. (BBCH 12-51)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50-75			
Μηδική MEDSA	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας μέχρι τη διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών. (BBCH 12-51)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50-75			
Βαμβάκι GOSHI	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας. (BBCH 12-19)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50-75			
Αραχίδα ARHHY	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100-125	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας μέχρι όταν τα φύλλα να καλύπτουν το 50% του εδάφους. (BBCH 12-35)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50-75			
Κρεμμύδι ALLCE	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου. (BBCH 12-45)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50-75			
Ελαιοκράμβη BRSNN	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας έως τον δεύτερο κόμβο. (BBCH 12-32)	1
Ηλίανθος HELAN	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας. (BBCH 12-19)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	75			
Φασόλι νωπό PHSVX Αρακάς νωπός	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50	20-40	Ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας.	1

PIBSX				(BBCH 12-19)	
Πατάτα SOLTU	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής. (BBCH 12-33)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	75			
Ζαχαρότευτλο BEAVP	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου. (BBCH 12-33)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	75			
Τομάτα Υπαίθρου LYPES	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100-150	20-40	Ψεκασμός από το στάδιο του σχηματισμού του 2 ^{ου} φύλλου στον κεντρικό βλαστό έως την εμφάνιση εννέα ή περισσότερων πλευρικών βλαστών. (BBCH 12-29)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	75			
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός κάτω από τις γραμμές φύτευσης, από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως πριν τη συγκομιδή των καρπών. (BBCH 00-85)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100			
Καρότο DAUCS	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	100	20-40	Ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου. (BBCH 12-45)	1
	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50-75			
Φακή* LENCU Ρεβύθι* CIEAR	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	50	20-40	Ψεκασμός από το 3^ο έως το 9^ο πραγματικό φύλλο. (BBCH 13-19)	1

*Χρήσεις ήσσονος
σημασίας*

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες φακής και ρεβυθιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

Παρατηρήσεις:

- Μην εφαρμόζετε σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή υγρασία.
- Η βέλτιστη στιγμή εφαρμογής στα ζιζάνια αγρωστωδών είναι από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι τη βλάστηση νέου φυτού στα ετήσια και με μίσχους μήκους 15-20 εκατοστών στα πολυετή. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εδάφους

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγριοβρώμη (*Avena* spp. – AVESS)

Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides* – ALOMY)

Μουχρίτσα (*Echinochloa* sp. – ECHSS)
Σετάρια (*Setaria* sp. – SETSS)

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:

Αγριάδα (*Cynodon dactylon* – CYNDA)
Βέλιουρας (*Sorghum halepense* – SORHA)
Agropyron repens

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μπότες κατά την ανάμειξη, την φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι, γάντια και μπότες.
Συστήνεται η χρήση γαντιών.*

Sp1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες: αγκινάρα, βαμβάκι, αραχίδα, πατάτα, ζαχαρότευτλο, ηλίανθο, τομάτα, μηδική, καρότο, σκόρδο, κρεμμύδι, φασόλι, αρακά, ελαιοκράμβη, αμπέλι, **φακή και ρεβύθι.**

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη:

- 40 μέτρων από αμπέλι,
- 10 μέτρων από αγκινάρα, βαμβάκι, πατάτα, ζαχαρότευτλο, ηλίανθο, τομάτα, μηδική, καρότο, αραχίδα, σκόρδο και κρεμμύδι,
- 5 μέτρων από φασόλι, αρακά, ελαιοκράμβη, **φακή και ρεβύθι.**

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Βαμβάκι (0401090), Ηλίανθος (0401050)	100
Ελαιοκράμβη (0401060)	120
Αμπέλι (0151000)	21
Τομάτα (0231010)	30
Αγκινάρα (0270050), Μηδική (0632010-	40

003), Καρότο (0213020)	
Σκόρδο (0220010), Κρεμμύδι (0220020), Πατάτα (0211000), Ζαχαρότευτλο (0900010)	56
Αραχίδα (0401020)	60
Φασόλι (0260010), Αρακάς (0260040)	56
Φακή (0300020), Ρεβύθι (0300030)	60

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 338697/04.11.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ