



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.12.2025
Αριθ. πρωτ: 359490

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι

e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60636 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERCADIS 30 EC (δ.ο fluxarγoxad 30 % β/ο), ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 & 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
7. Την αριθμ. 7933/76610/13.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60636 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERCADIS 30 SC (fluxarygroxad 30% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την από τον Νοέμβριο του 2024 έκθεση αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου-ΜΦΙ (ΕΜΠ 2625) για τη διεύρυνση τη άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SERCADIS 30 SC.
9. Την αριθμ. 31616/14.11.2025 εισήγηση του ΜΦΙ για τον έλεγχο της προτεινόμενης Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Ο.Γ.Π.) του μυκητοκτόνου SERCADIS 30 SC στην καλλιέργεια της βερικοκιάς και της ροδακινιάς.
10. Την αριθμ. 8573/240874/28.07.2023 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 58965/05.03.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε** την αριθμ. **60636** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) SERCADIS 30 EC (δ.ο fluxarygroxad 30 % β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7933/76610/13.07.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το **φάσμα δράσης** του σκευάσματος, τις **ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές** υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις **δηλώσεις επικινδυνότητα και προφύλαξης**, τις **πρώτες βοήθειες** καθώς επίσης και την **τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή**.

Συγκεκριμένα τα σημεία **5, 6, 10, 11, 12** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζιο Οινοποιήσιμο Σταφίδα)	Ωίδιο <i>Erysiphe necator</i> UNCINE	15	20-120	Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. (BBCH 11-83)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>Venturia pyrina</i> VENTPI Στεμφύλιο <i>Stemphylium</i> sp. STEMSP	25-30	20-120	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες

	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> PODOLE	15	20-120	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	15	50-150	Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)	3**** εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Ροδακινιά PRNPS, PRNPN, Βερικοκιά PRNAR, Δαμασκηνιά*** PRNDO, Κερασιά PRNAV	Μονίλια <i>Monilinia</i> spp. (MONISP)	30	20-90	Εφαρμογές μετά την άνθηση έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 69-89)	2**** εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Αμυγδαλιά* PRNDU (χρήση ήσσονος σημασίας)	Φαιά σήψη <i>Monilinia laxa</i> MONILA <i>Monilinia fructicola</i> MONIFC	30	100-120	Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Φιστικιά* PIAVE (χρήση ήσσονος σημασίας)	Καμαροσπόριο <i>Botryosphaeria dothidea</i> BOTSDO	30	100-120	Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Καστανιά* CSNSA (χρήση ήσσονος σημασίας)	Φαιά σήψη <i>Gnomoniopsis castaneae</i> GNMPCA Ανθράκνωση <i>Mycosphaerella maculiformis</i> MYCOMC	30	100-120	Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Καρυδιά* IUGRE (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ανθράκνωση <i>Gnomonia leptostyla</i> GNOMLE	30	100-120	Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Πατάτα (κόνδυλοι για φύτευση) SOLTU	Ριζοκτόνια <i>Rhizoctonia solani</i> RHIZSO	20 κ.εκ. /100 κιλά πατατόσπορου	Αδιάλυτο ή έως 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος/ 1000 κιλά κονδύλων	Εφαρμογή απ' ευθείας στον πατατόσπορο πριν τη φύτευση με εξαιρετικά μικρού όγκου ψεκασμό (ULV). ¹ (BBCH 00)	1 εφαρμογή

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Υ) CUMME Καρπούζι (Υ) CITLA	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Leveillula taurica</i> LEVETA Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella</i> sp. MYCOSP	15	20-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Κολοκύθα (Υ) CUMMA	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Leveillula taurica</i> LEVETA Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella</i> sp. MYCOSP <u>**Χρήση</u> <u>Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium</i> spp. CLADSP	15	20-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Θ) CUMME Κολοκύθα (Θ) CUMMA Καρπούζι (Θ) CITLA	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Leveillula taurica</i> LEVETA Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella</i> sp. MYCOSP	15	40-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι (Υ) CUMSA	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI	15	20-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

	<i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Leveillula taurica</i> LEVETA Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella</i> sp. MYCOSP			πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89)	
Κολοκύθι (Υ) CUUPE	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Leveillula taurica</i> LEVETA Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella</i> sp. MYCOSP ** <u>Χρήση</u> <u>Ήσσονος</u> <u>Σημασίας</u> : Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium</i> spp. CLADSP	15	20-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPE	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Leveillula taurica</i> LEVETA Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella</i> sp. MYCOSP	15	40-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME Πιπεριά (Υ+Θ) CPSAN	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium (neo)lycopersici</i> OIDILY Αλτερνάρια <i>Alternaria solani</i> ALTESO	15	40-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
		25	40-150		

Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium</i> <i>(neo)lycopersici</i> OIDILY	15	40-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 14-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
	Αλτερνάρια <i>Alternaria solani</i> ALTESO <u>**Χρήση</u> <u>Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium</i> spp. CLADSP	25	40-150		
Καρότο (Υ) DAUCS	Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> ERYSHE	15	20-100	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ανάπτυξη του συγκομιζόμενου τμήματος (ρίζα). (BBCH 12-49)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
	Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	25	20-100	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ανάπτυξη του συγκομιζόμενου τμήματος (ρίζα). (BBCH 12-49)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Μαρούλι (Υ) LACSA Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO Σκαρόλα (Υ) CICEL Ρόκα (Υ) ERUVE	Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. SCLESP	50	20-100	Εφαρμογή από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την συγκομιδή. (BBCH 12-49)	1 εφαρμογή
Ανθοκράμβες: Κουνουπίδι (Υ) BRSOB Μπρόκολο (Υ) BRSOK, BRSAG <u>Κεφαλωτές</u> <u>κράμβες:</u> Λάχανο (Υ) BRSOL	Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella brassicicola</i> MYCOBR Στεμφύλιο <i>Stemphylium</i> spp. STEMSP	25	20-100	Εφαρμογές από την έναρξη σχηματισμού των κεφαλών ως την πλήρη ανάπτυξή τους. (BBCH 41-49)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Ωίδιο <i>Sphaerotheca macularis</i> SPHRMA	15	20-130	Εφαρμογές από την έναρξη άνθισης ως το τέλος της συγκομιδής. (BBCH 60-89)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Παντζάρι* (Υ) BEAVD Σελινόριζα* (Υ) APUGR Χρένο* (Υ) ARWLA Ηλίανθος κονδυλόριζος* (Υ) HELTU Παστινάκι* (Υ) PAVSA Ριζώδης μαϊντανός* (Υ) PARCT Ραπάνι* (Υ) RAPSR Λαγόχορτο* (Υ) TROPS Γουλί* (Υ) BRSNN Γογγύλι* (Υ) BRSRR Ρίζα βαλεριάνας* (Υ) VALOF Ρίζα τζίνσενγκ* (Υ) PNXGI, PNXQU Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> SCLESC Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> ERYSHE <i>Leveillula</i> spp. LEVESP Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> spp. ALTESP	50 15 25	20-100 20-100 20-100	Από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως την πλήρη ανάπτυξη του συγκομιζόμενου τμήματος (ρίζα). BBCH 12-49	1 εφαρμογή
Πράσο* (Υ) ALLPO Κρεμμύδι φρέσκο*(Υ) ALLCE Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Αλτερνάρια <i>Alternaria porri</i> ALTEPO Σκωρίαση <i>Puccinia alli</i> PUCCAL	25	20-100	Από την ολοκλήρωση της έκπτυξης όλων των φύλλων έως τη συγκομιδή. BBCH 20-49	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Αγκινάρα (Υ) CYUSC Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ERYSCI Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> spp.	15	40-150	Από την έναρξη επιμήκυνσης του κεντρικού ανθικού στελέχους έως >50% των ανθοκεφαλών να έχει κιτρινοκαφέ χρώμα. BBCH 51-85	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Σέλερι* (Υ) APUGD Φινόκιο* (Υ) (Μαραθόριζα) FOEVA	Σεπτοριώση <i>Septoria</i> spp. SEPTSP Σκληρωτίνια	50	40-60	Από την έναρξη σχηματισμού έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του	1 εφαρμογή

Άγρια αγκινάρα* (Υ) CYUCA Ραβέντι* (Υ) RHERH Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	<i>Sclerotinia</i> spp. SCLESP			συγκομιζόμενου τμήματος. BBCH 41-49	
Κοκκινόφυλλο Κιχώριο/Ραντίτσιο* (Υ) CICIF Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ωίδιο <i>Golovinomyces</i> <i>cichoracearum</i> (<i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i>) ERYSCI	15	20-100	Από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου ως τη συγκομιδή. BBCH 12-49	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες: αμυγδαλιά, φιστικιά, καστανιά, καρυδιά, παντζάρι, σελινόριζα, χρένο, ηλιάνθος κονδυλόριζος, παστινάκι, ριζώδης μαϊντανός, ραπάνι, λαγόχορτο, γουλί, γογγύλι, ρίζα βαλεριάνας, ρίζα τζινσενγκ, πράσο, κρεμμύδι φρέσκο, αγκινάρα, σέλερι, φινόκιο, άγρια αγκινάρα, ραβέντι, κοκκινόφυλλο κιχώριο/ραντίτσιο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του». **Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην κλαδοσπορίωση στις καλλιέργειες κολοκύθας (Υ), κολοκυθίου (Υ) και μελιτζάνας (Υ). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος. ***Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια Δαμασκηνιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. ****Στα πυρηνόκαρπα, πρέπει να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες που αφορούν σε κάθε ασθένεια και, συνολικά για ωίδιο και μονίλια, οι εφαρμογές να μην υπερβαίνουν τα 60 κ.εκ. σκευάσματος ανά καλλιεργητική περίοδο. 1. Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX. 2. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά. 3. Η χρήση στο Μαρούλι περιλαμβάνει και το μαρούλι iceberg, το μαρούλι σαλάτα, το στρογγυλό μαρούλι και το κοινό μαρούλι. 4. Η χρήση στη Σκαρόλα περιλαμβάνει το κιχώριο/ραντίτσιο και τα κατσαρά αντίδια. 5. Η χρήση στο Λάχανο περιλαμβάνει το κόκκινο λάχανο και το λάχανο σαβόι. 6. Η χρήση στην Κερασιά περιλαμβάνει τη Βυσσινιά (PRNCE)					

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν τη φύτευση, ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι κανένας κόνδυλος που έχει ψεκάστεί με SERCADIS δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κατά λάθος προς κατανάλωση. Οι επενδεδυμένοι κόνδυλοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή. Η εφαρμογή σε πατατόσπορο να πραγματοποιείται : • μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • κατά προτίμηση λίγο πριν τη φύτευση και χωρίς να υπερβεί το στάδιο των λευκών φύτρων. Η διαδικασία του ψεκασμού που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει καλή διανομή του προϊόντος στο σύνολο των καθαρών κονδύλων. <u>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</u> Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluxarγoxad, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 (SDHIs - Succinate dehydrogenase inhibitors) κατά FRAC Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: • η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα. • να εφαρμόζεται προληπτικά ή κατά το δυνατόν στα αρχικά στάδια της ασθένειας. • στην φιστικιά, την αμυγδαλιά, την καστανιά και την καρυδιά να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και 2-methylisothiazol-3(2H)-one. H362: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
11	Δηλώσεις προφύλαξης:	P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. P101: Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P260: Μην αναπνέετε σκόνη ή σταγονίδια. P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. <i>Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση, την εφαρμογή και κατά το χειρισμό του επενδεδυμένου πατατόσπορου.</i> Σε δενδρώδεις καλλιέργειες πυκνού φυλλώματος (δηλαδή σε καλλιέργειες για τις οποίες ο χειριστής τεχνικά δεν μπορεί να αποφύγει την επαφή με το ψεκάσμένο φύλλωμα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού) η εφαρμογή θα πρέπει

να πραγματοποιείται μόνο μέσω εξοπλισμού τοποθετημένου σε γεωργικό ελκυστήρα.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς στις δεινρώδεις καλλιέργειες να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 15 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

12

Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό Αφαιρέστε άμεσα τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

P302+P352+P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα καλά για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά.

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε 200- 300 ml νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός φυτικού προϊόντος με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια 0151010 και οινοποιήσιμα σταφύλια 0151020), Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020)	35
Ροδακινιά-Νεκταρινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά - Βυσσινιά (0140020)	3
Αμυγδαλιά (0120010), Καστανιά (0120040), Φιστικιά (0120100), Καρυδιά (0120110), Μαρούλι (Υ)-μαρούλι iceberg (Υ)-μαρούλι σαλάτα (Υ)-στρογγυλό μαρούλι (Υ)-κοινό μαρούλι (Υ) (0251020), Σκαρόλα (Υ)-Κατσαρό αντίδι (Υ)-Κοκκινόφυλλο κιχώριο/Ραντίτσιο (Υ) (0251030), Λυκοτρίβολο (Υ) (0251010), Ρόκα (Υ) (0251060), Κουνουπίδι (Υ) (0241020), Μπρόκολο (Υ) (0241010), Λάχανο (Υ)-Κόκκινο λάχανο (Υ)-Λάχανο σαβόι (Υ) (0242020), Πράσο-Κρεμμύδι φρέσκο (0270060)	14
Καρότο (Υ) (0213020), Παντζάρι (0213010), Σελινόριζα (0213030), Χρένο (0213040), Ηλίανθος κονδυλόριζος (0213050), Παστινάκι (0213060), Ριζώδης μαϊντανός (0213070), Ραπάνι (0213080), Λαγόχορτο (0213090), Γουλί (0213100), Γογγύλι (0213110), Ρίζα βαλεριάνας, Ρίζα τζίνσενγκ, Αγκινάρα (0270050), Σέλερι (0270030), Φινόκιο (0270040), Άγρια αγκινάρα (0270020), Ραβέντι (0270070)	7
Πεπόνι (Υ+Θ)(0233010), Κολοκύθα (Υ+Θ) (0233020), Καρπούζι (Υ+Θ)(0233030), Αγγούρι (Υ+Θ) (0232010), Κολοκύθι (Υ+Θ) (0232030), Τομάτα (Υ+Θ)(0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ)(0231030), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020)	3
Φράουλα (Υ+Θ) (0152000)	1
Πατάτα (0211000)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκεύασματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκεύασματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκεύασματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρθμ. 7933/76610/13.07.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ