



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.02.2020  
Αριθ. πρωτ: 268/7650

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κορνηλία Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: **Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία**  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.**  
– «**AGRIBIZ**»  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)  
a.toutoutzidakis@agribiz.gr

Κοιν: **1. Γραφείο Υπουργού ΑΑ&Τ κ. Μ. Βορίδη**  
minister-mailbox@hq.minagric.gr  
**2. Γραφείο ΓΓ ΑΑ&Τ κ. Γ. Στρατάκου**  
gensecr@hq.minagric.gr

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70107 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SHARPEN 33 EC (pendimethalin 33% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 1387/16902/11.02.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70107 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SHARPEN 33 EC (pendimethalin 33% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 268/7650/10.01.2020 αίτηση της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ».

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθμό 70107 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SHARPEN 33 EC (pendimethalin 33% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 1387/16902/11.02.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις)

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	κ.εκ/ στρέμμα		
ΚΑΡΟΤΟ DAUCS	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ALLCE	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 500	Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας, (στο στάδιο του μαστιγίου)	1
ΣΚΟΡΔΟ ALLSA	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 500	Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μαστιγίου)	1
ΤΟΜΑΤΑ LYPES ΠΙΠΕΡΙΑ CPSSS	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 500	Πριν τη μεταφύτευση	1

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΛΑΧΑΝΟ BRSOX  ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ BRSOB	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 500	Πριν τη μεταφύτευση	1
ΑΡΑΚΑΣ RIBSX	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
<u>ΟΣΠΡΙΑ</u>  ΡΕΒΥΘΙΑ CIEAR  ΦΑΣΟΛΙΑ RHASSS  ΚΟΥΚΙΑ VICFX	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
<b>Φακή**</b> <b>LENCU</b>  <i>(Χρήση ήσσονος σημασίας)</i>	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΜΑΡΟΥΛΙ LACSA  ΡΑΔΙΚΙ TAROF	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 500	Πριν τη μεταφύτευση	1
<b>Μαϊντανός**</b> <b>PARCR</b>  <b>Φύλλα άνηθου**</b> <b>AFEGR</b>  <i>(Χρήση ήσσονος σημασίας)</i>	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	300 – 500	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΣΠΑΡΑΓΓΙ ASPOF	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	500 – 600	Προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή	1

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου.	
ΑΓΚΙΝΑΡΑ CYUCA	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 500	Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν την νέα ανάπτυξη σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων	1
ΒΑΜΒΑΚΙ GOSHI	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 600	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΗΛΙΑΝΘΟΣ HELAN  ΣΟΓΙΑ GLXMA  ΑΡΑΧΙΔΑ ARHHY	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 600	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΠΑΤΑΤΑ SOLTU	Ετήσια, αγρωστώδη και	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της	1

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	πλατύφυλλα ζιζάνια*			καλλιέργειας, (Επιφανειακά αμέσως μετά την φύτευση)	
ΚΑΠΝΟΣ ΝΙΟΤΑ (σαν ζιζανιοκτόνο)	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 600	Πριν ή μετά τη μεταφύτευση μεταξύ των γραμμών και μετά το τελευταίο παράχωμα με κατευθυνόμενο ψεκασμό χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών	1
ΚΑΠΝΟΣ ΝΙΟΤΑ (σαν αντιφυλλιζιακό των Αμερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια)	Παρεμπόδιση ανάπτυξης μασχαλιαίων οφθαλμών - φιλλιζίων	20 – 50	400	Στις αρχές της πλήρους άνθησης αφού κορφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαμηλά, ψεκασμό με 20 κ. εκ. ψ.υ. / φυτό, διαλύματος 10 κ. εκ. προϊόντος ανά λίτρα	1
ΣΙΤΑΡΙ TRZAX	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά)	1
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ZEAMX	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

\*Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense* - SORHA), Μίλιο (*Milium* sp. - MLISS), Φεστούκα (*Festuca* sp. - FESSS), Κεχρί (*Panicum* sp. - PANSS), Ελευσίνι (*Eleusine indica* - ELEIN), Ήρα (*Lolium multiflorum* - LOLMU), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG), Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides* - ALOMY), Κοινή πόα (*Poa annua* - POAAN), Ανεμάγρωστη (*Apera spica-venti* - APESV), Νεραγριάδα (*Paspalum paspalodes* - PASDS), Φάλαρη (*Phalaris* sp. - PHASS), Σετάρια (*Setaria* spp. - SETSS).

Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## Ευαίσθητα ζιζάνια:

Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI), Βλήτο (*Amaranthus* spp. - AMASS), Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL), Γλυστρίδα (*Portulaca oleracea* - POROL), Άνθεμις (*Anthemis* sp. - ANTSS), Μαργαρίτα (*Chrysanthemum* sp. - CHYSS), Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL), Αγριοκαρδαμούδα (*Lepidium draba* - CADDR), Οξαλίδα (*Oxalis pes-carpae* - OXAPC), Παπαρούνα κοινή (*Papaver rhoeas* - PAPRH), Πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*) POLCO, Περικοκλάδα ετήσια (*Convolvulus arvensis*) CONAR, Γκάλιο (*Galium aparine* - GALAP), Βερόνικα (*Veronica* sp. - VERSS), Τσουκνίδα (*Urtica* sp. - URTSS), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE), *Adonis* spp - ADOSS.

## Παρατηρήσεις:

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SHARPEN 33 EC.

Α. Η δράση του SHARPEN 33 EC στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

Β. Στο βαμβάκι μετά την προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.εκ/στρέμμα (σκεύασμα 50% περιεκτικότητας σε δρών συστατικό) ή 125 γρ δραστική ουσία /στρέμμα για την καλύτερη αντιμετώπιση του στύφνου (*Solanum nigrum*).

Γ. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών.

Δ. Το SHARPEN 33 EC καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνας). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο.

Η. Μην εφαρμόζετε το SHARPEN 33 EC σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.

**\*\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φακής, του μαϊντανού και των φύλλων άνηθου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 1387/16902/11.02.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΙΟΣ