



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.08.2026
Αριθ. πρωτ: 220544

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: CAF KARYON S.L., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» Μιχαλακοπούλου
157, 11527, Αθήνα)
email: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14960 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SINIALO (δ. ο. deltamethrin 2,5% β/ο) ως προς την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».

5. Την αριθμ. 73815/23.03.2026 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14960 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SINIALO (δ. ο. deltamethrin 2,5% β/ο) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. 5068/68713/14.05.2018 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14657 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BRONTES 2,5 EC (δ. ο. deltamethrin 2,5% β/ο).
7. Την αριθμ. 155698/16.06.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 14960 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SINIALO (δ. ο. deltamethrin 2,5% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 73815/23.03.2026 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο (σημεία **1.4στ, 10, 11 και 12**).

Η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14960

23.03.2026

15.08.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

SINIALO

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Deltamethrin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Πυρεθρινοειδών

Παρασκευαστής της δ.ο.:

Meghmani Organics Limited
Meghmani House", Shree Nivas Society, Off. New Vikasgruh
Road, Paldi, Ahmedabad, 380 007 Gujarat, Ινδία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Meghmani Organics Limited
Plot No. 402 to 404 & 452 to 454 Po. Chharodi, Taluka Sanand,
Dist. Ahmedabad- 382 170 Gujarat, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστηκής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστηκής ουσίας, όπως προσδιορίζονται στο Equivalence Report αναρτημένο στο CIRCA από το RMS FR, 2011 και όπως τροποποιήθηκαν με την με αριθ. πρωτ. 5683/145083/23.05.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

CAF KARYON, S.L.
c/ Ezequiel Solana, 6, 1oC
28017, Μαδρίτη – Ισπανία

Laura Celma Jiménez
Τηλ.: +34 669702347
e-mail: laura.celma@Karyon.es

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

NITROFARM A.E.
Β.Π. Σίνδου Κ35-55 Τ20, 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30)800-11-820820
Email: info@nitrofarm.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

CAF KARYON, S.L.
c/ Ezequiel Solana, 6, 1oC
28017, Μαδρίτη – Ισπανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1.LERIDA UNION QUIMICA, S.A. (LUQSA)
c/ Afueras, s/n, 25173 Sudanel, Lleida, Ισπανία

2.Spachem
Pol. Ind. Guadasequies, 46839 Guadasequies
Valencia, Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1.LERIDA UNION QUIMICA, S.A. (LUQSA)
c/ Afueras, s/n, 25173 Sudanel, Lleida, Ισπανία

2.Spachem
Pol. Ind. Guadasequies, 46839 Guadasequies

Valencia, Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Deltamethrin 2,5% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 97,37% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 5757/61965/23.05.2013 αίτηση και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 5683/145083/23.05.2024 και 155683/16.06.2026 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης, για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2	Συσκευασίες		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	25 κ.εκ. – 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH)
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	25 – 500 κ. εκ.	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH)
3	Δοχεία	2 – 20 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH) ή COEX (HDPE+PA)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού τρεις (3) φορές, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, με καθαρό νερό

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA Νεραντζιά CIDAU	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	30-50	30-50	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	50	50	100		
	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Εσπεριδοειδή Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	30	30	100		
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU Φιστικιά PIAVE Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά IUGRE Καστανιά CSNSA	Αφίδες <i>Hyalopterus</i> sp. HYALSP	42-50	30	140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Καρπόκαψα Καρυδιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO Καρπόκαψα Καστανιάς <i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL		50	100		

	Ευρύτομο <i>Eurytoma plotnikovi</i> EURTPL	50	50	100	Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων.	
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE	Καρπόκαψα μηλιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO	30-50	30-50*	100-140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL					
	Ψύλλα μηλιάς <i>Psylla mali</i> PSYLMAL					
	Φυλλοδέτεες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Archips rosanus</i> CACORO	35-50	35	100-140		
	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Psylla pyri</i> PSYLPPI	50	50	100		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βυσσινιά PRNCE	Φυλλοδέτεες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Archips rosanus</i> CACORO	35-49	35	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI					
	Ραγολέτιδα <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE	40-70	40-50			
	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO					
	Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	50-70	50			
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus cerasi</i>	30-70	35-50			

	MYZUCE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς <i>Laspeyresia funebrana</i> LASPFU					
Αμπέλι ** VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	50-70	50 (1 ^η γενεά) 50-70 (2 ^η και 3 ^η γενεά)	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Κογχυλίδα <i>Clysia ambiguella</i> CLYSAM	50-70	50-70			
	Τζιτζικάκι <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	50	50			
Ελιά (Επιτραπέζια και ελιές για παραγωγή λαδιού) OLVEU	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL (ανθόβιας και καρπόβιας γενιά)	40	30-40	80-100	Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας.	1
	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50-70	50	100-140	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.	
	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	50-70	50	100-140	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.	
	Βαμβακάδα <i>Euphyllura olivine</i> EUPHOL	30-70	30-50	100-140		
	Φράουλα (Υ) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis ruborum</i> APHIRB <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> CHTSFR	50	30-50	30-100	

	<i>Myzus persicae</i> MYZUPE Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP					
Φράουλα (Θ) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
Κρεμμύδι ALLCE Πράσο ALLPO Σκόρδο ALLSA	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB	30-50	--	40-50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	30-50	50	60-100		3/14

	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18-30	30	60-100		
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP	30-50	--	60-100		
Πιπεριά (Υ+Θ) CPSSS	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	30-50 (Υ) 30-70 (Θ)	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14 (Υ) 4/7 (Θ)
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP					
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE					
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Anuraphis cardui</i> BRDSCA <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA					
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18-30 (Υ) 18-42 (Θ)	30	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)		
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	42-70 (Θ)	70 (Θ)	60-100 (Θ)		
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50 (Υ)	--	60-100 (Υ)		
Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI					

Αγγούρι (Υ+Θ) Αγγουράκι (Υ+Θ) CUMSA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYP	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYP	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i>	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA					
Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRSOK	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Liraphis erysimi</i> LIPAER <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR <i>Pieris rapae</i> PIERRA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

Μαρούλι (Υ) LACSA	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Αφίδες <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/7
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	30	50-100		
Ρόκα DIPER	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. BARABR Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH	35	50	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	70		
Μπιζέλια φρέσκα (αρακάς) PIBSX	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Σιτόνα <i>Sitona</i> sp. SITNSP	25	--	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αφίδα των κουκιών <i>Aphis fabae</i> APHIFA Κάμπια των μπιζελιών <i>Laspeyresia nigricana</i> LASPNI	30-50				

	Θρίπας <i>Thrips angusticeps</i> THRIAN Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP					
Ψυχανθή (όσπρια) Φακή LENCU Ρεβίθια CIEAR	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis</i> sp. APHISP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	30-50	--	60		
Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> PECTGO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	50-70	--	30-50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITB Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	50	--			
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδα <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--			

Καπνός ΝΙΟΤΑ	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB	30-50	--	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
Ζαχαρότευτλα ΒΕΑΒΑ Παντζάρι ΒΕΑΒΔ	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Μύγα των τεύτλων <i>Pegomya</i> sp. PEGOSP Άλτης <i>Chaetocnema tibialis</i> CHAETI Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	Κασσίδα <i>Cassida nebulosa</i> CASSNE	50	--	50		
Αραβόσιτος*** ΖΕΑΜΧ	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> SESANO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp.	30-50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14-21

	AGROSP					
	Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI	50				3/7-14
Σιτηρά Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESW Σίκαλη SECCE	Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	40-60	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
Μηδική MEDVA	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Σκαθάρι των μπιζελιών <i>Apion pisi</i> APIOPI Φυτονόμος <i>Hypera postica</i> HYPRPO	25	--	40	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Καλλωπιστικά (Υ+Θ) NNNZZ	Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB Φυλλοδέτες <i>Archips</i> sp. CACORO <i>Adoxophyes</i> sp. ADXPSP <i>Pandemis</i> sp.	25-50 17,5-35	50 35	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7

	PANDSP					
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA	50	70	70		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

**Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

***Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της Ανατολικής μύγας των καρπών (*Bactrocera dorsalis*) και της Μύγας των ροδάκινων (*Bactrocera zonata*) στις καλλιέργειες πορτοκαλιάς, γκρέιπφρουτ, νεραντζιάς, πυρηνοκάρπων και ελιάς. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστική ουσία deltamethrin, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC.

1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
3. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
5. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια
Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/
Προειδοποιητική λέξη:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή.»
«Σε περίπτωση επανεισόδου οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό.»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sr1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SRe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 30 μέτρων, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες
- 20 μέτρων, για αμπέλι και ελιά
- 30 μέτρων, με φυτική κάλυψη (φυτική ζώνη ανάσχεσης), σε τομάτα, μελιτζάνα, κολοκυνθοειδή, φράουλα.
- 20 μέτρων, που να συμπεριλαμβάνει 10 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75 %, σε Κουνουπίδι και Μπρόκολο
- 10 μέτρων για τις υπόλοιπες υπαίθριες καλλιέργειες

SRe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80 %, σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή κατά 60 %, σε ελιά.

SRe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για εφαρμογές σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, για την προστασία των μελισσών να μην εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της άνθησης, όταν τα θερμοκήπια παραμένουν ανοικτά. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα και τους επικονιαστές όπως οι βομβίνοι κ.α.

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων.

12

Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ένα γιατρό/Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα [Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005]	Ημέρες
Φράουλα (0152000), Τομάτα(0231010), Μελιτζάνα(0231030), Πιπεριά(0231020), Αγγούρι (0232010), Αγγουράκι (0232020), Κολοκυθάκι (0232030), Πεπόνι(0233010), Καρπούζι (0233030), Ρόκα (0251060)	3
Αμπέλι επιτραπέζιες (0151010) και οινοποιήσιμες (0151020) ποικιλίες, Ελιά επιτραπέζια (0161030), Ελιά ελαιοποιήσιμη (0402010), Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά(0130040), Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030- 002), Βερικοκιά(0140010), Δαμασκηλιά (0140040), Κερασιά (0140020), Βυσσινιά (0140020-006), Κρεμμύδι (0220020), Μαρούλι (0251020), Πράσο (0270060), Σκόρδο(0220010), Κουνουπίδι (0241020), Μπρόκολο (0241010), Φακές(0260050), Ρεβίθια (0260030- 003), Μπιζέλια-Αρακάς (0260030), Πατάτα (0211000), Καπνός	7
Μηδική(0632010-003)	14
Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρούτ (0110010), Νεραντζιά(0110020-002), Αμυγδαλιά (0120010), Φιστικιά (0120100), Φουντουκιά (0120060), Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040), Βαμβάκι(0401090), Ζαχαρότευτλα (0213000), Παντζάρι(0252030), Αραβόσιτος (0500030), Σιτάρι(0500090), Κριθάρι (0500010), Βρώμη(0500050), Σίκαλη(0500070)	30

**14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος.**

Διατηρείστε το στην αρχική , απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ