



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,
Αριθμ. πρωτ:

31.03.2026
81142

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: **LAINCO S.A., Ισπανίας**
 (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
 της εταιρείας,
OXYGEN E.E.
 Δαβάκη 141, 57300 Κύμينا, Θεσσαλονίκη
 E-mail: v.triantafyllidou@oxygen-agro.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60650 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SIVAR (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο), ως προς το εμπορικό όνομα, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση, τα στοιχεία του φάσματος δράσης του σκευάσματος καθώς επίσης τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
5. Την αριθμ. 60638 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LEGADO 25 SC (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8580/82222/28.07.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθμ. 37851/13.02.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 60650 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SIVAR (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 10420/101053/13.12.2017 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το εμπορικό όνομα, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση, τα στοιχεία του φάσματος δράσης του σκευάσματος καθώς επίσης τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Τα σημεία **1.2.α, 1.4β, 5** και **8** διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

RISOTTO

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

OXYGEN E.E.

Δαβάκη 141, 57300 Κύμينا, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 23910 43273

E-mail: v.triantafyllidou@oxygen-agro.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Όγκος ψεκ. υγρού (λ./στρ.)	κ.εκ. σκ./ στρ.		
Τομάτα (Θ) (LYPES)	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1-2/ 10
Μελιτζάνα (Θ)* (SOLME) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (οι καρποί να έχουν αποκτήσει το τυπικό για την ποικιλία τους χρώμα) (BBCH 51-89)	1-2/ 10

Αγγούρι (Θ) (CUMSA), Αγγουράκι (Θ) (CUMSG), Κολοκυθάκι (Θ) (CUUPG)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1-3 /10
Πεπόνι (Θ) (CUMME), Καρπούζι (Θ) (CITLA), Κολοκύθα (Θ) (CUUPE)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1-3 /10
Ρύζι (ORYSA)	Πυρικούλάρια <i>Pyricularia oryzae</i> (PYRIOR) Ελμινθοσπορίωση <i>Helminthosporium</i> sp. (HELMSP)	20-40	100	Μία εφαρμογή από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως πριν την ωρίμανση (BBCH 43-87)	1
Πατάτα (SOLTU)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> (ALTESO)	20-60	50	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο εμφάνισης της 1 ^{ης} ταξιανθίας έως τον μεταχρωματισμό των καρπών της 1 ^{ης} ταξιανθίας (BBCH 51-85)	1-2/14
<u>Ψυχανθή:</u> Μπιζέλια με λοβό (PIBSX) Μπιζέλια χωρίς λοβό (PIBSX), <u>Όσπρια:</u> Μπιζέλια (PISBX)	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> (ASCOPI) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σκωρίαση <i>Uromyces pisi**</i> (UROMPS)	15-80	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του 7 ^{ου} φύλλου/ έλικα έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος (BBCH 17-72)	1-2/10
<u>Ψυχανθή:</u> Φασόλια με λοβό (PHSVX) Φασόλια χωρίς λοβό (PHSVX), Κουκιά (φρέσκα) (VICFX) <u>Όσπρια:</u> Φασόλια (PHSVX), Κουκιά (VICFX)	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta fabae</i> (ASCOFA) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σκωρίαση <i>Uromyces pisi**</i> (UROMPS)	15-80	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως οι λοβοί αποκτήσουν το τυπικό τους μέγεθος (BBCH 20-79)	1-2/10

Πιπεριά (Θ) (CPSAN)	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA)	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1-2/10
Μπρόκολο* (BRSOK) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Περονόσπορος <i>Peronospora parasitica</i> (PEROPA)	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο έναρξης σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει στο 80% του τυπικού μεγέθους και μορφής (BBCH 41-48)	1-2/10
Αγκινάρα* (CYUSC) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ωίδιο <i>Leivulla taurica</i> (LEVETA)	30-60	80-100	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ψεκασμός φυλλώματος μέχρι την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής) (BBCH 41-55)	1-2/10
Λωτός* (DOSKA) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella nawae</i> (MYCONA)	50-100	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH 60-69)	1-2/10
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP)	20-40	100	Ψεκασμός φυλλώματος. προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 60-67)	1-2/ 10-14

Παρατηρήσεις:

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.
2. Μπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση στη γεύση του ραφινρισμένου λαδιού καλλιέργειας ελαιοκράμβης στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μελιτζάνας (Θ), του μπρόκολου, της αγκινάρας και του λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη σκωρίαση στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, μπιζέλια (όσπρια), φασόλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κουκιά (φρέσκα), φασόλια (όσπρια) και στα κουκιά (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας **και μελιτζάνας** πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.
2. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας **και μελιτζάνας (Θ)** υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90%) ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30°C).
3. Το σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
4. Να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκευάσματος πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10420/101053/13.12.2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ