



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.03.2026
Αριθ. πρωτ.: 74380

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη)
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14943 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SPINE (spinosad 48% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 357424/23.12.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14943 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SPINE (spinosad 48% β/ο).
7. Την αριθμ. 30720/06.02.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14943 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SPINE (spinosad 48% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 357424/23.12.2025 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα των μήλων <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Νάρκη των γιγαρτοκάρπων <i>Lithocolletis blancardella</i> LITHBL	20-30	100-125	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	3/7-14
Αχλαδιά** PYUCO	Ψύλλα της αχλαδιάς <i>Cacopsylla pyri</i> PSYLPY	30-35	100-125		
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Βλαστορύκτης της ροδακινιάς <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI ¹ <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	100	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	3/7-14
Δαμασκηλιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βυσσινιά PRNCE ² <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u>	<i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	2/7-14
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οينوποιήσιμες ποικιλίες)	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	10-15	40-120	Η εφαρμογή, στην 2 ^η και στην 3 ^η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου.	4/ 7-10 ημέρες

	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί.	7-10 ημέρες
	¹ Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	40-80	Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων.	7-14 ημέρες
Τομάτα (Υ)*** LYPES	Φυλλορύκτης <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP	50	50-60	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/7-10
	Φυλλορύκτης της τομάτας*** <i>Tuta absoluta</i> GNORAB	20-25	50-100		
	<i>Spodoptera</i> sp. SPODSP	25-30	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	
Τομάτα (Θ)*** LYPES	Φυλλορύκτης <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP	50-75	50-150	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/7-10
	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-150	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών)/ άνθος.	
	<i>Spodoptera</i> sp. SPODSP	25-30	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	
	Φυλλορύκτης της τομάτας**** <i>Tuta absoluta</i> GNORAB	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	
Πιπεριά (Θ) CPSAN	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος.	3/10
Αγγούρι (Θ) CUMSA	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος.	3/7-10
Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i>	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος.	3/10

	FRANOC				
Φράουλα (Θ) FRAAN	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά άνθος.	3/ 10 ημέρες
	¹ Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος.	7-14 ημέρες
Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	15-20 (κ.εκ/στρ)	50-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	3/10
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	5	100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	3/7-10
Φιστικιά PIAVE ² Χρήση ήσσονος σημασίας	Ψύλλα της φιστικιάς <i>Agonoscena</i> sp. AGONSP	30	100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα.	3/14-21
Σπανάκι SPQOL ² Χρήση ήσσονος σημασίας	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων .	3/7-10
Ρόκα ERUVE ² Χρήση ήσσονος σημασίας	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	40-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	3
Φοινικοειδή FFFPA ² Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Paysandisia archon</i> PAYSAR	75	40-100	Εφαρμογή στο μέγιστο των πτήσεων του εντόμου και πριν την εγκατάσταση της προσβολής. Επανάληψη μετά από 15 ημέρες εφ' όσον συνεχίζονται συλλήψεις του	2

				εντόμου. Ο ψεκασμός πρέπει να κατευθύνεται στη στεφάνη / κορυφαίο τμήμα του κορμού (0,50 έως 1 μέτρο από την κορυφαία περιοχή), που είναι η προτιμώμενη περιοχή αναπαραγωγής του θηλυκού και όχι σε ολόκληρο το δένδρο.	
Βατόμουρο (Θ) RUBSS Σμέουρο (Θ) RUBID Μύρτιλλο (Θ) VACSS ² Χρήσεις ήσσονος σημασίας	<i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος.	2/7-14
Μαρούλι (Υ) LACSA	² Χρήση ήσσονος σημασίας: Προνύμφες Λεπιδόπτερων <i>Heliothis armigera</i> HELIAR	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	2/7-10
Γλυκοπατάτα IPOBA ² Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Duronychelia fovealis</i> DUPOFO	5	100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	3/7-10

Παρατηρήσεις:

* Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

** Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι στη δόση 250 κ.εκ./hl στην αχλαδιά για αντιμετώπιση της ψύλλας *Psylla pyri*, για αύξηση της αποτελεσματικότητας.

*** Στην τομάτα, αγρού και θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φυλλορύκτη, το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./ σκευάσματος/hl σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./hl.

**** Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι (Simpell Pro 480 SC 20-25 κ.εκ. σκευάσματος/hl + 250- 300 κ.εκ. σκ./hl παραφινικό λάδι).

***** Επανάληψη εφαρμογής εφόσον βρέξει μέσα σε 4 ώρες.

- Η χρήση στο μαρούλι περιλαμβάνει το κατσαρό, το κεφαλωτό, το κοινό και το μαρούλι σαλάτα.

¹«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Drosophila suzukii* στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της βερικοκιάς, του αμπελιού και της φράουλας και κατά του *Spodoptera frugiperda* στην καλλιέργεια του βαμβακιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

² «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της δαμασκηνιάς, της κερασιάς, της βυσσινιάς, της φιστικιάς, του σπανακιού, της ρόκας, των φοινικοειδών, του βατόμουρου, του σμέουρου, του μύρτιλλου, του μαρουλιού και της γλυποτατάτας από τη

χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (εφαρμογή για καταπολέμηση της καρπόκαψας και νάρκης) (0130020), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Πατάτα (0211000), Δαμασκηλιά (0140040), Κερασιά-Βυσσινιά (0140020), Σμέουρο (0153030), Βατόμουρο (0153010), Μύρτιλλο (0154010), Φιστικιά (0120100), Γλυκοπατάτα (0212020)	7
Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της ψύλλας) (0130020) Αμπέλι (0151010, 0151020)	14
Τομάτα (Υ/Θ) (0231010), Αγγούρι (Θ) (0232010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030), Πιπεριά (Θ) (0231020), Σπανάκι (0252010), Ρόκα (0251060), Μαρούλι (Υ) (0251020)	3
Φράουλα	1
Βαμβάκι	21
Φοινικοειδή	--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 357424/23.12.2025 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ