Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.02 15:50:03 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **02.10.2026**
Αριθ. πρωτ.: **253408**

Προς: **Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενίας**
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – "AGRIBIZ")
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της με αριθ. 14889 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VOLKETE MAX (spinosad 48% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 352473/13.11.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14889 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VOLKETE MAX (spinosad 48% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 165108/24.06.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14889 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VOLKETE MAX (spinosad 48% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 352473/13.11.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος*		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα των μήλων *Cydia pomonella* CARPPO Νάρκη των γιγαρτοκάρπων *Lithocolletis blancardella* LITHBL	20-30	100-125	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	3/7-14
Αχλαδιά** PYUCO	Ψύλλα της αχλαδιάς *Cacopsylla pyri* PSYLPI	30-35	100-125		
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Βλαστορύκτης της ροδακινιάς *Anarsia lineatella* ANARLI	20	100	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	3/7-14
Δαμασκηνιά[1] PRNDO Κερασιά[1] PRNAV *Χρήσεις ήσσονος σημασίας*	***Drosophila suzukii*** **DROSSU**	**20**	**100**	**Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων.**	**2/7-14**
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ευδεμίδα *Lobesia botrana* POLYBO	10-15	40-120	Η εφαρμογή , στην 2η και στην 3η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	4/7-10
	Θρίπας της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis* FRANOC	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί.	

Τομάτα (Υ)*** LYPES	Φυλλορύκτης *Liriomyza* sp. LIRISP	50	50-60	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/7-10
	*Tuta absoluta***** GNORAB	20-25	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών προσβολής.	
	Spodoptera sp. SPODSP	25-30	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	
Τομάτα (Θ)*** LYPES	Φυλλορύκτης *Liriomyza* sp. LIRISP	50-75	50-150	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/7-10
	Θρίπας της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis* FRANOC	20-25	50-150	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών)/ άνθος.	
	Spodoptera sp. SPODSP	25-30	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	
	*Tuta absoluta***** GNORAB	20-25	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών προσβολής	
Πιπεριά (Θ) CPSAN	Θρίπας της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis* FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος.	3/10
Αγγούρι (Θ) CUMSA	Θρίπας της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis* FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος.	3/7-10
Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Θρίπας της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis* FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος.	3/10
Φράουλα (Θ) FRAAN	Θρίπας της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis* FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά άνθος.	3/10
Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι *Helicoverpa armigera* HELIAR	15-20 (κ.εκ/στρ)	50-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	3/10
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος *Leptinotarsa decemlineata* LPTNDE	5	100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.	3/7-10

Φιστικιά[1] **PIAVE** ***Χρήση ήσσονος σημασίας***	**Ψύλλα της φιστικιάς** ***Agonoscena* sp.** **AGONSP**	**30**	**100**	**Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα.**	**3/14-21**
Σπανάκι[1] **SPQOL** ***Χρήση ήσσονος σημασίας***	**Θρίπας** ***Thrips tabaci*** **THRITB** **Θρίπας της Καλιφόρνιας** ***Frankliniella occidentalis*** **FRANOC**	**20-25**	**40-80**	**Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων .**	**3/7-10**
Ρόκα[1] **ERUVE** ***Χρήση ήσσονος σημασίας***	**Θρίπας της Καλιφόρνιας** ***Frankliniella occidentalis*** **FRANOC**	**20-25**	**40-80**	**Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.**	**3**
Βατόμουρο (Θ)[1] **RUBSS** **Σμέουρο (Θ)[1]** **RUBID** **Μύρτιλλο (Θ)[1]** **VACSS** ***Χρήσεις ήσσονος σημασίας***	***Drosophila suzukii*** **DROSSU**	**20**	**50-100**	**Ψεκασμοί φυλλώματος.**	**2/7-14**
Γλυκοπατάτα[1] **IPOBA** ***Χρήση ήσσονος σημασίας***	***Duponchelia fovealis*** **DUPOFO**	**5**	**100**	**Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.**	**3/7-10**

Παρατηρήσεις:

* Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

** Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι στη δόση 250 κ.εκ./hl στην αχλαδιά για αντιμετώπιση της ψύλλας *Psylla pyri*, για αύξηση της αποτελεσματικότητας.

*** Στην τομάτα υπαίθρου και θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φυλλορύκτη, το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./hl σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./hl. Επανάληψη εφαρμογής εφόσον βρέξει μέσα σε 4 ώρες.

**** Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι (20-25 κ.εκ. προϊόντος/hl + 250- 300 κ.εκ. σκ./hl παραφινικό λάδι).

- **Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη χρήση στη βυσσινιά.**

[1] **«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες δαμασκηνιάς, κερασιάς, βυσσινιάς, φιστικιάς, σπανακιού, ρόκας, βατόμουρου, σμέουρου, μύρτιλλου και γλυποτατάτας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (εφαρμογή για καταπολέμηση της καρπόκαψας και νάρκης) (0130020), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Πατάτα (0211000), **Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά-Βυσσινιά (0140020), Σμέουρο (0153030), Βατόμουρο (0153010), Μύρτιλλο (0154010), Φιστικιά (0120100), Γλυκοπατάτα (0212020)**	7
Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της ψύλλας) (0130020) Αμπέλι (0151010, 0151020)	14
Τομάτα (Υ/Θ) (0231010), Αγγούρι (Θ) (0232010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030), Πιπεριά (Θ) (0231020), **Σπανάκι (0252010), Ρόκα (0251060)**	3
Φράουλα (Θ) (0152000)	1
Βαμβάκι (0401090)	21

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 352473/13.11.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ